


M. J. 24.

~~C. 4. 24~~

C. 4. 27

R41166





THE COLLEGE

OF MEDICINE

AND SURGERY

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILL.

1887

1887

1887

1887

1887

1887

CODEX
MEDICAMENTARIUS
EUROPAEUS

SECTIO QUINTA

PHARMACOPOEAM
ROSSICAM, FENNICAM ET POLONICAM
CONTINENS

TOMUS I.
PHARMACOPOEA ROSSICA ET FENNICA.

LIPSIAE ET SORAVIAE,
APUD FRIDERICUM FLEISCHER.
1821.

PHARMACOPOEA

R O S S I C A.




EDITIO NOVA AUCTION.

LIPSIAE ET SORAVIAE,
APUD FRIDERICUM FLEISCHER.

1821.

LIBRARY

1880



Commoda Medicorum tironum et Pharmacopœorum per vastissimum Imperium Rossicum in servitio constitutorum permoverunt Imperiale Collegium Medicum, res medicas per totam Rossiam dirigens, ut norma officinis nostris ante aliquot lustra data, nunc, seculo nostro imprimis hac scientia inclarescente, sub alia magis limatiori prodiret forma.

Hinc Collegii jussu Rossica Pharmacopoea a sodale suo cl. *N. Karpinsky* elaborata, selectis optimorum hujus artis virorum observationibus referta, a Collegio revisa approbataque in lucem editur.

Liber in duas divisus partes. Prima exhibet materiam medicam, simplicia ex triplici naturae regno breviter descripta; circa unamquamque plantam adjecta sunt momenta sequentia:

- 1) *Nomen officinale Plantae.*
- 2) *Nomen systematicum Linnaei.*
- 3) *Duratio plantarum.*
- 4) *Locus natalis.*


- 5) *Qualitates medicamentorum, et illorum plurium bonitatis notae.*
- 6) *Virtus et*
- 7) *Usus experimentis comprobatus.*
- 8) *Dosis.*
- 9) *Regulae generales colligendi servandique plantas*

Secunda pars circa Praeparata et Composita versatur, quorum processus prius antiquas, deinde hodiernas denominationes servant, descriptosque processus statim sequuntur eorum virtus, usus, dosisque.

Libra medica uncias duodecim continet, uncia drachmas octo, drachma scrupulos tres, scrupulus grana viginti. Drachma ponderis civilis patria appellatione *Solotnik* respondet uni drachmae medicae et paulo minus decem granis.

N a c h r i c h t.

Man bittet sich durch die Norm Pars I., II. und III. nicht irren zu lassen. Eigentlich enthält diese Sectio nur 2 partes. Durch ein Versehen wurde jedoch bey einer Unterabtheilung in Pars I. die neue Norm Pars II. gesetzt, und da diëss zur Zeit nicht entdeckt wurde, so musste man diese Norm fortlaufen lassen und bey dem wirklichen Pars II. die Norm Pars III. gebrauchen.



PHARMACOPOEAE ROSSICAE

P A R S I.

MATERIA MEDICA.

ABIETIS TURIONES; THUS, sive LACRYMA,
sive **RESINA NATIVA; RESINA COMMUNIS,**
quae pro colore vario fit alba, flava, bruna. *Pinus abies* Linnaei. Classis XXI. Ordo Monadelphia. Arbor per Rossiam septentrionalem vulgatissima.

Odor turionum balsamicus.

Sapor acescens, balsamicus.

Virtus antiscorbutica, diuretica.

Usus. Scorbutus, arthritis.

Dosis. Drachmae duae cum aquae unciis sex infusum s. decoctum.

Odor thuris ex arbore sponte stillantis fragrans.

Sapor amaricans, balsamicus, satis gratus.

Virtus diuretica.

Usus. Sabulum, tussis catarrhalis.

Dosis. Magnitudine nucis avellanae praeivritu cum vitello ovi.

Resina e trunco arboris inciso transsudans, in aqua decocta, colata et a sordibus bene pur-

gata ad inducendam emplastris tenacitatem, forma sicca, servatur.

ABROTANI herba, summitates. *Artemisia abrotanum*. L. cl. XIX. Ord. Polyg. Superfl. Suffrutex in Sibiria spontaneus, et in hortis, ubique colitur.

Odor fragrans, gratus.

Sapor amaricans, aromaticus.

Virtus aperiens, emmenagoga, anthelmintica,

Usus. Vermes, cachexia, suppressio menstruorum.

Dosis. Uncia dimidia in infuso.

Librae sedecim herbae recentis, et summitatum, vix drachmas tres olei destillati suppetant.

ABSYNTHII VULGARIS herba, summitates. *Artemisia Absinthium*. L. cl. XIX. Ord. Polyg. Superfl. Planta perennis, in Rossia et Sibiria spontanea.

Odor gravis, fragrans.

Sapor intense amarus.

Virtus anthelmintica, antiseptica, resolvens, tonica.

Usus. Vermes, febres intermittentes, icterus, colica frigida, appetitus languidus, hydrops.

Dosis. Drachma una cum aquae, aut vini unciiis octo infusum.

ACACIAE s. PRUNI SYLVESTRIS flores. *Prunus spinosa*. L. cl. XII. Ord. Monogyn. Frutex humilis in dumetis, et locis apricis Rossiae australis creber.

Odor florum recentium gratus.

Sapor amaricans, in amygdālas amaras incidens.

Virtus eccoprotica.

Usus. Alvus segnis infantum.

Dosis. Florum recentium uncia dimidia, siccorum vero drachmae duae cum aquae unciiis sex infusum.

ACETOSAE folia recentia. *Rumex acetosa* L.
cl. VI. Ord. Trig. Planta perennis crescit fere ubique.

Odor nullus.

Sapor intense acidus, gratus.

Virtus refrigerans, antiscorbutica, aperiens.

Usus. Ascites cum leucophlegmatia, scorbutus, diaeta antifebrilis, acrimonia ranunculorum, morbi cutanei, calculus.

Dosis. Succī expressi unciae quatuor, cum sero lactis; vel herbae recentis uncia dimidia cum iuris libra una decoctum.

Ulcera putrida foliis contusis cum successu deligantur.

ACETUM est liquor, ex vino denuo fermentationem suscipiente, natus.

Odor fragrans, proprius.

Sapor acidus.

Virtus resolvens, antiseptica, diaphoretica.

Usus. Febres inflammatoriae, gangraena, carbunculus, erysipelas biliosum, effluvia mephitica, plantarum virus.

Dosis. Uncia una cum aqua communi.

ACONITI s. NAPELLI herbae recentis extractum. *Aconitum Napellus*. L. cl. XII. Ord. Trigyn. Planta perennis in Rossia temperata, et Sibiria australi spontanea.

Odor fortis, herbaceus.

Sapor acris, pungens.

Virtus sudorifera, maxime resolvens, irritans.

Usus. Rheumatismus chronicus, arthritis, anchyloses, malum ischiaticum, asthma, febres quartanae, lues venerea inveterata, spina ventosa, scrophulae.

Dosis. Extracti granum unum bis, ter, quater, sexies, octies de die cum saccharo, pro re nata, datur.

ACORI VERI s. CALAMI AROMATICI radix. *Acorus calamus*. L. cl. VI. Ord. Monog. Planta perennis in Rossia et Sibiria australi spontanea.

Odor fragrans, fortis, nauseosus.

Sapor aromaticus, nauseosus, acris, leviter amaricans.

Virtus detergens, antiseptica.

Usus. Anorexia, febres exanthematicae malignae, asthma, scorbutus.

Dosis. Scrupulus unus in pulvere.

AGARICUS CHIRURGORUM s. PRAEPARATUS s. QUERCINUS. *Boletus ignarius*. L. cl. XXIV. Ord. Fungi. Fungus in betulis et quercubus frequens, optimus est supra fagum.

Odor nullus.

Sapor nullus.

Virtus adhaesiva, obturans, sanguinem incrasans.

Usus. Haemorrhagiae.

Etiam LYCOPERDON BOVISTA L. easdem vires praestat.

AGARICUS MUSCARIUS. *Agaricus muscarius.* L. cl. XXIV. Ord. Fungi. Annuus, in pratis et sylvis Rossiae frequens.

Odor foetens.

Sapor acris.

Virtus inebrians, et in furorem coniiciens.

Usus. Epilepsia, convulsiones, strumae, fistulae mali moris, ulcera phagadaenica, pustulae corneae.

Dosis. Interne pulvis a scrupulo dimidio, ad integrum, ter de die; externe aspersio.

Autumno collectus, praeparatus, vase bene clauso servetur loco sicco.

ALCANNAE SPURIAE s. ANCHUSAE radix. *Anchusa tinctoria.* L. cl. V. Ord. Monog. Planta perennis, in locis siccis Rossiae australis spontanea.

Odor nullus.

Sapor mucidus.

Virtus tinctoria, quod pigmentum soli cortici inest, et spiritum vini, olea, axungias, ceram, colore profunde et grate rubro tingit.

ALLII radix. *Allium sativum.* L. cl. VI. Ord.

Monogyn. Planta perennis, ubique in hortis colitur.

Odor proprius.

Sapor acris, subdulcis.

Virtus diuretica, anthelmintica, febrifuga, diaphoretica.

Usus. Hydrops, taeniae, asthma pituitosum, febris quartana, scorbutus.

Dosis. Ad tres spicas, vel nucleos; succi uncia una cum lactis libra una.

ALNI folia. *Betula alnus*. L. cl. XXI. Ord. Tetrandr. Arbor in locis aquosis crescens.

Odor nullus.

Sapor adstringens, amaricans.

Virtus discutiens, lactifuga, vulneraria.

Usus. Lac puerperarum suppressum, ulcera corrosiva.

Folia recentia postquam concisa super ignem in disco incaluerunt, et insudarunt, dein illa calide applicentur bis, vel pluries de die, etiam hyeme, modo antea aqua conspergantur.

ALOE PELLUCIDA s. LUCIDA, SUCCOTRINA, HEPATICA, CABALLINA. Aloe pellucida est omnium purissima, optima, nigricans, splendens, friabilis, in parvis fragmentis, et in fractura, rubicunda transparens, contrita sistit nitido-flavum pulverem, ab *Aloe spicata* L. Aloe Succotrina, Hepatica, Caballina ab *Aloe perfoliata* L. cl. VI. Ord. Monogyn. Perennis, in India utraque colitur.

Color succotrinae flavido-ruber, in purpureum inclinans, in pulvere aurea superficie splendens, friabilis est.

Odor instar myrrhae.

Sapor amaro-aromaticus.

Color hepaticae profundior, superficies non tam splendens.

Odor fortior, magis ingratus

Sapor amaricans, magisque nauseosus.

Caballina vilior est reliquis, color eius longe obscurior, fereque niger, et non nisi pecoribus datur.

Odor foetidus, ingratisissimus, ob multam copiam resinae, sordium, sabulique.

Virtus omnium, purgans, stimulans, antiseptica, sanguinem excandens, pellens menses, et haemorrhoides.

Usus. Obstructio alvi et mensium.

Dosis. A granis duobus, tribus, ad sex, cum extracto amaro, in pilulis.

Gravidis, et haemorrhoidalibus usus aloes non permittitur.

ALTHEAE radix, folia. *Althea officinalis* L.
cl. XVI. Ord. Polyandr. Planta perennis in Russia australi, et Sibiria spontanea.

Odor nullus.

Sapor subdulcescens, mucilagineus.

Virtus emolliens, lubricans, demulcens.

Usus. Ulcus vesicae, pleuritis, morbilli, nephritis calculosa, stranguria, dysenteria, gonorrhoea, raucedo, tussis, tenesmus.

Dosis. Radicis drachmae tres, cum aquae libra una ad dimidium coquantur.

Folia non nisi externe adhibentur.

Radix ad dimidiam fere ponderis, folia vero, vix ad quartam partem erogant mucilaginis, quae est optimum resinarum menstruum.

ALUMEN CRUDUM. SULFAS ALUMINAE.

Alumen nativum. L. cl. II. Minerae. Salia. Conficitur in Gubernio Tamboviensi. Est sal medium, ex acido vitrioli, terra aluminari, et aqua crystallisationis constans.

Odor nullus.

Sapor stypticus, dulcescens.

Virtus adstringens, styptica, exsiccans, antiseptica.

Usus. Ulcera fungosa, putrida, laxitas uvulae et faucium, prolapsus, variolae confluentes putridae, haemorrhagiae, vehementior haemoptoe pulmonum ex atonia, colica pictorum, ophthalmia, diabetes, fluor albus.

Dosis. Intus octo, aut decem grana in pulvere cum saccharo; sive in pilulis cum gummi arabico et syrupo, sive cum sero lactis. Extus in solutione exhibetur.

AMBRA GRISEA. *Ambra ambrosiaca grisea.*

L. cl. II. Minerae. Sulphura. Est bitumen intus griseum, extus nigricante crusta tectum, ad candelam facile liquescens, vix non totum in auras avolans, in pulverem tritum, evadit fragrantissimum, in omni mari quod Asiam, Africam, et

Iamaicam alluit, reperitur, sive ipsi innatans, sive rupibus littoris accretum.

Odor gratissimus.

Sapor resinosus, aromaticus.

Virtus excitans, augens vim nerveam.

Dosis. Grana quindecim, ad triginta cum saccharo in pulverem trita; aut alcohole soluta exhibentur.

Optimum signum bonitatis ambrae est, quando acui candefactae sibi immissae non adhaeret.

AMMONIACUS SAL. MURIAS AMMONIAE. *Ammoniacus sal.* L. cl. II. Minerae. Salia. Est sal neuter, ex acido salis, et alcali volatili constans. Paratur in Aegypto, Germania, Gallia. Quin etiam nativum, montes ignivomi, et Calmucorum regio largiuntur.

Odor levissimus.

Sapor frigoris sensum linguae imprimens, salinus, urinosus.

Virtus resolvens, antiseptica, diuretica.

Usus. Tumores frigidi, ecchymosis, scabies, ulcera putrida, fistulae, caries, gangraena, angina pituitosa, febres, obstructions, hypochondriacorum et haemorrhoidariorum mala, mensium ataxia, hydrops, vermes, diarrhoea putrida.

Dosis. A scrupulo uno, ad duos, imo in gangraena ad drachmas tres per diem cum cortice peruviano datur. Extus ex uncia dimidia, ad duas, cum aqua frigidissima, seu oxycrato fomenta.

AMMONIACUM GUMMI. Est succus gummoso-resinosus, ex incerta quadam *Ferulae* specie obtentus, ex grumis flavescentibus constans, quibus ingens granorum numerus lactei coloris, ungues, seu amygdalae dictae, inhaeret; uberiorum horum unguium copia gummi ammoniacum abundans, melius habetur. Ex deserto Africae Barca venit.

Odor fragrans, gravis.

Sapor amaricans, acriusculus.

Virtus solvens, aperiens, expectorans, emmenagoga, diaphoretica, eccoprotica; Externe emolliens, resolvens.

Usus. Asthma, obstipatio, dysuria, hysteria, peripneumonia notha, hydrops, colicae inveteratae, tumores duriusculi.

Dosis. Drachma dimidia in mixtura, vel in forma pilulari datur.

AMYGDALAE DULCES, oleum expressum.
Amygdalus communis. L. cl. XII Ord. Monogyn.
Arbor in Gubernio Astrachanensi, et Asoviensi colenda, occurrit spontanea circa promontoria Caucasii australia ad Teflis, et in Cachetia.

Odor nucleorum debilis.

Sapor dulcescens, mitis.

Virtus obvolvans, nutriens; Olei frigide expressi blande antispasmodica, relaxans, obtundens.

Usus nucleorum. Febres vulnerariae, morbi inflammatorii, urinae ardor, haemorrhagiae; Olei, tussis, et stranguria, dolores nephritici,

colicae spasmodicae, dolores post partum, vermes, eclampsia.

Dosis. Amygdalarum dulcium unciae duae cum aquae purae libris duabus et dimidia in emulsione. Olei ad aliquot cochlearia.

AMYGDALAE AMARAE sunt praecedentis varietas.

Odor debilis.

Sapor amaricans, in Laurocerasum incidens.

Virtus anodyna, diuretica, feris deleteria.

Usus. Febres pertinaces intermittentes, hydrophobia.

Dosis. In forma emulsionis, ut praecedentes; vel integrae aliquot amygdalae comeduntur. Oleum expressum non differt sapore ab altero dulcium, et tardius altero rancescit.

AMYGDALAE NANAE nuclei. *Amygdalus nana*. L. cl. XII. Ord. Monogyn. In Gubernio Astrachanensi; in Ucraina; in Sibiria. Frutex in australioris Rossiae et Sibiriae plagis spontaneus, etiam Petropoli persistens.

Odor nullus.

Sapor amaricans.

Virtus, Usus, Dosisque, amygdalarum dulcium, quibus illi saepe apud nos substituuntur.

AMYLUM TRITICI paratur e *Tritici* speciebus ubique in Rossia.

Odor nullus.

Sapor farinaceus.

Virtus obvolvans, glutinans.

Usus. Amylum aqua coctum dat gelatum amyli, quod aqua dilutum in asperitate faucium, diarrhoea, dysenteriaque exhibetur.

ANAGALLIDIS herba. *Anagallis arvensis.*
L. cl. V. Ord. Monogyn. Planta annua crescit in arvis et hortis.

Odor nullus.

Sapor initio oleraceus, postea amarus, cum acrimoniae sensu.

Virtus olim antimelancholica, hodie antilyssa.

Usus. Melancholia, mania, rabies canina.

Dosis. Pulveris drachma dimidia, ad scrupulos quatuor, bis per diem, vel in eiusdem decocto, vel in aqua simplici. Extus, Vulnere et ulcera venenata quotidie semel consperguntur pulvere.

ANETHI SEMINA. *Anethum graveolens.* L. cl. V. Ord. Digyn. Planta annua per totam Rossiam hortensis.

Odor foliorum recentium gratus.

Sapor aromaticus, at flores magis aromatici, magisque calidi; Semina aromate herbae item et sapore, sed magis calida.

Virtus carminativa, lactifera.

Usus. Flatus, lactis inopia, praecipue singultus.

Dosis. Drachma una cum aqua infunditur.

ANGELICAE SATIVAE radix. *Angelica Archangelica.* L. cl. V. Ord. Digyn. Planta biennis in Rossia spontanea, culturaque in hortis ubique crescit.

Odor radices aromaticus, fragrans, gratus.

Sapor aromaticus, fortis, masticata acris, mordens in lingua et faucibus cum calore.

Virtus stomachica, sudorifera, carminativa, emmenagoga.

Usus. Pituitosa humorum diathesis, stomachace.

Dosis. Radicis drachma una cum aquae uncii sex infusum; in pulvere drachma una.

ANGUSTURAE seu AUGUSTINAE cortex.

Brucea antidysenterica. Ioh. Frid. Mill. *Brucea ferruginea.* l'Héritier. In Angustura Americae australis, et in insula Trinidad.

Odor recentis ingratus, sicci vero nullus.

Sapor amaro - aromaticus.

Virtus febrifuga, tonica, antiseptica, antidysenterica.

Usus. Febres intermittentes et putridae, diarrhoea colliquativa, languor ventriculi.

Dosis. Pulveris grana quindecim ad viginti, omni trihorio; in infuso drachma una cum quatuor uncii aquae, de die.

ANISI semina. *Pimpinella Anisum.* L. cl. V. Ord. Digyn. Planta annua colitur per Ucraniam frequentissima.

Odor suaveolens, proprius.

Sapor dulciusculus cum leviori aromate.

Virtus carminativa, incidens, lactifera, pectoralis.

Usus. Tormina, affectiones pituitosae ventriculi, et pulmonum.

Dosis. Drachma una cum aquae unciiis tribus infusum; drachmae tres in clysmate.

Librae tres seminis, olei aetherei unciam unam, et plus, destillatione erogant.

ANISUM STELLATUM. *Illicium anisatum.*
L. cl. XIII. Ord. Polyg. Arbor in China, et Tataria crescens.

Odor aromaticus.

Sapor gratus, in anisum incidens.

Virtus pectoralis, carminativa, diuretica.

Usus. Tussis, morbi catarrhales praecipue tempestate nebulosa.

Dosis. Drachma una cum aquae unciiis tribus infusum.

ANTIMONIUM CRUDUM. STIBIUM. Est semimetallum, ex sulphure et regulo constans. *Stibium striatum.* L. cl. II. Ord. Minerarum. Metallum. Obtinetur ex Hungaria, datur quoque circa urbem Nerczinsk.

Odor et Sapor nullus.

Virtus diaphoretica, sanguinem purificans, resolvens.

Usus. Morbi ab impuritatibus seri sanguinis: ut scabies, scrophulae, tumores rheumatici, ulcera chronica, et lues venerea inveterata.

Dosis. A scrupulo uno, drachma dimidia, ad drachmam unam cum magnesia in pulvere, sive pilulis.

Intus non aliud nisi antimonium crudum praeparatum exhiberi debet.

AQUIFOLII folia. *Ilex Aquifolium*. L. cl. IV.
Ord. Tetragyn. Frutex in sepibus sylvisque Europae australioris, sub umbra aliarum arborum sponte provenit.

Odor nullus.

Sapor adstringens.

Virtus febrifuga, antiarthritica.

Usus. Febres intermittentes, arthritis, debilitas stomachi, icterus.

Dosis. Ad drachmam unam in pulvere; vel in infuso, vel decocto ad unciam unam per diem.

ARGENTUM. *Argentum nativum*. L. cl. II.
Minerae. Metalla. Est metallum indigenum, album, auro levius, ductile.

Odor et Sapor nullus.

Virtus. Rubiginem non contrahit, nisi acido nitroso tangatur.

Usus. Mechanicus ad quaedam instrumenta chirurgica, praesertim oris cavo dicata, et ad parandum lapidem infernalem adhibetur.

Argentum non nisi purissimum in officinas recipiendum est, quod quidem, vel detonatione cum nitro, vel per reductionem lunae corneae obtinetur.

ARISTOLOCHIAE TRILOBATAE stipites, radix. *Aristolochia trilobata*. L. cl. XX. Ord. Hexandr. Planta herbacea, Surinami, et in Iamaica crescens.

Odor fragrans, fortis, fere corticis Padi.

Sapor leniter amaricans, odori congruens.

Virtus alexiteria, sudorifera.

Usus. Morsus serpentum, morbi contagiosi, febres intermittentes rebelles.

Dosis. Stipitum grana sex, ad viginti; drachmae duae in infuso, sub connubio inunctionis olei lini cum camphora.

Radicis virtus maior esse dicitur.

ARISTOLOCHIAE VULGARIS radix. *Aristolochia clematitis*. L. cl. XX. Ord. Hexandr. Planta perennis in Rossia australi spontanea, usque ad montes Uralienses.

Odor fragrans, subgraveolens.

Sapor amarus, inhaerens.

Virtus pellens, resolvens, diuretica, emmenagoga.

Usus. Asthma scorbuticum, cachexia, podagra, cacoëthes, hypersarcosis, fistula.

Dosis. Drachma dimidia pulveris, drachmae duae cum aquae, aut vini unciiis quatuor infusum.

ARMORACIAE seu RAPHANI RUSTICANI radix recens. *Cochlearia Armoracia*. L. cl. XV. Ord. Silicul. Planta perennis in tota Rossia hortensis.

Odor fragrans, pungens, penetrans, oculos feriens.

Sapor fervidus, acris, dulcescens, saepe subamaricans.

Virtus diuretica, incidens, antiscorbutica, rube-
faciens.

Usus. Scorbutus, anorexia, cachexia, hydrops, asthma hydropicum, raucedo, arthritis.

Dosis. Uncia dimidia cum iuris libra una decoctum; succi expressi uncia una cum vino albo.

ARNICAE flores, herba, radix. *Arnica montana.* L. cl. XIX. Ord. Polyg. superfl. Planta perennis in Sibiria australi spontanea.

Odor graveolens, sternutationem movens.

Sapor amaricans, acris; Folia siccata fragiuscula inter manus confricata et olfacta sternutationem excitant.

Virtus resolvens, discutiens, irritans, diuretica, diaphoretica, emmenagoga.

Usus. Sugillationes, morbi muscosi, obstructiones viscerum, paralysis, amaurosis.

Dosis. Florum drachma una, ad unciam dimidiam in libra una aquae ferventis infusum per diem; Radicis a granis quinque, decem, ad scrupulum unum, et ad drachmam unam in pulvere datur; herbae drachma una, cum aquae unciis sex infusum, semper extra febrim, et plethoram, usurpatur.

Arnica non confundenda est cum Hypochaeride maculata.

ARI radix. *Arum maculatum.* L. cl. XX. Ord. Polyandr. Planta perennis nemoribus Rossiae temperationis crescens.

Odor nullus.

Sapor pungens, exsiccatione et lotione per aquam repetita, mitigatur.

Virtus sicca, stimulans, aperiens, incidens, diuretica, expectorans.

Usus. Colluvies pituitosa, anorexia, cephalaea sympathica, asthma pituitosum, cachexia, raucitas diuturna, febris intermittens.

Dosis. A scrupulo uno supraque pulvis eius dari potest.

Vix amplius radix succosa, nisi sicca in usum trahitur, quae post siccationem servari vasis bene clausis, et ab accessu aëris humidi arceri debet.

Herba s. folia sunt multo acriora radice.

ARSENICUM ALBUM, calx arsenici alba.

Oxydum arsenici album. *Arsenicum crudum.* L. cl. II. Minerae. Sulphur. Passim in metallifodinis obvium.

Odor nullus, accensi vero foetor alliaceus.

Sapor acris, urens, inflammans.

Virtus maxime corrosiva, in minima vero dosi anticancrosa, febrifuga.

Usus. Cancer, febres intermittentes rebelles, hydrophobia, epilepsia.

Dosis requirit maximam cautelam, hinc eius forma sistitur: Arsenici albi sexaginta quatuor grana, cum aequalibus partibus potassae, aquae destillatae libra dimidia, in balneo arenae ad perfectam solutionem coquantur. Solutioni frigidae addantur spiritus lavendulae drachmae quatuor, et aquae fluvialis tantum, quantum opus est ad integram libram complendam. Huius liquoris octo-

ginta guttae continent $\frac{1}{2}$ grani arsenici, cuius solutionis infantibus duorum annorum guttae duae, adultis guttae decem (vix $\frac{1}{16}$ grani) bis per diem extra paroxysmum exhibentur. Externe in forma unguenti. e. gr. Arsenici, sulphuris ana drachmam unam, aceti destillati, unguenti saturni ana unciam unam. Huius unguenti pauca portione tenuissime linteam illitum cancroso ulceri applicatur.

ASARI radix, folia. *Asarum Europaeum*. L. cl. XI. Ord. Monogyn. Planta perennis in locis umbrosis Rossiae temperatae spontanea.

Odor radiceis nauseosus; foliorum nullus.

Sapor radiceis, et foliorum subaromaticus, acris.

Virtus purgans, diaphoretica, diuretica, emmenagoga, vomitoria.

Usus. Febres intermittentes, biliosae, hydrops, melancholia, coryza.

Dosis. Radiceis scrupulus unus, ad drachmam dimidiam in pulvere; drachmae duae in decocto, cuius dimidium vasculum theanum omni bihorio bibitur.

Granum unum huius radiceis, omni quadrante horae, seu per dimidiam horam exhibitum vires antispasmodicas exserit.

ASA FOETIDA gummi. *Ferula asa foetida*. L. cl. V. Ord. Digyn. Planta perennis, crescens in Persiae campis montosis.

Odor foetidissimus, alliaceus.

Sapor amaricans, acris, mordens, diutissime in-

haerens, etiamsi os faucesque compluries eluti fuerint.

Virtus resolvens, antispasmodica, anthelmintica, anticariosa, diaphoretica.

Usus. Malum hystericum, et hypochondriacum, tussis suffocativa epidemica, caries, spina ventosa, tumores indurati, tympanitis, colica flatulenta, obstructio mensium, pituita pulmonum.

Dosis. A scrupulo uno, ad drachnam dimidiam et integram in pilulis; in clysmate ad drachmas duas.

ASTRAGALI EXSCAPI radix. *Astragalus exscapus.* L. cl. XVIII. Ord. Decandr. Planta perennis in montibus Thuringiae, collibus saxosis, glareosis, circa Nordhusam, in Hungaria spontanea.

Odor nullus.

Sapor amaricans, subadstringens.

Virtus resolvens, demulcens, involvens, antisyphilitica.

Usus. Tinea capitis, et omnes species luis venereae, rheumatismus, arthritis.

Dosis. Uncia dimidia cum aquae unciis quindecim ad dimidium consumptionis coquitur, et tale praebium mane et vespere sumitur tepide, non intermissa etiam eius applicatione externa.

Decoctum sapore ad infusum liquiritiae prope accedit, itidemque sapor amygdalarum amarum consimile.

AVENAE semina excorticata. *Avena sativa*.
L. cl. III. Ord. Digyn. Gramen annuum per totam Rossiam in agris cultum.

Odor nullus.

Sapor farinaceus.

Virtus nutriens, demulcens, antiseptica.

Usus. Diaeta et potus febrilis, clysm. Unciae tres cum aquae libris quatuor coquuntur.

Tumores, a lacte coagulato, emolliuntur egregie pulte eius tepida.

AURANTIORUM malum immaturum, flores, folia, cortex, succus; *Citrus Aurantium*. L. cl. XVIII. Ord. Icosandr. Arbor Indiae orientalis, hodie in australi Europa, et in nostris caldariis copiosa alitur.

Odor mali viridis recentis, quod fit variae magnitudinis, fragrans.

Sapor paululum acerbus, sicci grate aromaticus, et intense amarus.

Odor succi maturi pomi subaromaticus.

Sapor grate acidulus.

Odor corticis flavedinis fragrantissimus.

Sapor grate amarus. *Odor* florum recentium suavissimus, siccorum fere nullus. *Sapor* amaricans; *Odor* foliorum manu tritorum grate fragrans. *Sapor* subamarus.

Virtus mali immaturi stomachica; maturi potissimum eius succi, antiphlogistica; corticis flavedinis roborans, febrifuga; florum analeptica; foliorum antispasmodica.

Usus pomi immaturi. Languor ventriculi; fon-

ticuli; succi s. eius roobis. Febres putridae, morbi chronici, scorbutus; Flavedinis corticis. Febres intermittentes, haemorrhagiae a laxitate, morbi nervosi, cum ventriculi languore; Foliorum. Convulsiones.

Dosis. Succii uncia una; corticis drachmae duae cum aquae unciis sex infusum; drachma una in pulvere; Foliorum drachma dimidia in pulvere; sive uncia dimidia per trihorium in vase clauso cum aquae libra una coquitur, et per diem consumitur.

Ex corticis flavedine elicetur oleum Bergamot dictum.

Ex floribus vero oleum destillatum, florum Naphae s. essentia Neroli.

AXUNGIA PORCI. *Sus scrofa.* L. cl. I. Mammalia. Belluae. Est pinguedo molliuscula, depurata, alba, e mesenterio hausta.

Odor nullus.

Sapor pinguis.

Virtus emolliens, leniens.

Usus. Pluribus unguentis, et balsamis dat basin.

BALSAMUM CANADENSE. *Pinus Balsamea.* L. cl. XXI. Ord. Monadelph. Arbor Canadae, nostrae vero hyemis patientissima.

Odor balsamicus, gratus, ad balsamum Meccae accedens.

Sapor mitis, vix amaricans.

Virtus externe, vulneraria, interne diuretica,

Usus. Ulcera, nec non affectiones nephriticae.

Dosis. Drachma dimidia sapone, vel vitello ovi excipitur.

Vires huius balsami perfecte supplet Terebintina Larigna.

BALSAMUM COPAIVAE. *Copaifera officinalis*. L. cl. X. Ord. Monogyn. Arbor Brasiliae, praecipue insularum Maranhon, et Gujanae civis.

Odor fragrans, balsamicus, non ingratus.

Sapor amarus punctim acutus, et linguae diu inhaerens.

Virtus balsamica, vulneraria, diuretica.

Usus. Vulnere recentia tendinum et nervorum, gonorrhoea, leucorrhoea, hydrops.

Dosis. Interne a guttulis quinque, decem, ad viginti quatuor per diem in vehiculo saponaceo; externe tepide instillatur.

Huius balsami adulterati signa sunt sequentia:

Color flavo-pellucidus deest; *Odor*, et amarus sapor, vero et genuino debilior reperitur. Adulteratio cum oleis expressis detegitur tinctura Tartari, in qua enim genuinum plane solvitur, et pellucidum manet, si vero oleum tale quoddam balsamo admixtum fuerit, solutio lactea evadit.

BALSAMUM PERUVIANUM ALBUM, et NIGRUM. *Myroxylon Peruiferum*. L. cl. X. Ord. Monog. Arbor in regno Peruviano, Brasilia, terra firma, Mexico habitans.

Odor albi fragrans et gratior altero; nigri sua-

vis, fragrans styracinus, et praecipue siliquae vanillae consimilis.

Sapor pinguiusculus, amaricans, acriusculus.

Virtus vulneraria, consolidans, antispasmodica.

Usus. Vulnura nervorum, ulcera, tetanus, colica piftonum a debilitate, dolor, et convulsiones ex vulneribus, asthma.

Dosis. Scrupulus dimidius in emulsione, pilulis; externe fofus.

Balsamum album elicitor, cortice inciso, parca quantitate, quod solidescens, acceptaque per moram fragilitate sub nomine balsami peruviani sicci s. opobalsami sicci venit. Nigrum vero, coctione concisorum corticum, truncorum, et surculorum cum aqua, obtinetur.

In alcohole vini et oleo vitrioli perfecte solvitur, non vero in oleis expressis et pinguedine animali.

BARDANAE radix. *Arctium Lappa.* L. cl. XIX. Ord. Polyg. aequal. Planta biennis, ad vias, et locis ruderalis frequens.

Odor vix ullus.

Sapor subdulcis, subamarus, austerus.

Virtus mundificans, diuretica.

Usus. Tumores arthritici, rheumatici, ulcera crurum antiqua, morbi venerei, sabulum renum, et vesicae, lochia movenda.

Dosis. Uncia una cum libra una aquae ad remanentiam uncia- rum octo decoctum.

Folia recentia cum maximo successu ulceribus applicantur.

BELLADONNAE folia, radix, quae optima est biennis. *Atropa Belladonna*. L. cl. V. Ord. Monogyn. Planta perennis in Rossia temperata.

Odor radices, loco umbroso aëre non perflato siccatae, vix ullus.

Sapor acriusculus, subnarcoticus.

Virtus sudorifera, subnarcotica, resolvens, antispasmodica.

Usus. Rabies canina, cancer, epilepsia, chorea S. Viti, scirrhus, melancholia, mania, hemiplegia serosa; Foliorum vis, et usus, radici consimilis.

Dosis. Radicis grana quinque, ad duodecim, adulto; infanti granum unum, ad sex in aqua frigida; Foliorum adulto-grana duo, quatuor, ad octo; infanti a quarta grani parte, ad granum dimidium, duo, et tria. Scrupulus unus siccatorum foliorum ad uncias decem aquae ferventis, quod infusum per diem cochleatim exhauritur.

Externe cataplasma.

Folia tempore suo lecta, siccentur ut ipsa radix; et seorsim caute servantur. Contra Belladonnae deleterios effectus maximum est antidotum acetum, emeticum, lac tepidum.

BENZOE s. BENZOINUM GUMMI, seu ASA DULCIS. *Styrax Benzoin*. Dryander. *Laurus*

Benzoin. L. cl. X. Ord. Monogyn. Arbor copiose in insulae Sumatrae partibus septentrionalibus, et media parte, crescens.

Odor fragrans, gratusque, inter dentes friabilis, sed in ore non solubilis.

Sapor subdulcis, resinosus, et balsamicus. Vid. Flores Benzoes Part. II.

Dantur praecipue tres species Benzoes, quarum una alba Camayan Poeti, vel Benzoinum album, vel Cabessa, quae omnino alba est. Altera albis quibusdam maculis quasi oculis instructa Camayan Bamatta, seu Benzoe amygdaloides, dicitur.

Tertia Camayam itam s. Benzoinum nigrum, quae valde impura est.

BERBERIS baccae, cortex medius, *Berberis vulgaris*. L. cl. VI. Ord. Monogyn. Frutex albus ad sepes, in sylvis crescens, et in hortis colitur.

Odor corticis nullus.

Sapor intense amarus, masticatione saliva fit crocea.

Odor baccarum recentium nullus.

Sapor intensius acidus.

Virtus corticis recentis roborans. Baccarum refrigerans, antiseptica.

Usus Corticis. Aphtae, icterus; baccarum. Scorbutus, febres omnes, inprimis putridae, diarrhoea biliosa.

Dosis. Corticis uncia una sub forma infusi cum aqua; succi baccarum ad unciam unam.

BISTORTAE radix. *Polygonum Bistorta*.
L. cl. VIII. Ord. Trigyn. Planta perennis in
temperatis Rossiae, et Sibiriae, occupat prata hu-
mida.

Odor recentis in Nasturtium incidens; siccae
vero nullus.

Sapor intensius stypticus.

Virtus adstringens, roborans.

Usus. Dentes vacillantes, stomacace, dysenteria,
leucorrhoea, gonorrhoea, profluvia alvi, hae-
morrhagiae.

Dosis. In pulvere raro ad scrupulum unum,
vel drachmam dimidiam exhibetur; sed ex
drachma una et dimidia radicis cum aquae
unciis sex ad uncias quatuor fit decoctum,
ex quo etiam fots, et iniectiones.

BORAX est sal neuter, ex acido proprio, et
alkali fossili constans. *Borax Tincal*. L. cl. II.
Ord. Mineræ; Salia. Ex India orientali adfer-
tur, et in Venetiis, nec non in Batavia depuratur,
et crystallos multilateres pellucidos exhibet.

Odor nullus.

Sapor lixiviosus.

Virtus abstergens, resolvens, incidens.

Usus. Maculae corneae, apthae oris, scabies,
tumores haemorrhoidales.

Dosis. Drachma dimidia Boracis cum 'cremore
tartari aqua soluta, et melle edulcorata coch-
leatim exhibetur.

Externe collyria, lotiones.

BOTRYOS VULGARIS, herba. *Chenopodium Botrys*. L. cl V. Ord. Digyn. Planta annua in australibus Rossiae, ad Volgam, et Ural fluvios spontanea.

Odor herbae recentis fragrans, fortis, graviusculus, balsamicus, non ingratus.

Sapor odori congruens, aromaticus.

Virtus resolvens, antispasmodica, anthelmintica, carminativa.

Usus. Hysteria, tussis convulsiva, asthma, vermes.

Dosis. Drachma una pulveris; drachmae duae cum aquae unciis tribus, infusum.

Fortior efficaciorque est *Chenopodio ambrosioide* L.

CACAO fructus s. nucleus; Oleum s. butyrum. *Theobroma Cacao*. L. cl. XVIII Ord. Pentandr. Arbor Americae meridionalis locis depressis umbrosis propria.

Odor vix ullus.

Sapor nuclei est gratus, oleosus, leniter subadstringens, amaricans.

Odor olei gratus.

Sapor blandus, subdulcis.

Virtus emolliens, relaxans.

Usus Olei. Excoriationes, fissurae labiorum, papillarum, mammae, ani, haemorrhoides, ardor et dolor intra anum, instar suppositorii.

Ad instrumenta chirurgica contra rubiginem et

aeruginem defendenda, nulla pinguedo aptior hacce, si eadem obliniuntur.

Nuclei, pro diversitate loci, in varias species distinguuntur, sed praestantissimae earum sunt nuclei Caracenses, qui in provincia Nicuragua novae Hispaniae bene maturi colliguntur.

CAJEPUT, seu CAJUPUT oleum. *Melaleuca Leucadendron*. L. cl. XVIII. Ord. Polyandr. Arbor Indiae, aliarumque insularum Moluccarum montibus frequens.

Odor camphoraceus cum aliqua odoris therebintinacei miscela, qui, si copiosius, et fortius nares ferit, initio est ingratus; minori autem copia valde gratus.

Sapor multum aromaticus, momento contactus linguae sensum frigoris imprimit.

Virtus calefaciens, stimulans, antispasmodica.

Usus. Morbi spastici, convulsivi, catalepsia, Chorea St. Viti, Rheumatismus, paralysis, vomitus gravidarum, otalgia, odontalgia.

Dosis. Guttulae duae, tres, sex, ad duodecimum, ter, quater, de die cum saccharo, seu vino, seu liquore anodyno exhibentur.

CALX VIVA. *Marmoris* L. variae species calcinatae. Copiosissimus eius in Rossia proventus.

Odor nullus.

Sapor causticus.

Virtus corrosiva, venenata.

Usus. Varia praeparata.

Calx e testis ostrearum praefertur.

CAMPECHENSE LIGNUM. *Haematoxylum campechianum*. L. cl. X. Ord. Monogyn. Arbor in America calidiori, ad sinum Campeche regni Mexicani copiose crescit.

Odor vix ullus.

Sapor dulcescenti-amaricans, leniter stypticus.

Virtus adstringens.

Usus. Diarrhoea, et dysenteria.

Dosis. Extracti aquosi drachma una cum uncia una aquae menthae crispae.

CAMPHORA est resina volatilis sui generis, a *Lauro Camphora*. L. cl. IX. Ord. Monogyn. Arbor Japoniae, et Javae propria.

Odor fragrantissimus, penetrans, ad Rosmarinum accedens.

Sapor calidissimus, ut Menthae piperitidis, amaricans, linguam faucesque penetrans.

Virtus calefaciens, cardiaca, resolvens, sudorifera, antiseptica, antispasmodica, anthelmintica.

Usus. Febres putridae, nervosae, puerperarum scarlatina subito retrograda, pestis, gangraena, tam sicca, quam humida, erysipelas, varicellae putridae, etiam morbilli, eclampsia infantum ex refrigerio, seu alia causa, delirium, anxietas febrilis, rheumatismus, asthma convulsivum chronicum, mania, melancholia, furor uterinus, vermes, involuntarium seminis profluvium.

Dosis. A grano uno, ad quinque, decem, quindecim et ad drachmam unam. Pro externo usu, nisi sufficiat inspersio camphorae, tunc solvitur illa, vel in oleo expresso, vel mucilage gummi arabici, vel vitello ovi, vel aceto, vel spiritu vini.

CANNABIS semina. *Cannabis sativa*. L. cl. XXI. Ord. Pentandr. Planta annua colitur ubique in agris.

Odor vix ullus.

Sapor subfatuus.

Virtus emolliens, involvens, anodyna.

Usus. Gonorrhoea, leucorrhoea, icterus, dysuria inflammatoria.

Dosis. Seminum uncia dimidia, cum aquae uncii quatuor in emulsione; vel cum uncii sex aquae in infuso datur; itidem semina contusa, et cum lacte cocta, cataplasma emolliens constituunt.

CANTHARIDES. *Meloë vesicatorius*. *Litta vesicatoria*. L. cl. V. Ord. Insecta. Coleoptera. In Rossia temperata, praecipue districtu Samarskoy, et vicino illi Sergievskoy, ad Fraxinum, Loniceram tataricam, aliasque plures arbores occurrunt.

Odor et Sapor nauseosus, teterrimus, piceus.

Virtus irritans, rubefaciens, vesicans, exulcerans, absorpta resolvens. In exigua dosi diuretica, diaphoretica.

Usus. Interne; Rabies canina, ischuria frigida,

seu paralytica, enuresis, hydrops, gonorrhoea chronica. Externe, ulcera cacoëthica, paralysis, asthma, morbi cutanei chronici.

Dosis. Granum unum in pilulis; sive sub forma tincturae.

Externe in emplastris.

CARDAMOMI MINORIS fructus. *Amomum Cardamomum*. L. cl. I. Ord. Monogyn. Planta perennis Indiae orientalis, nominatim Iavae, crescens locis paludosis.

Odor fragrans.

Sapor grate aromaticus, amaricans, subcamphoraceus.

Virtus excitans, calefaciens, stomachica, diaphoretica, subantispasmodica.

Usus. Languor ventriculi, colica flatulenta.

Dosis. A granis duobus, quatuor, ad sex. Purgantibus apte admiscetur, ne tormina cieantur.

Variae Cardamomi numerantur species, ut: C. C. maius, C. medium s. Zeylanicum, C. minus s. Malabaricum, quod superat vi reliquas.

CARDUI BENEDICTI herba. *Centaurea Benedicta*. L. cl. XIX. Ord. Polyg. Frustran. Planta annua in hortis nostris medicis copiosa colitur.

Odor ingratus, quem sicca facile perdit.

Sapor intense amarus, non nauseosus, inhaerens.

Virtus antacida, corroborans, stomachica, sudorifera, anthelmintica, diuretica.

Usus. Anorexia, cachexia, arthritis, febres intermittentes, obstructions viscerum, icterus.

Dosis. Drachmae duae cum aquae unciiis quatuor infusum.

Herba raro usurpatur, cuius infusum aqua frigida brevi tempore factum gratam, diuturniori autem aquae super planta statione ingrati amaritiem, prae se fert; at eius decoctum fortius est valde nauseosum; Extractum eius aquosum optimum esse censetur.

CARDUI TOMENTOSI herba recens. *Onopordon Acanthium*. L. cl. XIX. Ord. Polygam. aequal. Planta biennis in Rossia australi spontanea, et septentrionali, in hortis colitur.

Odor nullus.

Sapor amaricans.

Virtus anticancroſa.

Usus. Succus expressus linteo filatim carpto exceptus carcinomati faciei, felici cum successu applicatur.

CARICAE PINGUES. *Ficus Carica*. L. cl. XXI. Ord. Trioec. Arbor in provincia Astrachanensi ad Terek fluvium colenda.

Odor recentium vix ullus.

Sapor dulcis, in cucumerinum leniter incidens; masticata bacca mucilaginoso.

Odor siccarum subunguentaceus.

Sapor dulcis, melleus, gratus.

Virtus nutriens, emolliens, lubricans, maturans, pectoralis, blande resolvens, dacty-

los, passulas, iuiubas superfluas omnino red-
dens.

Usus. Tussis, rauco, nephritis, stranguria,
angina, colica saturnina, furunculus, ab-
scessus.

Dosis. Uncia una cum aquae libra una ad
uncias octo decoctum; cataplasma; colluto-
rium.

Repudiandae sunt caricae durae insectis erosae,
colorisque profundi.

Succus foliorum expressus verrucas delet.

CARICIS ARENARIAE radix. *Carex arenaria*.
L. cl. XXI. Ord. Triandr. Planta perennis per
totam Rossiam, spontanea, in sabuletis circa Wol-
gam copiosissima.

Odor recentis non fortis, sed gratus, et sub
tali acrimonia, nares vellicans.

Sapor farinaceus, dulcescens simul balsamicus.

Virtus involvens, resolvens, demulcens.

Usus. Pituuta asperam arteriam gravans, affe-
ctiones rheumaticae et arthriticae, purpura
chronica.

Dosis. Uncia una ad libram aquae decoctum.
Huius efficaciae est *Carex Disticha* L.

CARVI semina, *Carum Carvi* L. cl. V. Ord.
Digyn. Planta biennis in temperatis Rossiae
spontanea.

Odor grate aromaticus.

Sapor aromaticus, moderate calidus, satis
gratus.

Virtus. discutiens, carminativa, lactifera.

Usus. Colica flatulenta, febris tertiana, lactis subitanea evanescentia.

Dosis. Drachmae duae cum aquae, aut iuris unciis sex infunduntur.

CARYOPHYLLI AROMATICI sunt flores nondum expansi prius fumo per aliquot dies expositi, et dein sole exsiccati. Dum Caryophylli ad maturitatem usque in arbore relinquuntur, Anthophylli dicuntur. *Caryophyllus aromaticus*. L. cl. XIII. Ord. Monog. *Eugenia caryophyllata*. Thunberg. Arbusculum sponte crescit in nova Guinea, pluribusque insulis adiacentibus.

Odor Caryophyllorum fortis, gratus, peculiaris, qualis floris Dianthi caryophylli.

Sapor aromaticus, fortis, calidus, acriusculus, subamaricans, fauces, linguamque calefaciens halitu fragrantissimo.

Virtus calefaciens, tonica, stomachica, emmenagoga, confortans.

Usus. Languens ventriculus. Oleum destillatum.

Dosis. A granis duobus, ad grana decem cum saccharo; drachma una et dimidia cum aquae aut vini unciis tribus infusum, quod cochleatim exhibetur.

Anthophylli curiositatis fere causâ in officinis servantur. Caryophyllorum oleum destillatum denti dolenti gossypio inditum sedat dolorem et cariem. Hoc oleo, cum unguinis mixto, membra paralytica feliciter fri-

cantur; Simili etiam excipiente illud, ad ventriculum roborandum, in colica flatulenta, diarrhoea abdomini inungitur.

CARYOPHYLLATAE seu **GEI URBANI** radix. *Geum urbanum* L. cl. XII. Ord. Polygyn. Planta perennis vulgatissima per Rossiam ad sepes, et in umbrosis.

Odor siccae nullus, recentis caryophyllaceus.
Sapor stypticus, amarus.

Virtus adstringens, tonica, sudorifera, antiseptica, febrifuga, praestans corticis peruviani, succedaneum.

Usus. Atonia, diarrhoea, dysenteria, fluor albus, haemorrhagiae, affectiones hystericae, colicae flatulentaе, tussis convulsiva, ulcera scorbutica, fistulae, laxitas gingivarum, febres intermittentes.

Dosis. Radicis pulveratae grana triginta, vel quadraginta, ad drachmam unam; unciae duae radicis in aquae libris duabus ad consumptionem quartae partis decoctum.

Radix, Aprili, s. Maio, effossa probe custodiatur.

CASCARILLAE cortex. *Croton cascarilla* L. cl. XXI. Ord. Monadelph. Frutex in Iamaica, et insulis Bahamicis, Floridae vicinis, obviuus.

Odor aromaticus, non ingratus.

Sapor aromaticus, amaricans, accensus cortex fumum moschatum temulentum edit.

Virtus tonica, stomachica, diaphoretica.

Usus. Diarrhoea, dysenteria, debilitas, alvique laxitas.

Dosis. A granis decem, ad viginti, vel triginta, in pulvere; drachma una cum vini unciiis sex infusum; externe suffitus.

CASSIAE LIGNEAE cortex. *Laurus cassia.*
L. cl. IX. Ord. Monogyn. Arbor Indiae orientalis et Malabariae propria.

Odor Cinnamomeus, debilis.

Sapor gratus, dulcescens, cinnamomeus, debiliior, vix acris; masticando, seu coquendo, mucilaginosus fit.

Virtus excitans, resolvens, pellens, sudorifera.

Usus. Debilitas, vomitus.

Dosis. Drachma dimidia pulveris; drachma una cum aquae aut vini unciiis sex infusum.

Mucilago eius praecipuum discrimen a Cinnamomo efficit.

CASTOREUM sunt folliculi Castoris ad utrumque eius urethrae latus prope praeputium haerentes, unde exempti, et infumatione contra corruptionem defensi, substantiam siccam, sed non aridam, quae semper est reiicienda, continent.
Castor Fiber. L. cl. I. Ord. Glires. E Sibiria venit.

Odor graveolens.

Sapor amaricans.

Virtus carminativa, antispasmodica, nervina, anodyna, emmenagoga.

Usus. Hysteria, colica flatulenta, vertigo, epilepsia, apoplexia, lethargus.

Dosis. Grana quatuor, ad decem, et viginti, cum Valeriana in pulvere. In clysmate ad drachmam integram.

CENTAUREI MINORIS herba. *Gentiana centaureum*. L. cl. V. Ord. Digyn. Planta annua in Russia temperata spontanea.

Odor debilis, vix ullus.

Sapor amarissimus.

Virtus tonica, resolvens, anthelmintica.

Usus. Atonia, cachexia, arthritis, icterus, febris tertiana, obstructio viscerum, scabies, ulcera sinuosa, et fistulosa.

Dosis. Drachmae duae cum aquae unciis quatuor infusum.

CEPAE radix. *Allium cepa*. L. cl. VI. Ord. Monogyn. Planta perennis in tota Russia hortensis.

Odor fragrans, alliaceus, graveolens.

Sapor subdulcescens, acris; recens rescissa radix oculos volatili suo principio ferit, et lacrymas elicit.

Virtus stimulans, maturans, rubefaciens, diaphoretica, diuretica.

Usus. Abscessus, tumores maturandi, retentio lotii, hydrops, calculus, condylomata callosa, scorbutus.

Dosis. Numero tres, cum iuris libra una decoctum; cataplasma; succi unciae duae cum tantillo sacchari.

CERA apum. Est substantia tenax, ab *Ape mellifera*. L. cl. V. Ord. Hymenoptera, ex antherarum polline collecta, elaborata et in favos una cum melle reposita, et ex favis, melle expresso, ope ignis et aquae eliquatur, et in varios panes efformatur. Habetur cera citrina, s. flava, quae naturalis molliorque est; et cera alba, quae iterata lotura ad solem albescit, et fragilior inodoraque evadit.

Odor et *Sapor* cerae citrinae melleus.

Virtus emolliens, plastica.

Usus, Emplastra, cerata, candelulae, et spongiae ceratae.

CERASORUM RUBRORUM ACIDORUM fructus. *Prunus cerasus*. L. cl. XII. Ord. Monogyn. Arbor per Rossiam australem in hortis frequentissima.

Odor, nullus.

Sapor dulcis, acidus.

Virtus refrigerans, antiseptica, blande resolvens, largiori copia alvum lubricans, et lotium pellens.

Usus. Febris acuta, scorbutus, colluvies biliosa, obstructions viscerum, mania.

Dosis. Cerasorum exsiccatorum unciae duae cum aquae libra una, ad uncias octo, decoctum.

CEREFOLII s. **CHAEROPHYLLI** herba, succus. *Scandix cerefolium*. L. cl. V. Ord. Digyn. Planta annua in tota Rossia hortensis.

Odor recentis gratus, balsamicus, debilis, nisi fricetur.

Sapor aromatico-balsamicus, ad foeniculum accedens.

Virtus aperiens, pectoralis, diuretica, lactifera.

Usus. Tussis inveterata, scabies, herpes, asthma, hydrops, febres lentae, indurationes mammarum, et aliarum glandularum infarctus, icterus.

Dosis. Herbae recentis uncia una in sero lactis calide infunditur; vel succi eius unciae duae cum sero lactis mane ac vespere dantur.

CERUSSA. Est plumbum, vapore acetī in calcem albam versum, sub forma lamellarum friabilium, quae est sincerrima et praefertur illi, quae sub forma panum conoideorum charta involutorum prostat, quaeque dicitur vel Veneta, vel Belgica. Variis Rossiae in locis, etiam Petropoli, praecipue in urbe Jaroslavl conficitur.

Odor cretaceus.

Sapor adstringens.

Virtus exsiccans, discutiens.

Usus. Varia praeparata.

CHAMAEDRYOS herba. *Teucrium chamaedrys*. L. cl. XIV. Ord. Gymnosperm. Planta perennis in Russia australi spontanea.

Odor subfragrans.

Sapor amarus.

Virtus incidens, roborans, tonica, emmenagoga.

Usus. Arthritis, cachexia, asthma, tussis inveterata, hypochondriacae affectiones, mensium suppressio, chlorosis.

Dosis. Drachma una cum aquae unciis quatuor infusum.

Veronica Chamaedrys non est substituenda *Teucrio chamaedri*.

CHAMAEMORI baccae. *Rubus chamaemorus*.
L. cl. XII. Ord. Polyg. Planta perennis in Russia septentrionali et Sibiria frequens.

Odor vix ullus.

Sapor grato-acidulus.

Virtus refrigerans, sitim exstinguens, praestans panacea scorbuticorum.

Usus. Febres, scorbutus, phthisis, haemoptoe.

Dosis. Baccae pro lubitu crudae, vel conditae comeduntur.

CHAMAEPITYOS herba. *Teucrium chamaepitys*. L. cl. XIV. Ord. Gymnosperm. Planta annua in Rossiae australis, glareosis, arenosisque campis, circa Volgam, Simbirsk, usque ad Kamyshensk frequens.

Odor fragrans.

Sapor amarus, aromaticus in Rosmarinum incidens.

Virtus, Usus, Dosisque Chamaedryos.

CHAMOMILLAE VULGARIS flores, herba. *Matricaria chamomilla*. L. cl. XIX. Ord. Polygam. superfl. Planta annua in Russia australi spontanea.

Odor florum fragrans, gratus, fortis.

Sapor amarus, calidiusculus.

Virtus discutiens, antiseptica, stomachica, resolvens.

Usus. Febres intermittentes, colica flatulenta, spasmodica, nephritica, tormina, flatus, dysenteriae, cardialgia, varii dolores post partum.

Dosis. Florum uncia dimidia cum aquae bullientis unciis octo infusum. Externe in sacculis siccis, vel humectatis; sive cataplasmate, clysmate, balneo, pediluvio.

CHAMOMILLAE ROMANAE flores. *Anthemis nobilis*. L. cl. XIX. Ord. Polygam. superfl. Planta annua in tota Rossia hortensis.

Odor fragrans, balsamicus, gratus.

Sapor aromatico-amaricans, calidiusculus.

Virtus, Usus, Dosisque praecedentis.

Non pleni flores, sed cum disco eorum a Pharmacopolis elegantur.

CHELIDONII MAIORIS radix, herba recens. *Chelidonium maius*. L. cl. XIII. Ord. Monogyn. Planta perennis locis ruderatis, umbrosis, et ad sepes copiosissima.

Odor graviusculus.

Sapor acris, subamaricans, inhaerens.

Virtus recentis acris, purgans, abstergens, siccae aperiens, diuretica.

Usus. Obstructio viscerum, icterus sine febre, hydrops.

Dosis. Radicis recentis drachmae quatuor, seu exsiccatae drachmae duae, cum aquae, seu iuris libra una ad uncias sex decoctum, quod per intervalla cochleatim exhibetur; succus ex foliis, vel ex tota herba expressus, ad aliquot guttulas, aliquoties de die, in commodo vehiculo propinatur, quique externe verrucas, herpes, pterygium delet. Extracti scrupulus unus, ad duos.

CHINAE CORTEX, CORTEX PERUVIANUS.

Cinchona officinalis. L. cl. V. Ord. Monogyn. Arbor procera, in regni Peruviani praefecturae Quito montibus copiosa, tractum ultra quinquaginta milliaria extensum occupans. Optimus est ille cortex, qui ex gracilioribus ramis est convolutus, modice crassus, attamen ponderosus, externe scaber, fuscus aut nigricans vel griseus, interius vero colorem cinnamomeum, vel paulo obscuriorem prae se fert, fractus non in fibras lignosas discerpitur, vel in farinam cariosam dilabitur, et in fragmentis eius puncta splendentia apparent.

Odor aliquantum mucidus.

Sapor amarus, modice adstringens cum vestigiis mitis aromatis.

Virtus antiseptica, febrifuga, roborans, stomachica.

Usus. Febres intermittentes, continuae ex intermittentibus natae, remittentes perniciosae, nervosae, putridae, pestis, variolae, et morbilli mali moris, morbi periodici, sudores

colliquativi, raucedo post morbillos, phthisis, hydrops, haemoptysis, tabes dorsalis, affectiones convulsivae, tussis convulsiva, haemorrhagiae ex causa putrida, icterus, arthritis, gangraena, caries, cancer et spina ventosa.

Dosis. A scrupulo uno, ad drachmam unam supraque; uncia una cum aquae libra una, ad uncias octo decoctum; vel pulveris subtilissimi uncia una cum aquae unciis octo frigidae per viginti quatuor horas infusum, quae vasculatim propinantur. Tripla dosis in clysmate.

Indicatur bonitas corticis sequenti experimento: coquitur eius portio in tantillo aquae, deinde in ampullam infunditur; quodsi tum decoctum quamdiu calidum est, rubicundum apparet, sed ut primum refrixerit et sedimentum deiecerit, pallidum, bonae notae est.

CHINA RUBRA, CORTEX PERUVIANUS RUBER. Ex truncis, et ramis crassioribus eiusdem arboris, quae corticem vulgarem erogat, detrahitur.

Odor nullus.

Sapor amaritiei vulgari cortici antistans.

Virtus praestantior cortice chinae vulgaris.

Usus, Dosisque praecedentis.

CICHOREI radix, herba. *Cichoreum intybus.* L. cl. XIX. Ord. Polygam. aequal. Planta perennis in Rossia temperata spontanea et in hortis colitur.

Odor herbae recentis nullus.

Sapor grate amaricans.

Odor radiceis recentis nullus.

Sapor intensius amaricans.

Virtus aperiens, tonica, diuretica, antiscorbutica.

Usus. Scorbutus, obstructio hepatis, icterus.

Dosis. Radiceis exsiccatae uncia dimidia cum aquae libra una, ad uncias octo decoctum; vel succi recentis unciae duae cum iusculi libra una.

Radix eligatur carnosa, et reiiciatur lignosa.

CICUTAE, seu CONII MACULATI herba;
Succus inspissatus. *Conium maculatum*. L. cl. V.
Ord. Digyn. Planta biennis in Rossia temperata crescens.

Odor foetidus, murinus, deficiente hoc odore, planta ut inefficax, reiicienda est.

Sapor leniter aromaticus, subnauseosus.

Virtus resolvens, anodyna, suppurationem promovens, diuretica.

Usus. Scrophulae, ulcera sordida et syphilitica, cancer scrophulosus, scabies maligna, fistulae, fluor albus, arthritis, rheumatismus chronicus, cataracta incipiens, icterus pertinax, spina ventosa, tussis convulsiva, ozaena, polypus narium.

Dosis. Pulveris herbae, a granis tribus ad scrupulum unum cum saccharo; Extracti a grano uno, ad scrupulum de die datur.

Tres in re medica notandae veniunt Cicutae;

Cicuta maior, seu *Conium maculatum*; *Cicuta aquatica*, seu *Cicuta virosa*; *Cicuta minor*, seu *Aethusa cynapium*. Haeque species probe inter se distinguendae sunt.

In collectione *Conii maculati* cave ne confundas cum *chaerophyllo bulboso* L. *aethusa cynapio* L. et *phellandrio* L.

CINERES CLAVELLATI. Est sal alcalinus vegetabilis, fixus, impurus, in massam variae magnitudinis inspissatus, ex cineribus vegetabilium paratus, quique certo modo depuratur.

Odor nullus.

Sapor lixiviosus.

Virtus. Vide cineres clavellatos depuratos P. II.

CINNAMOMI Cortex; *Cassiae flores.* *Laurus cinnamomum.* L. cl. IX. Ord. Monogyn. Arbor, quoad corticem, praestantissima, in Zeylona habitat.

Odor gratissime aromaticus.

Sapor dulcescens, suavissimus, moderate pungens cum levi adstrictionis sensu.

Virtus analeptica, excitans, stimulans, stomachica, carminativa.

Usus. Debilitas ventriculi, flatus, vomitus.

Dosis. Scrupulus unus ad drachmam dimidiam pulveris; drachma una cum aquae, aut vini unciiis sex infusum.

Flores *Cassiae* ita dicuntur flores *Lauri cassiae* L., nondum perfecte explicati, odore, saporeque *cinnamomum* aemulantur, cum ad-

stringente quodam sensu, sed non adeo manifesto.

Virtus ut in cortice.

CITRI Malum, ex quo caro, seu pulpa; succus expressus; cortex, cuius exterior pars flavedo, interior vero albedo vocatur. *Citrus medica*. L. cl. XVIII. Ord. Icos. Arbor in Media, et Persia spontanea, in Rossiae vero caldariis colitur.

Odor flavedinis recentis fragrans, gratissimus.

Sapor aromaticus, calidiusculus, subamarus.

Odor pulpae debilis, gratus.

Sapor intensius acidus purus.

Virtus flavedinis calefaciens; cardiaca, stomachica; pulpae refrigerans, antiscorbutica, diuretica; florum analeptica.

Usus Flavedinis. Atonia, flatus, condimentum cibi et medicaminum. Pulpae; febres phlogisticae, biliosae, putridae, scorbutus calidus, stomachace, calculus, colica biliosa, palpitationes cordis hystericae.

Dosis. Succii expressi uncia una in julepo datur cum saccharo; corticis citri exsiccati uncia dimidia ex aquae unciis octo ad uncias sex decoctum, a drachma dimidia ad duas pulvis.

Oleum de cedro vulgo, essentia limonum est oleum aethereum, quod ex utriculis flavae corticis mali citrei partis, varia encheiresi elicitur.

COCHLEARIAE herba recens. *Cochlearia*

officinalis. L. cl. XIV. Ord. siliculosa. Planta an-
nua ubique hortensis.

Odor subnasturcinus, debilis.

Sapor amaricans, os et fauces mordens.

Virtus antiscorbutica, aperiens, diuretica.

Usus. Scorbutus, ex eoque gingivarum affe-
ctiones, paralysis.

Dosis. Uncia dimidia, vel integra quotidie
crude comeditur, vel cum Acetosellae con-
nubio; vel eadem quantitas cum iuris libra
una ad uncias decem decoquitur; vel in
electuario datur; vel externe succus tantillo
aluminis mistus, ad exulcerationes oris scor-
buticas applicatur.

In longum tempus servatur herba per strata
in magnis vasis condita.

COLCHICI radix recens. *Colchicum autum-*
nale. L. cl. VI. Ord. Trigyn. Planta perennis
circa Terek, et in aliis locis in pratis argillaceis
copiosa.

Odor recentis tempore aestivo hircinus.

Odor recenter resectae irritans nares faucesque
feriens.

Sapor acris.

Virtus diuretica, drastica.

Usus. Hydrops, complicatus, hydrocele, hy-
drophthalmus, asthma.

Dosis. Sub forma oxymellis colchici, cuius
drachma una bis, per diem, in vasculo in-
fusi cuiusdam, sensim ad unciam unam, sive
sesquialteram ascendendo.

Radix annotina, emarcida, et exsucca, reiicienda est, ovata, nucis iuglandis subinde magnitudinis, fovea, et crista laterali sursum instructa, interne alba, unice pro usu servanda est, sed existente radice squillae hac feliciter carere possumus.

COLLA PISCIUM. *Ichthyocolla.* Est gluten ex variis membranis internis, aliisque partibus paratum, praecipue ex *Acipenserum Sturione stellato*. L. cl. III. Ord. Amphibia. In fluviis Russiae australis, et Sibiriae.

Odor nullus.

Sapor glutinosus.

Virtus glutinans.

Usus. Emplastra adhaesiva, ut Anglicanum.

COLOCYNTHIDIS pulpa. *Cucumis colocynthis*. L. cl. XXI. Ord. Syngenes. Planta annua in Archipelago, et oriente crescens.

Odor pulpae debilis, nauseosus.

Sapor amarissimus, acriusculus.

Virtus purgans cum torminibus, drastica, abortiva.

Usus. Affectiones soporose, hydrops, vermes.

Dosis. Granum unum, duo, quinque cum gummi arabico in pulvere. Extracti aquosi a granis duobus ad sex.

Purgans est drasticum, usui externo clysmatico potius, et nunquam interno dicatum.

COLUMBO radix. Habitat in continente Asiae, et in urbe Columbo Zeylonae.

Odor frictae radice aromaticus.

Sapor ingrate amarus, modice pungens.

Virtus antiseptica, roborans.

Usus. Cholera, vomitus pertinaces, affectiones ventriculi, nausea gravidarum, alvi profluvia effrena, et febres biliosae.

Dosis. A granis quindecim, ad drachmam unam, omni trihorio cum aqua menthae simplicis.

Progressu temporis amarities minuitur, et facile haec radix cariosa evadit.

CONTRAIERVAE radix. *Dorstenia dracena.*

L. cl. XV. Ord. Monogyn. Planta perennis in nova Hispania crescens.

Odor fragrans, gravis.

Sapor subamaricans.

Virtus antiseptica, sudorifera, alexiteria, roborans, resolvens.

Usus. Febris lenta nervosa, exanthemata retropulsa, angina putrida, virium prostratio, dysenteria.

Dosis. Scrupulus unus ad drachmam dimidiam in pulvere; vel, in infuso ad drachmam sesquialteram.

Decoquendo aliquid virium perdit.

CORIANDRI semen. *Coriandrum sativum.*

L. cl. V. Ord. Digyn. Planta annua in Russia temperata hortensis.

Odor recentis graveolens, foetidiusculus.

Odor sicci aromaticus, graviusculus subgratus.

Sapor gratus aromaticus.

Virtus recentis suspecta, subnarcotica, sicci carminativa, lactifuga, hypnotica.

Usus. Hysteria, tertiana, flatus, languor stomachi.

Dosis. Drachma una pulveris, drachmae duae ad quatuor cum aquae, aut vini unciiis sex infusum.

CRETA ALBA. *Calx creta.* L. cl. III. Ord. Fossilia. Terrae. In Rossia australi, et Sibiria.

Odor nullus.

Sapor terreus.

Virtus absorbens, exsiccans.

Usus Acidum spontaneum, soda, aër fixus factitius.

CROCI stigmata. *Crocus sativus officinalis.* L. cl. III. Ord. Monogyn. Planta perennis spontanea in montibus Caucasi, aliisque Persicis in montibus, et vallibus, inde a Crimmiâ antiqua, usque ad Balaclava.

Odor fragrans, similis alcali volatili urinoso, mediocriter aromaticus.

Sapor aromaticus, subamaricans.

Virtus nervina, resolvens, antiseptica, antispasmodica, emmenagoga, diuretica.

Usus. Mensium suppressio, lochia retenta, tussis, vomitus, affectiones spasticae.

Dosis. Grana decem, ad viginti, in pulvere; externe scopo resolvendi, abscessus maturandi, quando nimirum stimulus inflammationi addendus est, vel dolores mitigandi,

adjicitur sacculis, cataplasmatibus, collyriis, unguentis, emplastris variis.

Crocus genuinus, et probus, coloris rutili esse debet, nec siccus, nec humidus nimis, texture tenacioris, et in placentas firmiores compactus, quae diremtae eundem colorem in intimis, ac in superficie prae se ferant, perit etiam vis aetate, unde annua instructus praestantior, nec diu contritus ob hanc jacturam servari debet. Optimus est ab oriente, sive ab Austria denominatus.

CUMINI seu Cymini semina. *Cuminum cyminum*. L. cl. V. Ord. Digyn. Planta annua in Rossia australi hortensis.

Odor fortis gravis aromaticus.

Sapor calidus, amaricans, ingratus.

Virtus discutiens, carminativa, diuretica, emmenagoga.

Usus. Colica flatulenta, hysteria, tympanitis, tumores frigidi.

Dosis. Drachma una pulveris; drachmae tres clyisma.

CUPRUM, AES, VENUS. *Cuprum nativum*. L. cl. II. Minerae. Metalla. Nerczinsk indigenum.

Odor proprius, si manu teratur.

Sapor metallicus, valde nauseosus, vix ex ore et lingua delendus.

Virtus corrosiva.

Usus. Praeparata.

CURCUMAE LONGAE radix. *Curcuma longa*. L. cl. I. Ord. Monogyn. Planta perennis Indiae orientalis, praecipue Amboinae, Malabaribus, Zeylonae civis.

Odor subfragrans quasi unguentaceus.

Sapor amaricans, subacris, et calorem mitem in ore excitans.

Virtus aperiens, diuretica.

Usus. Icterus, obstructio viscerum, suppressio menstruum, hydrops, febris intermittens.

Dosis. A scrupulo uno ad drachmam integram in pulvere aliquoties de die; vel in infuso; vel decocto ad drachmas duas.

Pro diversa solum figura, in officinis, vel nomine radicis *Curcumae rotundae*, vel *Curcumae longae* dicitur; usitatio tamen est in universum *Curcuma longa*, sed et haec parcius hodie aegris praecipitur.

CYDONIORUM fructus, semina. *Pyrus cydonia*. L. cl. XII. Ord. Pentagyn. Arbor ad fluvium Terek spontanea, in Ucraina hortensis.

Odor pomi fragrans.

Sapor adstringens, acidulus, vinosus.

Odor seminum nullus.

Sapor mucilagineus.

Virtus pomi refrigerans, restringens, antiputredinosa; seminum, obvolvens, leniens.

Usus Pomi. Morbi bilioso-putridi, saburra rancida; seminum externe, ambusta, fissurae, ophthalmiae, tenesmus, haemorrhoides coecae, aphtae.

Dosis. Succus fructus cochleatim.

Ex seminum drachma una cum aquae calidae
unciis sex obtinetur mucilago.

DAUCI VULGARIS, seu sativi radix. *Daucus carota* L. cl. V. Ord. Digyn. - Planta biennis in tota Russia fera et hortensis.

Odor radices recentis aromaticus, non ingratus.
Sapor dulcescens, leniter aromaticus.

Virtus nutriens, aperiens, anticancrosa, diuretica, anthelmintica.

Usus. Cancer scrophulosus, lumbrici, aphtae, stranguria, tussis, phthisis, recens ambustio, ulcera cacoëthica.

Dosis. Succus cochleatim, seu sub forma decocti, seu cataplasmatibus.

DICTAMNI ALBI radix. *Dictamnus albus* L. cl. X. Ord. Monogyn. In Sibiria. Planta perennis in australibus Rossiae et Sibiriae spontanea.

Odor recentis fortis, hircinus; sicci levis.

Sapor recentis debilis, amarus et aromaticus.

Virtus emmenagoga, anthelmintica, pellens, balsamica.

Usus. Epilepsia, vermes, suppressio menstruum, fluor albus.

Dosis. Drachmae duae cum aquae unciis sex infusum; scrupulus unus pulveris.

DIERVILLAE stipites. *Lonicera diervilla* L. cl. V. Ord. Monogyn. Frutex exiguus Canadensis in collibus nemorosis crescit, in hortis radices surculos copiosos protrudunt.

Odor et Sapor nauseosus.

Virtus pellens, antivenerea.

Usus. Dysuria, gonorrhoea, syphilis.

Dosis. Uncia una cum aquae libris duabus infusum, seu decoctum.

DIGITALIS folia, flores. *Digitalis purpurea.*

L. cl. IV. Ord. Angiosp. Planta biennis in campis apricis Rossiae australis crescit.

Odor nullus.

Sapor amarus, ingratus, acris.

Virtus emetico-drastica, exulcerans os, fauces, oesophagum, resolvens, maiori dosi venenata.

Usus. Scrophulae humidae, strumae, tumores indurati mammae, epilepsia, mania, hydrops pectoralis.

Dosis. Pulveris a grano uno, ad tria, bis, terve de die, sive drachma una cum aquae ferventis libris duabus per quatuor horas infusum, cuius uncia dimidia ad sesquiunciam bis, terve in die exhibetur; extracti a grano uno, ad decem. Butyro folia s. flores recepti in unguentis, seu cataplasmatibus, contra scrophulas adhibentur.

DULCAMARAE stipites. *Solanum dulcamara.* L. cl. V. Ord. Monogyn. Suffrutex in tota Rossia; ad sepes in nemorosis locis spontaneus.

Odor stipitum recentium gravis, nauseosus.

Sapor amaricans, postea subdulcescens.

Odor siccorum stipitum nullus.

Sapor magis amarus.

Virtus diuretica, sudorifera, emmenagoga, mundificans, antiscorbutica.

Usus. Rheumatismus, retentio mensium et lochiorum, dolores osteocopi, icterus, scabies, fluor albus, lues venerea, phthisis, herpes, oedema erisypelaceum, ulcera crurum.

Dosis. Stipitum siccorum et concisorum drachmae duae vel quatuor infunduntur cum aquae bullientis libra una, quae post moram semihorii per octavam horae partem una ebulliant, huius decocti modice frige-
facti mane et vespere duo vasa pro thea, prius cum lacte, postea sine eius connubio ingeruntur.

Stipites iuniores, vere, priusquam lignescant, colligendi sunt.

ELEMI gummi est massa solida, semipellucida, flavescens fere instar cerae cum immixta viredine, inter digitos frigidos friabilis, calore lentescens. *Amyris elemifera.* L. cl. VIII. Ord. Monogyn. Arbor Americae meridionalis.

Odor fragrans ad Anethum accedens.

Sapor gravis, amaricans.

Virtus digerens, suppurationem promovens.

Usus. Digestio, et sanatio ulcerum.

Resinae potius nomen meretur, quam gummi.

ENULAE radix. *Inula helenium.* L. cl. XIX. Ord. Polygam. superfl. Planta perennis in tota Rossia spontanea.

Odor siccae violaceus.

Sapor amarus, aromaticus et pungens.

Virtus incidens, resolvens, pectoralis, emmenagoga, antiscabiosa.

Usus. Tusses pertinaces epidemicae, asthma humidum, scabies, chlorosis.

Dosis. Drachma dimidia in pulvere, aut drachmae duae cum aquae unciis sex infunduntur; sive radix condita.

ERUCAE semina. *Brassica eruca*, seu *Sinapis alba*. L. cl. XV. Ord. Siliqu. Planta annua in hortis, et campis Rossiae australis sponte crescit.

Odor graviusculus.

Sapor acris et seminibus sinapeos nigrae consimilis, sed longe remissior.

Virtus sinapeos nigrae, sed debilior.

Usus. Hydrops.

EUPHORBII gummi seu Euphorbium. *Euphorbia officinarum*. L. cl. XI. Ord. Trigyn. Suffrutex in Africa perennans.

Odor vix ullus.

Sapor primum nullus, dein fauces et linguam, ut mille acus, pungens, inhaerens.

Virtus acris, irritans, inflammans, drastica, er rhina.

Usus. Externus, illeque cautissimus in carie ossium sub forma tincturae spirituosae.

FARFARAE, seu TUSSILAGINIS radix, folia, flores. *Tussilago farfara*. L. cl. XIX. Ord. Po-

lygam. superfl. Planta perennis in omnis Rossiae solo argilloso ad fossas vulgaris.

Odor foliorum debilis, florum leviter odor.

Sapor viscidus, leviter adstringens; *Florum* subdulcis.

Odor radicis nullus.

Sapor viscidus, subamarus.

Virtus pectoralis totius stirpis, praecipue radicis recentis.

Usus. Tussis, asthma, phthisis, morbi scrophulosi, tinea capitis, crusta lactea.

Dosis. *Florum* uncia una cum aquae unciis quatuor infusum; *radicis* uncia dimidia cum aquae unciis octo ad uncias sex decoctum.

FERRUM. *Ferrum selectum.* L. cl. II. *Minerae.* Metalla.

Odor proprius.

Sapor metallicus.

Virtus roborans, emmenagoga, haematopoetica.

Usus. Morbi externi et interni a laxitate, vel a menostasia orti.

Dosis. Limaturae martis ex ferro purissimo paratae a scrupulo dimidio, ad scrupulum unum cum saccharo, in pulvere; in pilulis cum extracto amaro datur.

FILICIS FOEMINAE radix. *Pteris aquilina.* L. cl. XXIV. Ord. Filices. Planta perennis in sylvis sterilibus, et dumetis asperis crescit.

Odor nauseosus.

Sapor viscidus, amaricans.

Virtus anthelmintica.

Usus. Lumbrici, taeniae.

Dosis. Drachmae duae cum melle; vel drachmae tres cum vino albo, ter vel quater de die; infantibus ad drachmam dimidiam in duas portiones divisam cum pauxillo lactis subjuncto purgante postero die.

FILICIS MARIS radix. *Polypodium filix mas.* L. cl. XXIV. Ord. Filices. Stirps perennis in sylvis totius Rossiae frequens.

Odor radices recentis debilis, subnauseosus.

Sapor substypticus, non ingratus, debiliter subaromaticus, vix dulcescens.

Virtus anthelmintica, emmenagoga, abortiens.

Usus. Taeniae.

Dosis. Drachma una pulveris, ad drachmas tres.

FLAMMULAE IOVIS folia, flores. *Clematis erecta.* L. cl. VIII. Ord. Polygyn. Planta perennis in tota Rossia spontanea.

Odor foliorum recentium debilis.

Sapor acris, fauces linguamque urens, diutius retentus eam rubefaciens, vesiculas excitans et exulcerans; siccorum vero mitior, acido-subdulcis, leniter adstringens, parum stimulanis; Florum tam siccorum, quam infusorum sapor cum constantia acris est.

Virtus antisyphilitica, solvens, diuretica, sudorifera.

Usus. Symptomata venerea, ut topi, dolores ossium nocturni, ulcèra sordida, fungosa,

scabies annosa, cephalaea dirissima, tumores duri circa articulos, melancholia.

Dosis. Foliorum drachmae duae cum sufficiente quantitate aquae ferventis per quadrantem horae, vase clauso infunduntur, et ebullitione per momentum subiuncta, coletur libra una, cuius unciae quatuor per diem bis, ter, vel quater exhauriuntur, Florum drachma una dicto modo infunditur.

Haec infusa fortiora fiunt ascendendo, hoc est, foliorum drachmae tres ad unciam dimidiam; florum duae drachmae ad tres. Foliorum pulveris grana tria cum dupla sacchari quantitate bis vel ter de die ad grana decem. Extracti herbae recentis ad granum unum per diem ascendendo ad duo, tria, cum sacchari albi drachma una. Saepe usus externus simul cum interno utiliter copulatur.

FOENICULI semen. *Anethum foeniculum.*

L. cl. V. Ord. Digyn. Planta biennis in Rossia temperata hortensis.

Odor seminum aromaticus, suavis.

Sapor calidiusculus, dulcescens.

Virtus carminativa, pectoralis, lactifera, aperiens, externe discutiens.

Usus. Tormina ex purgantibus, ophthalmia, vomitus, lacte destitutae puerperae.

Dosis. In pulvere grana viginti; drachmae duae aut tres in infuso.

FORMICAE cum Acervo. *Formica rufa* L. cl. V. Lepidoptera. In campis, et sylvis frequentissima.

Odor volatilis.

Sapor acidulus.

Virtus irritans.

Usus. Paralysis. Sub forma epithematis, sive ex aqua formicae coctae partibus paralyticis admoventur.

FRAXINI cortex. *Fraxinus excelsior*. L. cl. XXIII. Ord. Dioecia. Arbor in tota Rossia frequens.

Odor nullus.

Sapor amarus, austerus.

Virtus, adstringens, antiseptica.

Usus. Febris intermittens, haemorrhagiae, ulcera putrida.

Dosis. Corticis uncia dimidia cum aquae libra una cum dimidia ad libram unam decoctum; vel drachma dimidia in pulvere, omni trihorio, donec aeger unciam unam et dimidiam ingesserit.

FUMARIAE herba recens. *Fumaria officinalis*. L. cl. XVII. Ord. Hexandr. Planta annua in agris Rossiae temperatae spontanea.

Odor nullus.

Sapor ingratus, amarus, salinus.

Virtus aperiens, tonica, antiscorbutica.

Usus. Obstructiones viscerum, nominatim hepatis, icterus, morbi cutis, lepra, scorbutus.

Dosis. Drachmae duae cum seri lactis libra una infunduntur; vel succi expressi unciae duae ad quatuor, cum sero lactis, bis, de die; Conservae uncia dimidia; Extracti drachma una.

FUNGUS MELITENSIS. *Cynomorium coccineum.* L. cl. XXI. Ord. Monandr. Planta parasitica radicibus variarum arborum Lentisci, Myrti, in Malta, Italia, Mauritania, innascens.

Odor nullus.

Sapor stipticus, amaricans, salsus, recens succum vehit rubicundum.

Virtus restringens, roborans.

Usus externus. Ulcera cacoëthica, gingivae laxae, stomacace, pulveres dentifricii, haemorrhagiae.

Dosis. Drachma una cum seri lactis unciiis tribus infusum.

GALANGAE MAJORIS et MINORIS radix. *Maranta galanga.* L. cl. I. Ord. Monogyn. Planta perennis G. maior in Iava, Malabaria, G. minor in regno Sinensi crescit.

Odor maioris fragrans, minoris vero debilior et ignobilior.

Sapor aromaticus, penetrans, fervidus, linguam mordens.

Virtus calefaciens, incidens, stomachica.

Usus. Anorexia, paralysis linguae, atrophia membrorum.

Dosis. Grana decem ad viginti in pulvere, et externe efficacem sistit medicinam.

GALBANI gummi. Est gummi-resina, sicca, tenax, dum recens, coloris albidī, vetustate autem flavescentis, vel rufescentis, distincti maculis albidis, cuius praestantia ex pluribus numero lacrymis, sive unguibus, coloreque minus fusco diiudicatur. *Bubon galbanum.* L. cl. V. Ord. Digyn. Frutex Africanus.

Odor fortis, ingratus.

Sapor calidus, amaricans.

Virtus stimulans, resolvens, maturans, emmenagoga, antispasmodica.

Usus. Asthma, hysteria, tumores, flatūs, tussis inveterata.

Dosis. Drachma dimidia in pilulis; Cataplasma, unguentum, emplastrum.

Prostat etiam Galbanum in massis, quod etiam ferri potest; sed coloris luridi, fusci, spissitudinis cerae, etiam quoque Persicum spissitudine therebintinae praeditum, et faecibus multis nigris commixtum reiicitur.

GALLAE QUERCINAE sive **TURCICAE.** Sunt domicilia insecti cuiusdam Cynipis Quercus folii, *Quercus cerris.* L. cl. V. Insecta Lepidoptera, quae reperiuntur in foliis variarum quercus specierum. Arbor in Rossia australiori frequens.

Odor nullus.

Sapor acerbissimus, valde stipticus.

Virtus peradstringens, obstipans.

Usus. Herniae, maculae hepaticae, haemorrhagia, prolapsus ani, uteri, et aliae affectiones a relaxatione, ulcera putrida, gangraena.

Dosis. Interne nunquam; extus decocta stipitica in dictum usum parantur.

Orientales, Aleppenses, praesertim Turcicae reliquis praeferuntur.

GEI RIVALIS seu PALUSTRIS radix. *Geum rivale*. L. cl. XII. Ord. Polygyn. Planta perennis crescens in pratis subhumidis, et paludosis ubique copiosissima.

Odor debilis, mucosus.

Sapor stipticus, austerus.

Virtus febrifuga, adstringens, tonica.

Usus. Febres intermittentes, praecipue vernales, oedemata pedum, diarrhoeae diuturnae, haemorrhagia uteri, haemorrhoides nimiae, labes ventriculi ex laxitate.

Dosis. Ad scrupulos duos aliquoties de die in pulvere; uncia dimidia in infuso.

GENTIANAE LUTEAE seu RUBRAE radix. *Gentiana lutea*. L. cl. V. Ord. Digyn. Perennat in Alpibus montium temperatae Rossiae.

Odor debilis.

Sapor amarissimus.

Virtus tonica, anthelmintica, antispasmodica, febrifuga, antiseptica.

Usus. Cachexia, arthritis, icterus, febres intermittentes, obstructio viscerum, scrophulae,

ulcera fistulosa, vermes. Extus ad dilatanda vulnera, et sordida ulcera.

Dosis. Ad drachmas duas per diem in pulvere, seu infuso; extracti aquosi grana decem.

In locum huius surrogati possunt sequentes species, ut: *Gentiana purpurea*, *campestris*, *pneumonanthe*, *cruciata*, *amarella* L. Non confundatur haec radix in collectione cum *Ranunculo thora* L.

GEOFFROYAE IAMAICENSIS cortex est cinereus, et subinde rubri vel ferrei coloris, maculis distinctus, epidermis deglubitur facile, cortex subiectus, si siccus evaserit, refert ferrum rubigine correptum, et superficies interna est cinerea, et quoad externum habitum cum cortice cascarillae comparatur. *Geoffrøya inermis* Schreb. L. cl. XVII. Ord. Decandr. Arbor in Iamaica frequens.

Odor subnauseosus.

Sapor acris, amaricans.

Virtus diuretica, anthelmintica, purgans, nimia dosi emetica.

Usus. Lumbrici, ascarides.

Dosis. In pulvere, pro purgante, robusto homini ad grana triginta; Iuveni, viginti, bienni vel trienni, quatuor; decoctum vero melius vermes necat, cuius uncia una cum aquae unciis triginta duabus coquitur ad remanentiam unciarum octo, colaturae additur saccharum. Huius decocti robustus cochlearia quatuor; Iuvenis tria; infans dictae aeta-

tis unum cochlear mane, per tres, seu quatuor dies ascendendo capiat. Extracti a granis tribus, ad quinque et ultra.

Ne bibatur aqua frigida durante effectu huius medicinae.

GLYCYRRHIZAE sive LIQUIRITIAE radix.
Glycyrrhiza glabra. L. cl. XVII. Ord. Decandr.
Planta perennis in australi Rossia ad Iaicum, et Volgam, copiosissima.

Odor debilis.

Sapor intense dulcis, non nihil mucilaginosus, coctione ingrate amarescit.

Virtus emolliens, edulcorans, pectoralis, sitim extinguens.

Usus. Tussis, raucedo, arthritis, rheumatismus, sitis hydropicorum, stranguria, asthma.

Dosis. Uncia dimidia cum aquae unciiis octo infusum; pulvere asperguntur pilulae.

Glycyrrhiza echinata L. commode substituitur
Glycyrrhizae glabrae.

GRAMINIS radix. *Triticum repens*. L. cl. III.
Ord. Digyn. Perenne in tota Rossia ad sepes crebrum, pestis quoque vulgaris est agrorum, et hortorum.

Odor frumentaceus.

Sapor debiliter dulcescens.

Virtus blande resolvens, aperiens, demulcens.

Usus. Obstructio viscerum, febres intermittentes, icterus a calculis felleis, pituita pulmones gravans, hypochondriacum malum.

Dosis. Uncia una cum aquae unciis quatuordecim ad remanentiam librae unius decoctum; succus ad aliquot uncias, quovis die.

GRATIOLAE herba, radix. *Gratiola officinalis*. L. cl. II. Ord. Monogyn. Planta perennis in tota Rossia spontanea.

Odor nullus.

Sapor intense amarus, nauseosus, siccae debilior.

Virtus purgans, hydragoga quandoque emetica, simul anthelmintica.

Usus. Hydrops, tumores oedematosi pedum, arthritici, ulcera inveterata.

Dosis. Pulveris scopo purgandi ad scrupulum unum; extracti drachma dimidia in pilulis; herbae drachma una cum aquae unciis quatuor infusum; externe, epithema.

GUAIACI lignum; gummi. *Guaiacum officinale*. L. cl. X. Ord. Monogyn. Arbor in America meridionali spontanea.

Odor ligni debilis, resinosus.

Sapor amaricans, acriusculus.

Odor gummi seu resinae nullus, at prunis injectae gratus, aromaticus.

Virtus sudorifera, diuretica, mundificans, subcalefaciens, antivenerea.

Usus. Syphilis, arthritis, podagra, morbi chronici cutis, rheumatismus, asthma convulsivum, diathesis pituitosa.

Dosis. Rasurae ligni uncia una cum aquae

libra una ad uncias octo decoctum. Resinae grana quinque, decem, viginti, ad drachmam dimidiam.

GUMMI ARABICUM. *Mimosa nilotica*. L. cl. XXIII. Ord. Monoec. Arbor sabuloso solo crescens in Arabia petraea, et Aegypto, in regno Senegalensi, praecipue in insula Sor, et vicina insula St. Ludovici, prope ostium fluvii Niger.

Odor et Sapor nullus.

Virtus obvolvens, incrassans, leniens, olea, resinas, balsama, mercurium vivum cum aqua subigens.

Usus. Dysenteria, tenesmus, diarrhoea, tussis, raucitas, stranguriae, haemorrhoides; extus, erosae mammarum papillae, et aliae partes excoxiatae.

Dosis. Drachma dimidia bis, ter de die; in solutione uncia ad aquae libram unam.

Gummi Senegal cum hoc viribus convenit.

GUMMI GUTTAE. Est succus gummi-resinosus, in officinis forma placentarum largarum, vel Magdaleonum insignium prostat, coloris ex flavo rufi, extus multo obscurioris, nitens, friabilis, non nihil pellucens, humectatus in pallidam flavedinem mutatur, qui probae notae est, carere sabulo aliisque quisquiliis debet. *Guttaefera vera* Koenig. *Cambogia gutta* L. cl. XIII. Ord. Monogyn. Arbor crescens in regno Siamensi prope locum Cambodiae vicinum, item in Zeylona.

Odor nullus.

Sapor initio nullus, dein acris cum siccitatis faucium sensu subsequo.

Virtus purgans, hydragoga, resolvens, subemetic.

Usus. Hydrops, taeniae, asthma, pituitaria diathesis.

Dosis. A granis duobus ad decem pulveris cum saccharo; in pilulis cum extracto amaro.

HELLEBORI ALBI radix. *Veratrum album*.
L. cl. XXIII. Ord. Polygam. Monoec. Planta perennis in temperata Rossia et Sibiria spontanea.

Odor recentis ingratus; siccae vero nullus.

Sapor nauseosus, acerrimus, fauces adurens, diu inhaerens.

Virtus abstergens, irritans, sternutatoria, venenata, emetica, anthelmintica, drastica.

Usus externus. Herpes exulceratus et crustaceus, tinea, pediculi, in forma decocti, vel unguenti; interne, morbi chronici, ut mania, melancholia, morbus comitialis, rabies canina.

Dosis. Grana duo ad tria, quatuor, quinque, ad sex; scrupulus unus cum aquae uncii sex infusum, cuius drachma dimidia datur.

Vere colligitur, et rejecta interna parte lignosa ad usum servetur.

HELLEBORI NIGRI fibrae, quae ex crasso capitulo radice innumerae emittuntur, aliquot pollices longae, extus nigrae, intus albae. *Hel-*

leborus niger. L. cl. XIII. Ord. Polygam. Planta perennis in Rossia australi spontanea.

Odor nauseosus.

Sapor acris, leviter amaricans, inhaerens; recentium acrior; diu servatarum vix acris, nisi diutius masticantur.

Virtus recentium venenata, rubefaciens, vesicans; recens siccatarum emetica, purgans, emmenagoga; diu conservatarum vix purgans, alterans, diuretica.

Usus. Lepra, scabies foetida, melancholia, hypochondriasis, mania, hydrops, epilepsia.

Dosis. A drachma una ad tres cum unciiis octo aquae infusum, cuius cochleare minimum cum tepidae haustu bis de die, ascendendo, bibitur; extracti a granis tribus, sex, decem, ad viginti, ter, per diem.

Non bene Hellebore nigro substituitur *Adonis vernalis*, *Trollius europaeus*, *Actaea spicata*, *Arantia maior* L.

HELMINTHOCHORTON. *Fucus Helminthochorton* de la Tourrette. *Conferva dichotoma*. L. cl. XXIV. Ord. Algae. In mari, quod Corsicam alluit, colligitur.

Odor marinus, nauseosus.

Sapor salinus.

Virtus anthelmintica.

Usus. Lumbrici, taeniae, ascarides.

Dosis. A granis duodecim ad triginta cum melle, infantibus trium annorum; adultis a drachma dimidia ad duas; seu in decocto,

Helminthochorti uncia dimidia cum aquae fluviatilis unciis sex coquitur, colaturae cum expressione unciis quatuor, mellis despumati uncia una additur, cuius decocti uncia una pro dosi esto. Sufficiunt saepe tria praeibia quantitatis dictae Helminthochorti.

* HIPPOCASTANI cortex. *Aesculus hippocastanum*. L. cl. VII. Ord. Monogyn. Arbor Asiae septentrionalis, hodie copiosissime per totam Europam colitur.

Odor corticis nullus.

Sapor adstringens, grate amarus.

Virtus praestans febrifuga.

Usus. Febres intermittentes, gonorrhoea ex atonia.

Dosis. Drachma una et dimidia pulveris, omni quadrihorio, cum aqua pura ingeritur; unciae duae cum aquae mensura una et dimidia ad remanentiam mensurae unius decoctum; extracti drachma una, in aquae cinnamomi uncia una soluti, omni trihorio, guttae sexaginta.

Colligi cortex debet ex ramis aetate non nimis provectis, nec nimis teneris, sub deglubendo, alburnum simul adhaerescit, quod antea cultro auferendum est, ne corticis efficaciam minuat.

HORDEI semen crudum. Semen decortatum, perlatum, Maltum, sub incipiente vegetatione mox siccatum. *Hordeum distichum*. L. cl. III. Ord. Digyn. Planta annua seritur in agris.

Odor nullus.

Sapor farinaceus.

Virtus seminis crudi et perlati magis obvolvens, et plus, quam avena, nutriens; malti, antiseptica, alvum solvens.

Usus seminis crudi vel mundati. Febres inflammatoriae; Malti. Ulcera putrida et scorbutica, scrophulae, item tumores oedematosi, diarrhoea continua.

Dosis. Hordei mundati unciae duae cum aquae libris duabus, ad remanentiam unciarum sedecim decoctum. Malti librae duae triplo aquae ferventis perfunduntur, et per tres, vel quatuor horas, vase probe clauso digeruntur, subsequa decantatione. Hoc potulentum per diem consumitur.

HYOSCIAMI folia. *Hyosciamus niger.* L. cl. V. Ord. Monog. Planta biennis ubique ad vias, et in fimetis frequens.

Odor herbae recentis narcoticus, ingratus, contusae tabacinus.

Sapor fatuus.

Odor siccorum debilis.

Sapor nullus, vix acriusculus.

Virtus narcotica, phantastica, antispasmodica, emmenagoga, extus resolvens.

Usus internus. Paralysis, palpitatio cordis, mania, convulsiones, melancholia, epilepsia, cephalalgia inveterata, colica saturnina; Externus. Tumores duri, scirrhus et convulsiones a nervo laeso.

Dosis. Extracti a grano uno, ter, de die, sensim ascendendo ad grana octodecim per diem; cataplasma ex foliis.

HYSSOPI herba. *Hyssopus officinalis*. L. cl. XIV. Ord. Gymnosp. Planta perennis in Sibiria spontanea, atque in hortis ubique colitur.

Odor siccae et recentis fragrans.

Sapor calidiusculus, aromaticus, amaricans.

Virtus resolvens, incidens, irritans.

Usus. Morbi pectoris frigidi, tussis, angina pituitosa, asthma.

Dosis. Drachmae duae cum aquae unciiis quatuor infunduntur.

JALAPPAE radix est solida ponderosa, externe nigricans, rugosa, interne obscure grisea, striis nigris variegata, et quo ponderosior est, pluribusque striis distinguitur, eo praestantior. *Convolvulus jalappa*. L. cl. V. Ord. Monogyn. Planta perennis crescens in Mexicano regno, Veracruce, et, ex urbe Xalapa, in Europa venit.

Odor cum in pulverem teritur, nauseosus.

Sapor acriusculus, diutius inhaerens, ingratus.

Virtus purgans, hydragoga, anthelmintica.

Usus. Saburra intestinorum, vermes, hydrops.

Dosis. A scrupulo uno ad duos pulveres. Resinae a granis tribus, ad octo, et decem, cum sapone, vel vitello ovi.

Ex libra una radicis unciae tres et dimidia, cum sesquidrachma, resinae eruuntur.

JASMINI flores. *Jasminum officinale*. L. cl. II. Ord. Monogyn. Frutex in hibernaculis copiosus colitur.

Odor suavissimus, specificus.

Sapor subamaricans.

Usus. Olea infusa, odorata.

Deficientibus floribus Iasmini, flores *Nyctanthes*, *Philadelphi coronarii* L. recte substituantur.

IMPERATORIAE radix. *Imperatoria ostruthium*. L. cl. V. Ord. Digyn. Planta perennis per Rossiam temperatam cultu facilis.

Odor aromaticus.

Sapor calidus, pungens, totum os replens, tenaciter inhaerens.

Virtus apophlegmatisans, stimulans, sudorifera, diuretica, carminativa.

Usus. Retentio urinae, morbi mucosi, paralysis linguae, hysteria, colica, ulcera foeda.

Dosis. Scrupuli duo cum aquae unciiis octo infunduntur; externe aspergo.

IPECACUANHAE radix. *Psychotria emetica*? L. cl. V. Ord. Monogyn. Planta perennis, patria huius stirpis est provincia Gironensis regni Mexicani.

Odor corticis nullus, pulverisati nauseosus.

Sapor amaricans, acriusculus, inhaerens.

Virtus maiori dosi emetica, minori vero alterans, sudorifera, anthelmintica.

Usus. Diarrhoea, dysenteria, haemorrhagia

uteri, hysteria, hernia incarcerata, tussis convulsiva, asthma spasmodicum, febres intermittentes pertinaces, arthritis, rheumatismus, otitis pituitosa.

Dosis. Adultis, scopo vomitum ciendi, in pulvere, a granis decem, ad viginti quinque; alterandi vero scopo, a grano uno, duobus, ad sex, cum saccharo.

Si radix vera frangitur, linea alba cineritia, quam in medio habet, ab Apocyni radice dignoscitur, in qua haec linea fulva apparet.

IREOS vel IRIDIS FLORENTINAE radix.

Iris florentina. L. cl. III. Ord. Monogyn. Planta perennis in Rossia australi cultu facilis.

Odor siccae gratus, violaceus.

Sapor leviter amaricans, subacris, diutius ore remanens.

Virtus recentis purgans cum vehementia; siccatae incidens, attenuans, pectoralis.

Usus. Pituita pulmonum, unde dyspnoea, asthma, tussis.

Dosis. Drachma dimidia pulveris, qui etiam ob gratum odorem pulveri dentifricio admiscetur.

IUGLANDIS cortex fructus exterior viridis, seu putamen nucum iuglandum. *Iuglans regia* L. cl. XXI. Ord. Polyandr. Arbor in Rossiae australis hortis colitur.

Odor corticis s. putaminis s. drupae non admodum gratus.

Sapor adstringens, amarus.

Virtus anthelmintica, detergens.

Usus. Lumbrici, taeniae, ulcera foeda, aphtae.

Dosis. Extracti aquosi drachma dimidia in uncia dimidia aquae cinnamomi solvitur. Cuius liquoris, initio, infantibus biennibus vel triennibus, guttae viginti ad triginta, ter, de die; Dein guttae quadraginta ad quinquaginta pro cuiusvis aetate. Item paratur ex uncia una putaminum viridium cum libra una aquae decoctum, quod tam interne, quam externe exhibetur.

IUNIPERI baccae, lignum. *Iuniperus communis.* L. cl. XXI. Ord. Monadelph. Arbusculum, in Rossiae temperatae solo sterili, spontaneum.

Odor baccarum pulpae aromaticus.

Sapor subdulcis, subamarus, resinosus.

Odor ligni gratus.

Sapor amaricans.

Virtus diuretica, sudorifera, mundificans.

Usus. Hydrops, scorbutus, lues venerea, catarrhus senilis, scabies, arthritis, sabulum, suffumigium vulgatissimum.

Dosis. Baccarum uncia dimidia cum aquae libra una ad uncias octo decoctum; Ligni radice uncia dimidia cum aquae libris duabus ad uncias sedecim decoctum.

KINO gummi sunt massae diffformes, durae, haud pellucidae, coloris ex rubro-nigri, fracturae splendentis et saepe cellulosa, ab arbore, quae in loco suo natali, id est, ad fluvium Gambia Africae, dicitur Pau.

Odor nullus.

Sapor valde adstringens cum subsequa dulcedine, dentibus adhaeret.

Virtus roborans, refocillans.

Usus. Diarrhoea chronica, fluor albus a relaxatione, fluxus menstruorum immodicus, et morbi a laxitate acrimoniaque provenientes.

Dosis. Scrupulus unus ad drachmam dimidiam in pulvere; extus iniectioes.

LACCAE gummi est productum Cocci ficus; habitantis in *Ficu religiosa*, et *Ficu Indica* L. cl XXIII Ord. Trioec. In Bengalia praecipue reperitur in montibus incultis ad utrumque fluvii Ganges latus. Tres species eius existunt: I. Lacca in baculis s. ramis. II. In granis. III. In tabulis s. massis. Quo profundius rubra lacca est, eo melior censetur. Pallida et perforata vilioris est pretii. Hinc tutius semper eligitur Lacca in baculis in scopum medicum.

Odor nullus.

Sapor levissime amarus stipticus.

Virtus, et Usus. Vid. Tinctura laccae. P. II.

LACTUCAE SYLVESTRIS herba. *Lactuca virosa*, L. cl. XIX. Ord. Polyg. aequal. Planta bi-

ennis in aggeribus, et sepibus, ubique copiose crescens.

Odor virosus.

Sapor acris, amarus.

Virtus diuretica, aperiens, solvens, attenuans.

Usus. Hydrops, obstructio viscerum, febres intermittentes biliosae, icterus.

Dosis. Extracti aquosi a granis triginta, ad drachmas tres, in pilulis, per diem.

LAPATHI AQUATICI radix. *Rumex aquaticus* L. cl. VI. Ord. Trigyn. Planta perennis vulgaris. Ad fossas, lacusque.

Odor levis.

Sapor manifeste austerus, et amarus.

Virtus antiscorbutica, tonica.

Usus. Ulcera cacoëthica, affectiones scorbuticae: ut, stomacace, laxitas gingivarum, et dentium, rachitis.

Dosis. Drachmae duae in forma decocti; *Fotus.* Pulvis comminutus praestantem pulverem dentifricium constituit.

LAVENDULAE spica florens. *Lavendula spica* L. cl. XIV. Ord. Gymnosp. Suffrutex hortensis.

Odor recentis et siccae fragrans, fortis, cephalicus, suaveolens.

Sapor aromaticus, amaricans, calidiusculus; Flores gratioris odoris.

Virtus nervina, resolvens, tonica, emmenagoga, stimulans.

Usus. Animi deliquia, paralysis, tremores artuum, vertigo. Vix unquam absque praevia praeparatione per os ingeritur, tutius sacculis, vel fomentatione, extrinsecus, ad stagnationes humorum varias adhibetur.

LAUROCERASI folia. *Prunus laurocerasus* L. cl. XII. Ord. Monogyn. Arbor prope mare nigrum crescens.

Odor recentium digitis contritorum fragrans.

Sapor nucleorum Persicae, vel amygdalarum amararum, verum fortior.

Virtus summe deleteria, narcotica, resolvens, diuretica, maiori dosi venenata, praesertim feris.

Usus. Obstructio chronica hepatis, viscidum tenax, tumores scirrhusi, mania, melancholia.

Dosis. In forma aquae destillatae, cuius guttae triginta ad sexaginta, ter, quater per diem, cum maxima cautela exhibentur.

LAURI folia, baccae. *Laurus nobilis* L. cl. IX. Ord. Monogyn. Arbor Europae calidae propria.

Odor foliorum aromaticus, balsamicus, graviusculus.

Sapor aromaticus, subamaricans; Baccarum vero sapor et odor antistat aromate suo foliis.

Virtus resolvens, roborans, emmenagoga, diuretica, sudorifera, carminativa.

Usus. Pituitosi humores, sugillationes, hysteria.

Dosis. Foliorum uncia dimidia cum aquae libra una infusum. Baccarum s. Drupae scrupulus unus cum aquae unciis sex infusum.

LEVISTICI herba, radix, semen. *Ligusticum levisticum* L. cl. X. Ord. Digyn. Planta perennis in tota Rossia hortensis.

Odor totius plantae specificus praecipue herbae ingrate fragrans.

Sapor calidus, aromaticus.

Virtus Angelicae et Imperatoriae haud dispar.

Usus. Earumdem.

Dosis. Drachmae duae cum aquae unciis sex.

LICHEN ISLANDICUS seu MUSCUS ISLANDICUS. *Lichen islandicus* L. cl. XXIV. Ord. Algae. Perennis in Rossiae septentrionalis sylvis, et saxetis aridis frequens.

Odor nullus.

Sapor amarus, subadstringens.

Virtus antiseptica, nutriens, pectoralis.

Usus. Phthisis, tussis, haemoptysis, catarrhus inveteratus, sudores et diarrhoea colliquativa, dysenteria.

Dosis. Uncia una cum aquae unciis sedecim, donec remanserint duodecim, omni bihório cyathus unus ingeritur.

LINI semen, oleum expressum. *Linum usitatissimum* L. cl. V. Ord. Pentagyn. Planta annua in Rossia ubique conseritur in agris.

Odor seminis recentis debilis.

Sapor fatuus, mucilaginosus.

Virtus laxans, emolliens, obvolvens.

Usus. Passio iliaca, pleuritis, colica nephritica, haemoptysis a calculo pulmonum, tenesmus, hernia incarcerata, angina, stranguria, gonorrhoea inflammatoria, colica pictonum, dolores in dysenteria, vermes.

Dosis. Olei recentis expressi uncia una; Duae, tres unciae in clysmate; seminis contusi drachmae tres ad libram unam aquae fervidae infusum. Cataplasma.

LINI CATHARTICI herba. *Linum catharticum* L. cl. V. Ord. Pentag. Planta annua in Rossiae temperatae campis, item pratis humidis crebra.

Odor nullus.

Sapor amarus, nauseosus, subacris.

Virtus purgans.

Usus. Arthritis vaga, hydrops.

Dosis. Drachmae duae cum aquae s. seri lactis unciis quatuor infusum.

LITHARGYRIUM est mediae, inter calcem, et vitrum indolis, ponderosum, squamosum, coloris flavi, nunc pallidioris, nunc propius in rubrum vergentis, in depuratione atque excoctione metallorum nobilium potissimum nascens et vix unquam a cupri calce liberum.

Odor nullus.

Sapor metallicus, dulcis.

Codex medic. Europ. Sect. V. P. I.

Virtus exsiccans, adstringens.

Usus. Varia praeparata.

LOBELIAE radix. *Lobelia syphilitica* L. cl. XIX. Ord. Monogam. Planta perennis in locis udis ad fossas et flumina Virginiae.

Odor virosus.

Sapor tabacinus, acris, linguae adhaerens.

Virtus purgans, antivenerea.

Usus. Syphilis, ulcera putrida.

Dosis. Tres ad sex radices in aquae libris tribus coquantur, et ter, de die, libra una bibitur; extus lotiones.

Hac tamen specie alia, scilicet *Lobelia longiflora* L. fortior est, sed fortissima *Lobelia Tupa* L. at caute adhibenda, nam corrosiva est.

LYCOPODII semen. *Lycopodium clavatum* L. cl. XXIV. Ord. Musci. Perennat in sylvis circa Petropolim copiose.

Odor et sapor nullus, indoles ceracea ad flammam ardens.

Virtus leniens, absorbens.

Usus externus. Excoriatio, fissurae, intertrigo infantum, tinea capitis, pilularum conspersio.

MAGNESIA NIGRA, M. VITRIARIORUM.
Magnesia vulgaris L. Syst. nat. III. p. 296. Est calx metallica in semimetallum propriae indolis, magnesium nuncupatum, reducibilis, quod semimetallum in fractura granulare, valde fragile, licet simul valde durum.

Usus. Praeparata: ut aër vitalis, acidum salis dulcificatum.

MAIORANAE herba seu summitates. *Origanum majorana* L. cl. XV. Ord. Gymnosperm. Planta annua hortensis.

Odor fragrans, fortis.

Sapor aromaticus, subamaricans.

Virtus tonica, stomachica, resolvens, emmenagoga, errhina.

Usus. Tenax pituita, asthma, catarrhus.

Dosis. Drachma una cum aquae unciis quatuor infusum.

MALVAE radices, **MALVAE AVULGARIS** herba. *Malva rotundifolia* L. cl. XV. Ord. Polyandr. Planta annua ubique ad vias, sepes, locis ruderalis spontanea.

Odor nullus.

Sapor mucilaginosus.

Virtus et Usus Altheae.

MALVAE ARBOREAE flores. *Alcea rosea* L. cl. XVI. Ord. Polyandr. Planta biennis, vulgare hortorum ornamentum.

Odor nullus.

Sapor mucilaginosus, subadstringens.

Virtus emolliens, angina pituitosa, amygdalarum tumor.

Usus. Recipitur maxime ad gargarismata roborantia.

MANNA, vel MANNA CALABRINA. Est succus inspissatus. *Fraxini rotundifoliae*, *Fraxini orni*. *Fraxini excelsioris* L. cl. XXIII. Ord. Dioecia. Arborès, in Calabria, et Sicilia, succi istius praecipue feraces sunt.

Odor nullus.

Sapor melligineus, dulcis, subacescens.

Virtus eccoprotica, edulcorans, obtundens, solvens, pectoralis.

Usus. Ubi instat saburra movenda, ut in feбри inflammatoria, asthmate, catarrho, phthisi, inflammatione visceris cuiuscunque, maxima sensilitate primarum viarum, colica nephritica, graviditate.

Dosis. A drachmis duabus ad uncias duas et ultra.

Tres praecipue sunt species mannae:

1. Manua in lacrymis, est rara optimaque species, quae solis calore sponte stillat, et ab aëre frigidiusculo in parvos globulos condensatur.
2. Manna canellata, quae ex frustis, aliquot pollices longis, unum circiter latis, una facie concavis efformatur, obtinetur, dum in incisiones trunci immittunt folium, supra quod manna in parvulam pelvim stillat.
3. Manna vulgaris, M. Calabrina, M. Sicula, quae ex incisione trunci pari modo obtinetur, constat ex massis cohaerentibus diversae magnitudinis, et bonitatis. Ex quibus frusta albidiora et sicciora seliguntur, et sub nomine Manna electae veniunt. Reliquae

vero, post selectum, mannae, Manna crassa, spissa, sordida vocantur, quae dum depurantur et in p rvas tabulas efformantur, dicitur Manna tabulata, si vero aqua rosarum solvuntur, Manna depurata, appellatur. Caeterae species mannae sunt creberrime adulteratae, ut Manna Brigantina, quae prorsus e pharmacopolio eliminetur.

MARI VERI herba, seu summitates. *Teucrium marum* L. cl. XIV. Ord. Gymnosp. Suffrutex in Rossia temperata hortensis.

Odor fragrans, camphoraceus.

Sapor amarus cum caloris sensu.

Virtus tonica, resolvens, emmenagoga, diuretica, errhina.

Usus. Cachexia, hysteria, debilitas nervorum, dira tussis, asthma, morbi soporosi.

Dosis. Scrupulus unus omni quarta hora datur; vel herbae drachma una cum vini unciiis quatuor infusum.

MARRUBII, seu MARRUBII ALBI herba. *Marrubium vulgare* L. cl. IV. Ord. Gymnosp. Planta perennis in Rossia australi et temperata crescens.

Odor subfragrans.

Sapor amarus, subacris.

Virtus emmenagoga, diuretica, incidens, aperiens.

Usus. Cachexia, obstructions, hysteria, asthma pituitosum, icterus, ptyalismus mercurialis.

Dosis. Drachmae duae cum aquae unciis octo infusum; Epithema; Succus recens expressus cochleatim.

MASTIX, s. MASTICHE est resina constans ex granis fragilibus, variae magnitudinis, subpelucida, optima est lacrymarum formam habens, coloris flavescentis. *Pistacea lentiscus* L. cl. XXII. Ord. Pentandr. Arbor in Lusitania, Italia crescens.

Odor levis haud ingratus.

Sapor vix manifestus.

Virtus discutiens, roborans.

Usus Externus. Prolapsus intestini recti, pulvis dentifricius, suffimigia. Emphysema.

MEL. Est substantia mollis, spissa, tum alba, tum flavescens ab *Ape mellifera* L. ex nectariis florum collecta, atque intra favos reposita.

Odor fragrans, saepe eas plantas, ex quibus colligitur, redolet.

Sapor proprius, dulcis, subacriusculus.

Virtus abstergens, resolvens, antiseptica, ecocprotica, maturans, expectorans, consolidans.

Usus. Ulcera crurum, corneae, pituitosi morbi.

Dosis. Uncia una ad duas, tres de die.

Mel pro varia vegetabilium indole, colligendi encheiresi, patriaque ipsius, varia accipit nomina, ut:

Mel virgineum est, quod sponte, sive ad le-

ven calore, diffractis favis defluit, et est optimum.

Mel commune vel crudum est, quod torculari exprimitur, ceram redolens, et est vilius.

Mel despumatum, vel excoctum, quum illud coctione multum gratiae perdit, nec bonum mel depuratione opus habet, hinc eviluit.

Mel Narbonense est albissimum, granosissimum, Rosmarinum redolet, hinc omnium princeps habetur, cuius dignitati non cedit Mel Lipetz dictum.

MELILOTI herba cum floribus. *Trifolium melilotus officinalis* L. cl. XVI. Ord. Decandr. Planta annua vel biennis in Rossia australi spontanea.

Odor siccatae plantae longe fragrantior, quam recentis.

Sapor subamarus, herbaceus.

Virtus resolvens, discutiens.

Usus. Fomenta, cataplasmata discutientia, et emplastrum sui nominis.

MELISSAE herba. *Melissa officinalis* L. cl. XIV. Ord. Gymnosp. Planta perennis in Rossia temperata hortensis.

Odor recentis et siccae fragrans, fere flavedinis corticis citri.

Sapor siccae acris, aromaticus.

Virtus resolvens, leniter roborans, diuretica, emmenagoga.

Usus. Melancholia, hypochondriasis, hysteria, paralysis, chlorosis.

Dosis. Drachma una cum aquae unciis quatuor infusum. Aqua destillata cochleatim.

MENTHAE CRISPAE herba. *Mentha crispa* L. cl. XIV. Ord. Gymnosp. Planta perennis in Sibiria spontanea, in Rossia hortensis.

Odor recentis et siccae fragrans, fortis, non admodum gratus, spirituosus.

Sapor calidus, aromaticus cum levi amaritie.

Virtus resolvens, ructatrix, nervina, diuretica, lac resolvens, attenuans, carminativa.

Usus. Anorexia, flatus, colica, ex dysenteria, hysteria, vomitus, coagulum lactis in mammis, asthma, tussis convulsiva, sugillationes, et contusiones.

Dosis. Drachma una cum aquae unciis quatuor infusum; externe cataplasma, fots, clysm.

MENTHAE PIPERITAE, seu PIPERITIDIS herba. *Mentha piperita* L. cl. XIV. Ord. Gymnosp. Planta perennis in Rossia temperata hortensis.

Odor siccae, et recentis, fragrans, spirituosus, subcamphoratus.

Sapor aromaticus, fervidus, camphorae, linguam calefaciens, subsequente sensu frigidiusculo; siccae sapor fortior.

Virtus, Usus Dosisque praecedentis.

MERCURIUS, ARGENTUM VIVUM. *Hydrargyrum virgineum* L. cl. II. Minerae, Metalla. Est substantia in atmosphaerae calore

fluida, in summo frigoris gradu solida, malleabilis. Invenitur sive natus, mercurius virgineus dictus, sive sulphure in cinnabarim versus, in quem ubi vertitur, pro variis, quibus inhaeret terris, varias mineras efformat. Reperitur in variis Sibiriae montibus.

Odor nullus.

Sapor metallicus.

Virtus solvens, resolvens, sialagoga, antisypilitica.

Usus. Tam extus, quam intus adhibetur sub variis praeparatis.

Mercurius depuratur tutissime ope destillationis. Signa eius, dum purissimus sit, sunt sequentia: super chartam currit facillime, nihilque heterogenei relinquit, nulla cuticula tegitur, aut cuius globuli quasi filum non trahunt. In mortario cum aqua destillata tritus, illam non inquinans, in cochleari ferreo, super ignem non decrepitat. Totus avolat, nullo metallo relicto, in acido nitri nihil demittit, aceto concentrato, si cum eo teritur, nullam dulcedinem conciliat, trituratione solidis, aut unguinosis colorem nigrum affricat.

MEZEREI cortex, radix. *Daphne mezereum* L. cl. VIII. Ord. Monogyn. Frutex in Rossia septentrionali, et Sibiria spontaneus.

Odor corticis sicci nullus.

Sapor si diu masticatur valde acris, fauces exurens, recentis acerrimus, inhaerens.

Virtus in paucā dosi resolvens, in maiori drastica, cardialgica, deurens.

Usus Exutorium fonticulorum, tumores scirrhosi et venerei: ut tophi venerei, dolores nocturni, tumores tonsillarum, testiculorum, colli, parotidum, ulcera venerea, acres humores alicubi stagnantes.

Dosis. Radicis mezerei drachmae duae, totidem liquiritiae cum aquae libris tribus ad libras duas decoctum, quod per diem consumitur; Cataplasma ex decocto hocce, et farina; Corticis sicci, aceto vini, vel aqua, per octo, vel decem horas, macerati frustum, longitudinis pollicis, latitudinis sex, vel octo linearum, imponitur plerumque brachio, subter loco, cui inseritur musculus deltoideus, vel aliis partibus, pro sciti medici indicatione, et spleniolo tectum, fascia firmatur.

Praeter hunc fruticem, aliae adhuc *Daphnes* sunt species, quae corticem viribus priori supparem erogant, ut: *Daphne Thymelaea*, *Daphne Gnidium* L. et hicce est cortex verus (ecorce de garou) Gallorum, et *Daphne laureola* L.

MILLEFOLII herba, flores. *Achillea millefolium* L. cl. XIX. Ord. Polyg. superfl. Planta perennis in tota Rossia per campos, et in pascuis, vulgaris.

Odor foliorum et florum subaromaticus.

Sapor subadstringens, amaricans.

Virtus tonica, detergens.

Usus. Haemoptysis, haemorrhoidalis nimius fluxus, ulcera, obstructio mensium, colica flatulenta, pollutio nocturna, nervosae affectiones.

Dosis. Drachma una cum aquae unciis quatuor infusum.

Oleum destillatum viribus ad oleum chamomillae proxime accedit, tanquam anodynum, antispasmodicum, carminativum celebre.

MILLEFOLII NOBILIS herba, flores. *Achillea nobilis* L. cl. XIX. Ord. Polyg. superfl. Planta subperennis in australibus, ad Volgam spontanea. *Odor* camphoraceus, et manifestius aromaticus. Haec planta praecedenti speciei utique praefenda est.

MILLEPEDES. *Oniscus asellus* L. cl. V. Insecta aptera. Antiquorum murorum et parietum civis.

Odor nullus.

Sapor leniter salsus.

Virtus diuretica, incidens, aperiens.

Usus. Hydrops, icterus, asthma, dysuria, nephritis, obstructio viscerum.

Dosis. Millepedum recentium centum succus cum iuris libra una.

MINIUM est calx plumbi ad rubedinem calcinata.

Odor nullus.

Sapor dulcescens.

Virtus adstringens, exsiccans, cum oleo plastica.

Usus. Oleum cum minio dat massam plasticam, quae multorum emplastrorum basis est.

MORI baccae, seu morum; Cortex radicis. *Morus nigra* L. cl. XXI. Ord. Pentandr. Arbor colitur in hortis australis Rossiae, praecipue Kiowiae copiosa.

Odor corticis graviusculus.

Sapor intense amarus, subsalsus. *Baccarum* recentium odor vix ullus. *Sapor* acidodulcis.

Virtus corticis adstringens, anthelmintica; *Baccarum* refrigerans, restringens.

Usus Corticis. Taeniae. *Baccarum.* Febres, angina, scorbutus, aphtae.

Dosis. Corticis in pulvere ad grana triginta, vel in infuso ad drachmam unam; *Baccarum,* in forma roob, vel syrupi, uncia una.

MOSCHATA NUX; MACIS; OLEUM NUCISTAE EXPRESSUM. *Myristica moschata.* Thunberg. act. Holm. 1782. Arbor insulae Moluccae, praesertim Bandae.

Odor Nucis myristicae fragrans, gratus.

Sapor aromaticus, subpinguis, linguam blande pungens, et os grato calore replens.

Odor Macidis, quae est membrana nucis moschatae pulposa subpinguis chermesini coloris in lacinias lineares ramosas fissa, sicca-

atione luteo - sanguineum colore induens, fragrantior nucleo.

Sapor item fortior, magis aromaticus, acris, calidus.

Odor Olei nucum.

Sapor idem sed pinguior.

Virtus stomachica, anodyna, refrigerans, calefaciens, carminativa.

Usus. Laxitas ventriculi et intestinorum, profluvia alvi, colici dolores vehementes, vomitus, tormina.

Dosis. Nuclei drachma dimidia in miscela comoda; Oleum praecipue hac in re abdomini illinitur; Macidis scrupulus unus.

MOSCHUS est substantia sebacea, in folliculo ad umbilicum sito *Moschi moschiferi* L. cl. I. Mammalia; Pecora. In Sibiria, Tataria, China, India orientali, praecipue Tunquin.

Odor proprius fragrantissimus, substantiis, quas penetrat, pertinacissime inhaerens.

Sapor amarus, subacris.

Virtus nervina, antispasmodica, refocillans.

Usus. Hysteria, rabies, convulsiones, hydrophobia, deliria, colica flatulenta, dysphagia paralytica et spasmodica, tussis convulsiva, exanthemata retropulsa.

Dosis. A granis quatuor ad scrupulum unum cum saccharo.

Moschus ad nos provehitur in vesiculis pilis rigidis obsessis; Albae nostrates; Badae a

China, et Tunquin, seu orientales nominantur.

MYRRHA, sive **GUMMI MYRRHAE**, plus longe gummi, quam resinae habens; et oleo aethereo scatens, arboris hucusque ignotae. Ex Abyssinia et Arabia venit. Hoc genuinum gummi constat ex condensatis depluentibus guttis induratis, rubro-brunnis, subpellucidis, solidis fragilibus, externa superficie inaequalibus, fractura subnitente in speciminibus maioribus, interne saepe distinguitur particulis albidis, quae maculas in fractura, seu ungues, sive strias semicirculares referunt.

Odor fragrans, gratus.

Sapor intense amarus, pungens, subaromaticus.

Virtus antiseptica, anticariosa, vulneraria, emmenagoga, stomachica.

Usus. Obstructio mensium, ulcera cariosa, putrida, gangraena, asthma humidum, tussis inveterata, pituitosa diathesis.

Dosis. A granis quatuor ad scrupulum unum; externe cum aqua calcis iniectio, fots.

MYRTILLI baccae. *Vaccinium myrtillus* L. cl. VIII. Ord. Monogyn. Fruticulus in Russia septentrionali frequens.

Odor recentium nullus.

Sapor acidulus, subadstringens, siccatarum magis adstringens.

Virtus refrigerans, adstringens.

Usus. Diarrhoea, scorbutus, haemoptysis.

Dosis. Siccatarum uncia dimidia ex aquae unciis octo ad uncias quatuor decoctum.

NASTURTII AQUATICI herba recens. *Sisymbrium nasturtium* L. cl. XV. Ord. Silicul. Planta biennis crescens ad rivos et fontes spontanea.

Odor recentis tritae volatilis, proprius.

Sapor subamaricans, leviter acriusculus.

Virtus antiscorbutica, attenuans, resolvens, diuretica.

Usus. Scorbutus, carus pituitosus frigidus, febris tertiana soporosa, obstructions viscerum, tussis rebellis, phthisis purulenta.

Dosis. Succus expressus ad aliquot uncias.

Non substituatur *Cardamine pratensis* L. in locum Nasturtii nostri.

NICOTIANAE, sive **TABACI** folia. *Nicotiana tabacum* L. cl. V. Ord. Monogyn. Planta annua copiosissima in Ucraina colitur.

Odor gravis, peculiaris, ingratus.

Sapor acris, nauseosus.

Virtus narcotica, resolvens, inebrians, antispasmodica, sternutatoria, emetica, repellens.

Usus. Pertinacissimae alvi constipationes, ileum, hernia incarcerata absente inflammatione, iliaca passio, colica spasmodica, aqua suffocati, plurimae causae vires vitales opprimentes; Externe, fumus Nicotianae clysmatis in modum applicatur mediante certo instrumento.

Augusto et Septembri mensibus folia collecta probeque siccata flava, non viridi, nec atro colore deturpata, multo minus contorta, in usum trahantur.

NITRUM COMMUNE. NITRAS POTAS. SAE. *Nitrum nativum* L. cl. Mineræ, Salia. Est sal neuter ex acido nitri et alcali fixo vegetabili constans, in Rossia australi, ex propriis terris peculiari ratione excoquitur, depuratum crystallos prismaticos hexaedros efformans.

Odor nullus.

Sapor amaricans, refrigerans.

Virtus attenuans, solvens, antiphlogistica, diuretica, antiseptica, sublaxans.

Usus. Febris inflammatoria, putrida, spasmi abdominales, gonorrhoea, mania cum febre vehementi, haemorrhoides inflammatoriae, haemorrhagiae.

Dosis. A scrupulo uno ad duos; Externe frigida cataplasmata.

OLIBANUM seu **THUS** est gummi resina ex *Junipero lycia* L. cl. XXIV. Ord. Monandr. Arbor in Sibiria, utraque Arabia crescens.

Odor gratus.

Sapor acris, amarus.

Virtus roborans, discutiens.

Usus. Suffitus, emplastra.

OLIVARUM oleum. *Olea europaea* L. cl. II. Ord. Monogyn. Arbor in Europa australi locis apricis.

Odor levissimus.

Sapor mitissimus.

Virtus leniens, relaxans, lubricans, emolliens.

Usus. Venena, nephritis, enteritis, pleuritis, tussis, colica pictonum et lochialis, acria ingesta, morsus viperæ, tenesmus, morsus apum, vesparum, aliorumque insectorum, tormina, arthritis vaga, strictura intestinorum, stranguiria; extus ascites.

Dosis. Ab uncia una, ad tres, supraque.

OPIUM, est massa resinoso-gummosa coloris rubicundo-bruni, quæ, vel incisione sola immaturarum capsularum, elicitur, aere condensatur, et tunc opium purissimum, seu Thebaicum, seu lacryma opii dicitur; vel ex decocto capsularum educitur; vel denique ex decocto totius plantæ exprimitur, inspissatur, et Meconium audit. *Papaver somniferum* L. cl. XIII. Ord. Monogyn. Planta annua in Arabia, Persia, et hortis nostris colitur.

Odor virosus, fortis.

Sapor primum nauseosus et amarus, paulo post acris, calidus, calorisque sensu labia, linguam, palatum afficiens.

Virtus princeps anodyna, antispasmodica, narcotica.

Usus. Typhus Culleni, pervigilia, dolores et excretiones nimiae, spasmi intestinorum, ileus, colica violenta, cholera, nausea et vomitus gravidarum, hernia incarcerata, inflammationes post operationes chirurgicas, laesiones

capitis cum commotione cerebri, variolae confluentes, colica pictonum, malum ischiaticum, dolores post partum pertinaces, tetanus, emprosthotonus, opisthotonus, pleurosthotonus, hydrophobia, rabies canina, asthma spasticum, nimia nervorum sensilitas, epilepsia, dysenteria catarrhalis, diarrhoea symptomatica, haemorrhagiae gravidarum, hydrops, gangraena senilis, ulcera mali moris, syphilis, stranguria molestissima.

Usus. A grani quarta parte ad grana duo.

ORIGANI VULGARIS herba cum floribus.
Origanum vulgare L. cl. XIV. Ord. Gymnosp.
Planta perennis in tota Rossia spontanea.

Odor siccae et recentis fragrans, ad Majoranam accedens.

Sapor acris, aromaticus.

Virtus discutiens, incidens, emmenagoga.

Usus. Tussis absque febre, asthma, oedema, chlorosis.

Dosis. Drachma una cum aquae unciiis quatuor infusum.

Olei exigua pars destillatione obtinetur.

ORYZAE semen decorticatum. *Oryza sativa* L. cl. VI. Ord. Monogyn. Planta annua colitur ubique in Indiae et Japoniae inundatis.

Odor nullus.

Sapor farinaceus.

Virtus nutriens obvolvens, alvum nimis laxam constipans.

Usus. Variæ acrimoniae, fluxus alvi a pure ex ulceribus absorpto.

Dosis. Unciæ duæ cum aquae libris tribus ad uncias viginti decoctum.

OVI GALLINAE albumen, vitellus, a Femella *Phasiani Galli* L. cl. II. Aves. Gallinae.

Odor albuminis ovi nullus.

Sapor fatuus, gelatinosus.

Virtus plastica, demulcens.

Usus. Excoriatio a decubitu, item varii labores pharmaceutici.

Vitellus est pars flava ovi, cuius

Odor nullus.

Sapor gelatinosus.

Virtus emolliens, relaxans, subigens oleosa cum aquosis.

Usus. Ambustiones, et ulcera vesicatorio inducta.

OXYCOCCI baccae. *Vaccinium oxycoccos* L. cl. VIII. Ord. Monogyn. Fruticulus in Russia septentrionali et Sibiria crescens.

Odor vix ullus.

Sapor acidulus et gelu adustarum baccarum acidulo-gratus.

Virtus refrigerans, antiscorbutica.

Usus. Febrium aestus.

Dosis. Succii unciæ duæ cum libra una aquae addita commoda sacchari portione; vel crudæ cum saccharo eduntur.

PAEONIAE radix. *Paeonia officinalis* L. cl. XIII. Ord. Digyn. Planta perennis ubique in hortis colitur.

Odor gravis, ingratus.

Sapor primum dulcescens, dein ingrate amarus.

Virtus antispasmodica.

Usus. Convulsiones.

Dosis. A drachmā dimidia ad scrupulos duos.

PASSULAE MAJORES sunt uvae siccatae *Vitis viniferae* L. cl. V. Ord. Monogyn.

Odor nullus.

Sapor subacidulo-dulcis.

Virtus antibiliosa, antiscorbutica, refrigerans.

Usus. Morbi biliosi, scorbutici, inflammatorii.

Dosis. Uncia una cum aquae libra una ad uncias octo decoctum.

PASSULAE MINORES, seu CORINTHIACAE, sunt baccae siccatae. *Vitis viniferae apyrenae* L. cl. V. Ord. Monogyn. Patria eius est non solum Corinthus, sed etiam Zacynthia, Cephalonia et aliae insulae maris Jonici.

Odor vix ullus.

Sapor dulcis cum acore, nigricantium dulcissimus.

Virtus demulcens, refrigerans, lubricans.

Usus. Tussis languentibus pleuriticorum spuitis, stranguria.

Dosis. Uncia una cum aquae libra una ad uncias octo decoctum.

PECURIM, seu PICHURIM faba. Ex *Lauro* quadam? in regno Paraguay crescente.

Odor fragrans, *Sassafras* referens, inhaerens.

Sapor aromaticus.

Virtus stomachica, adstringens.

Usus. Dysenteriae castrenses, vomitus pertinaces, fluor albus.

Dosis. A granis decem ad scrupulos duos, bis, ter, quater de die.

PETROLEUM, seu OLEUM PETRAE. *Bitumen petroleum* L. Est bitumen liquidum, ex terrae visceribus scaturiens, empyreuma olens, gustu acre, fitque colore albo, rubro, nigroque.

Album petrae oleum. Quod est genuinum seu proprie Naphtha dicitur, estque fortioris, reliquis, et minus nauseosi odoris, aqua et spiritu vini indissolubile et frigore non cogitur, sed aetate evadit flavum. In Persiae Bacu datur copiosissimum.

Rubrum petrae oleum. Cuius fluiditas coloris magis, minusque fit diluti, odorem et saporem habet penetrantem, in Gallia, et Italia reperitur.

Nigrum petrae oleum, est reliquis spissius, et gravius olens, in gubernio Astrachanensi prope fluvium Terek.

Virtus naphthae calefaciens, resolvens.

Usus. Externe perniones, tumores indurati, topi; interne colica pictonum, taeniae.

Dosis. Guttulae decem ad triginta cum syrupo; sive, in pulvere, a granis decem ad viginti.

PETROSELINI semina, herba recens, radix.
Apium petroselinum L. cl. V. Ord. Digyn. Planta biennis ubique hortensis.

Odor et Sapor totius stirpis calidus, aromaticus, seminum autem magis eminens.

Virtus aperiens, diuretica.

Usus. Icterus, suppressio urinae.

Dosis. Radicis drachmae sex cum aquae libra una ad uncias octo decoctum; Herbae recentis uncia dimidia ex iuris libra una ad uncias octo decoctum; Seminis drachmae duae cum aquae unciis sex infusum.

PHELLANDRII, seu FOENICULI AQUATICI semen. *Phellandrium aquaticum* L. cl. V. Ord. Digyn. Planta biennis in fossis ad lacus frequens.

Odor gravis.

Sapor aromaticus, acris.

Virtus stimulans, resolvens.

Usus. Ulcera sordida, scorbutica, cacoëthica, spina ventosa, ossium caries, lactei tumores.

Dosis. Ad drachmam unam in pulvere bis de die datur; externe cataplasma.

PHYTOLACCAE herba recens, radix. *Phytolacca decandra* L. cl. X. Ord. Decagyn. Planta perennis in Virginia, Italia, Helvetia et horto nostro botanico sponte crescit.

Odor nullus.

Sapor acris, corrosivus.

Virtus. Anticancrosa.

Usus. Cancer apertus, et vitia cancro similia.

Dosis. Succus expressus ex tota stirpe, caloris solaris ope in speciem unguenti densatur, quo ipso, vel foliis conquassatis pars can-crosa contegitur.

PIMPINELLAE ALBAE radix. *Pimpinella saxifraga* L. cl. V. Ord. Digyn. Planta perennis in tota Rossia spontanea.

Odor radices recentis fragrans.

Sapor intense acris, calidus.

Virtus resolvens, diaphoretica, stomachica, diu-retica.

Usus. Anorexia, angina pituitosa et aquosa, paralysis linguae.

Dosis. Drachmae duae cum aquae unciis qua-tuor infusum.

PINI Turiones; **TEREBINTHINA COMMU-NIS**; **PIX NIGRA SOLIDA, NAVALIS**; **PIX LI-QUIDA.** *Pinus sylvestris* L. cl. XXI. Ord. Mo-nadelph. Arbor per totam fere Rossiam crescit frequentissima.

Odor, Sapor, Virtus, Usus, Dosisque Turio-num. Vid. Abietis turiones.

TEREBINTHINA COMMUNIS, est balsa-mus naturalis, consistentia mellis, opaca, sordida, coloris bruno-albi, ex sauciata praefixa arbore elicetur.

Odor et Sapor ingratus.

Virtus stimulans, resolvens, diuretica.

Usus. Emplastra, unguenta, oleum terebin-thinae.

PIX SOLIDA, NAVALIS, SUTORIA, est resina nigra, quae destillatione per descensum ex dicta arbore, vel ex Pice liquida ad siccitatem excocta paratur.

Odor fragrans, plerisque ingratus.

Sapor amarus.

Virtus adhaesiva, rubefaciens.

Usus Varia emplastra.

PIPER ALBUM et NIGRUM. *Piper nigrum* L. cl. II. Ord. Trigyn. Frutex in India orientali, Molucca, Java, praecipue Sumatra colitur. Nigrum est semen immaturum, album vero est maturum, pellicula sua externa privatum.

Odor aromaticus.

Sapor fervidus, acris, inhaerens.

Virtus stimulans, calefaciens.

Usus. Ciborum digestio labefactata, prolapsus uvulae.

Dosis. Sex ad duodecim semina mane sumuntur.

PLUMBUM, SATURNUS. *Plumbum nativum* L. cl. II. Minerarum, Metalla. Sub forma variarum glebarum passim occurrit.

Odor metallicus, peculiaris.

Sapor similis.

Virtus adstringens, exsiccans, obstipans.

Usus. Calces plumbi; solutiones plumbi; salia saturnina; cerata; emplastra saturnina.

POLYGALAE AMARAE herba, radix. *Polygala amara* L. cl. XVII. Ord. Octandr. Planta perennis in Rossia australi.

Odor radicis et herbae nullus.

Sapor amaricans, acidulus, mucilagineus, praecipue corticis radicis.

Virtus roborans, consolidans, demulcens.

Usus. Phthisis, ulcera pulmonum, tussis, hydrops, arthritis.

Dosis. Radicis drachma dimidia ad integram in pulvere bis de die; vel radicis unciae tres cum aquae libris tribus ad consumptionem dimidiaie partis decoctum, quod per diem exhauritur.

Folia efficaciora sunt sua radice.

POLYPODII radix. *Polypodium vulgare* L. cl. XXIV. Ord. Filices. Perenne in Gubernio Astrachanensi ad thermas, et in nova Rossia trans Borysthenem spontanea, et in quercuum ramis.

Odor nullus.

Sapor initio dulcis, dein nauseose amarus et adstringens.

Virtus resolvens, demulcens.

Usus. Mania, morbi pectoris.

Dosis. Unciae duae cum libris sex aquae coquantur, donec superessent tres; sed plures solo eius infuso acquiescere amant.

PRUNA DAMASCENA, PRUNORUM Pulpa. *Prunus domestica* L. cl. XII. Ord. Monogyn. In Ucraina copiosa arbor.

Odor nullus.

Sapor acido-dulcescens.

Virtus refrigerans, eccoprotica, solvens, antibiliosa.

Usus. Diaeta febrilis, obstructio alvi, morbi biliosi.

Dosis. Pulpae unciae duae ad tres.

PSYLLI semen. *Plantago psyllium* L. cl. IV. Ord. Monogyn. Planta annua in arenosis locis circa Don, Kumansk, et in Calmuccorum desertis copiosissime crescit.

Odor nullus.

Sapor initio nauseoso-mucilagineus, dein acris.

Virtus obtundens, relaxans.

Usus. Ophthalmia, fissurae; In mucilaginis forma extus usurpatur.

PTARMICAE radix, herba cum floribus. *Achillea ptarmica* L. cl. XIX. Ord. Polygam. superfl. Planta perennis per totam Rossiam obvia in pratis subhumidis.

Odor nullus.

Sapor acris.

Virtus sialagoga, sternutatoria.

Usus. Odontalgia, angina pituitosa.

PULEGII herba. *Mentha pulegium* L. cl. XIV. Ord. Gymnosp. Planta perennis hortensis.

Odor recentis et siccae fragrans, spirituosus, graviusculus.

Sapor aromaticus, calidus, linguam calefaciens, camphoratus.

Virtus stimulans, resolvens, errhina, pectoralis, stomachica, emmenagoga, diuretica.

Usus. Asthma, hysteria, obstructio mensium, raucedo.

Dosis. Drachma una cum aquae unciis quatuor infusum.

PULSATILLAE NIGRICANTIS herba. *Anemone pratensis* L. cl. XIII. Ord. Polyg. Planta perennis vernalis in sterilibus campis Rossiae, et Sibiriae crescens.

Odor recentis vix ullus.

Sapor acris, inhaerens, masticando linguam corrodit, siccae sapor primo herbaceus, tandem acris, diu inhaerens.

Virtus diuretica, stimulans.

Usus. Variae oculorum affectiones, cataracta, paralysis, symptomata venerea, ut: dolores artuum nocturni, tophi, ulcera pudendorum, faucium, linguae, caries, testiculus induratus, condylomata.

Dosis. Extracti cum saccharo a granis duobus ad sex, septem, octo ad drachmam unam, per diem.

PYRETHRI radix. *Anthemis pyrethrum* L. cl. XIX. Ord. Polygam. superfl. Planta perennis Europae calidioris, Arabiae, Syriae, regni Tunquensis.

Odor siccae nullus.

Sapor fervidus, initio non perceptibilis.

Virtus apophlegmatizans.

Usus. Odontalgia, paralysis linguae.

Dosis. Vel radicis drachma una masticatur, vel drachmarum duarum decocto os colluitur.

Pyrethri succedaneum habetur: *Cachrys odontalgica*, et *Achillea ptarmica* L.

QUASSIAE lignum. *Quassia amara* L. cl. X. Ord. Monogyn. Arbor in Surinamia, Cayanna, et in insula Antillana Danicae potestatis St. Croix ad oras fluviorum.

Odor nullus.

Sapor intense amarus ligni corticis, sed corticis radicis longe amarior.

Virtus tonica, stomachica, antiseptica.

Usus. Febres remittentes et intermittentes, biliosae, laxitas intestinorum et virium concoctricium debilitas, spasmus oesophagi, colica flatulenta, hysteria, arthritis, diabetes, haematuria rebellis.

Dosis. Drachma una cum aquae unciis duodecim infusum; Vel uncia dimidia in aquae purae libris sex ad dimidiam consumptionem decoquitur, atque, quovis bihorio, unciae tres propinantur.

QUERCUS cortex, folia. *Quercus robur* L. cl. XXI. Ord. Polyandr. Arbor Rossiae australis civis.

Odor totius arboris vix ullus.

Sapor acerbus, stypticus.

Virtus peradstringens, roborans.

Usus. Corticis et foliorum. Prolapsus, angina, erysipelas, scrophulae.

Dosis. Pulveris a granis viginti ad triginta; in infuso drachmae duae; Extus, fots, col-
lutiones.

RANUNCULI ALBI flores, et herba recens.
Anemone nemorosa L. cl. XIII. Ord. Polygyn.
Planta annua verna in nemoribus et dumetis ha-
bitans.

Odor debilis.

Sapor acris, fauces stimulans.

Virtus rubefaciens, vesicans.

Usus. Tertianæ vernalis, tinea capitis, hemicra-
nium, rheumatismus dorsalis; Extus contusa
folia bis per diem applicantur, tempore fri-
goris febrilis ad carpum, in caeteris affectio-
nibus ad partes affectas.

Eundem effectum edunt *Ranunculus acris*,
Ranunculus palustris, *Lanuginosus*, *Bulbo-*
sus, *Sceleratus*, *Arvensis*, *Flammula*, *Lin-*
gua L.

RASURA CORNU CERVI. *Cervus Elephas*
L. cl. I. Mammalia. Pecora. In Rossia australi
et in alpinis Sibiriae. Alce, in Rossia temperata
et Sibiria. Tarandus, in Rossia septentrionali et
summis alpibus Sibiriae.

Odor nullus.

Sapor terreo-gelatinosus, pinguis, oleosus.

Virtus demulcens, sudorifera, nutriens.

Usus. Varia praeeparata.

RHABARBARI vel RHEI radix. *Rheum pal-*
matum L. cl. IX. Ord. Trigyn. Planta perennis,

ex China adfertur, cultura in Russia temperata tentatur.

Odor siccae gravis, specificus, subnauseosus.

Sapor amaricans, subnauseosus, subacris cum adstrictionis aliquo sensu.

Virtus purgans, antacida, adstringens, tonica, antiseptica, stomachica, diuretica, urina luteo-rubicunda.

Usus. Diarrhoea, dysenteria, colica, febris lenta infantum, fluor albus, saburra intestinorum, aphthae, hypochondriasis, rhachitis, affectiones hepatis.

Dosis. A scrupulo uno ad drachmam unam in pulvere; drachmae duae cum aquae unciiis quatuor infusum.

RHABARBARI SIBIRICI radix. *Rheum undulatum* L. cl. IX. Ord. Trigyn. Planta perennis in Sibiria inter fluvium Ienisey et lacum Baikal ad oras lapidosas fluviorum, et alio solo saxoso crescit.

Odor tenuis.

Sapor amarus cum quadam acrimonia adstringente.

Virtus et Usus Rhabarbari veri, dummodo maiori dosi sumatur, nempe duae drachmae pulveris; drachmae quatuor cum aquae unciiis sex infusum.

RHODODENDRI folia et stipites. *Rhododendron chrysanthum* L. cl. X. Ord. Monogyn. Frutex in alpinis nivalibus totius Sibiriae, ad Ie-

niseam et Baikalem, in Camczatka, et in insula Beringii.

Odor siccorum ad rhabarbarinum nonnihil inclinans.

Sapor austerus cum notabili amaritie et acritate.

Virtus narcotica, irritans, antarthritica, diuretica, sudorifera.

Usus. Arthritis, rheumatismus, ischias, podagra, paralysis pedum, dolores artuum venerei.

Dosis. Rp. Stipitum et foliorum Rhododendri drachmas duas, ad unciam dimidiam, infunde aquae fluvialis uncias novem, digeratur in vase bene obturato per viginti quatuor horas. Colaturae dimidium vasculum theanum semel, bis, ter, de die, capiatur.

RIBESIORUM NIGRORUM baccae, folia cum stipitibus. *Ribes nigrum* L. cl. V. Ord. Monogyn. Frutex in boreali Rossia et Sibiria ferus, ad stagnorum et fluviorum ripas, et hortis copiosus.

Odor recentis et sicci totius fruticis fragrans, fere cimicum, baccis etiam non exclusis.

Sapor baccarum recentium dulcescenti-acidulus; Foliorum sapor subausterus.

Virtus foliorum mundificans, pellens, diuretica, sudorifera; Baccarum refrigerans.

Usus. Angina pituitosa, dysenteria; rheumatismus.

Dosis. Folia instar theae; Baccae vero in forma roobis exhibentur.

RIBESIORUM, RIBIUM RUBRORUM Baccae. *Ribes rubrum* L. cl. V. Ord. Monogyn. Frutex in boreali Rossia in locis submontanis sponte crescens, et in hortis.

Odor recentium vix ullus.

Sapor submucilaginosus acido-dulcis.

Virtus refrigerans, antiseptica, solvens.

Usus. Febres continuæ, inflammatoriae, biliosae, putridae.

Dosis. Comeduntur crudæ, vel conditæ, ad unciam dimidiam et ultra.

RICINI VULGARIS, CATAPUTIAE MAIORIS semina. *Ricinus communis* L. cl. XXI. Ord. Monadelph. Planta annua in Rossiae temperatae hortis copiose crescit. Oleum e seminibus demto cortice pressum vocatur oleum Palmae Christi, de Kerva, quod genuinum est crassum et viscosum, recentius et melius est subopacum, quam illud diaphanum, et coloris crocei.

Odor recentis olei nullus.

Sapor blandus.

Virtus purgans anthelmintica, blanda diuretica.

Usus. Hernia incarcerata, taeniae, volvulus, colica nephritica, et pictonum, calculosae affectiones, pertinax alvi obstructio, cardialgia cum vomitu, dysenteria, asthma a vaporibus saturninis.

Dosis. Ab uncia dimidia ad unciam unam adultis; a drachma una ad duas infantibus datur; extus ventri inungitur.

ROSAE DAMASCENAE et RUBRAE flores.

Rosa centifolia et *Rosa gallica* L. cl. XII. Ord. Polygyn. Frutex in omni fere horto hospitatur.

Odor recentium petalorum gratus, fragrans.

Sapor subdulcescens, amarus, substypticus.

Virtus adstringens, ionica.

Usus. Varia praeparata, ut: Aqua rosarum,

Conserva rosarum, Mel rosarum etc.

ROSAE SYLVESTRIS CYNOSBATUS fructus.

Rosa canina L. cl. XII. Ord. Polygyn. Frutex in sepibus et ad margines viarum frequens.

Odor nullus.

Sapor baccae maturae acidulus, dulcis; siccae acidior.

Virtus subadstringens, diuretica, refrigerans, antiseptica.

Usus. Acuti morbi, hydrops, diarrhoea biliosa, dysenteria, haemorrhagia uteri.

In forma conservae, vel decocti baccae exacinnatae exhibentur.

ROSISMARINI HORTENSIS herba, anthos, flores. *Rosmarinus officinalis* L. cl. II. Ord. Monogyn. Frutex in Rossia temperata et australi hortensis.

Odor fragrans, fortis.

Sapor calidus, acris, camphoraceus.

Virtus resolvens, nervina, corroborans, emmenagoga.

Usus. Sugillationes, oedemata, paralysis, asthma pituitosum, hysteria, diarrhoea chronica,

gangraena, infarctus glandularum colli, plica polonica, chlorosis.

Dosis. Drachma una cum aquae unciis quatuor infusum, seu decoctum; Externe potius sacculi, vel epithemata fiunt.

Ex floribus Anthos aqua Hungarica cum spiritu vini destillatione obtinetur.

RORISMARINI SYLVESTRIS herba. *Ledum palustre* L. cl. X. Ord. Monogyn In Russia temperata et boreali, hicce fruticulus sponte crescit.

Odor gravis, subaromaticus.

Sapor subamarus, subadstringens.

Virtus resolvens, diuretica.

Usus. Lepra nodulosa, tussis convulsiva, tineae, scabies, arthritici dolores.

Dosis. A drachmis tribus ad quatuor cum aquae libra una decoctum; Externe lotiones.

RUBIAE TINCTORUM radix. *Rubia tinctorum* L. cl. IV. Ord. Monogyn. Planta perennis in Russia australi spontanea, et colitur Astrachani copiose.

Odor contusae radice fere incidens in corticem sorbi.

Sapor subamarus.

Virtus resolvens, diuretica, emmenagoga, diutius propinata inficiens ossa et humores colore kermesino.

Usus. Calli ossis fracti mollities, ulcera et tumores rachitici, rachitis, icterus pertinax,

obstructio mensium, cachexia et visciditas humorum.

Dosis. Uncia una in decocto per diem, drachma dimidia pulveris omni trihorio exhibetur.

RUBI ARCTICI baccae; *Rubus arcticus* L. cl. XII. Ord. Polygyn. Planta perennis in Rossia boreali et Sibiria spontanea.

Odor recentium fragrans, suaveolens, vinosus, gratissimus.

Sapor acidulo-vinosus.

Virtus refrigerans, analeptica, humectans, antiseptica, antiscorbutica.

Usus. Febrium aestus, scorbutus.

Dosis. Pro lubitu crudae, vel saccharo conditae comeduntur.

RUBI IDAEI baccae. *Rubus idaeus* L. cl. XII. Ord. Polygyn. Frutex in Rossia septentrionali ferus et hortensis.

Odor recentium grate fragrans.

Sapor acidulo-dulcis.

Virtus refrigerans, analeptica.

Usus. Sitis febrium, aestus.

Crudae vel in forma roobis vel syrupi exhibentur.

Paris efficaciae sunt baccae *Rubi caesii*, *Rubi fruticosi*, et *Rubi chamaemori* L.

RUTAE herba. *Ruta graveolens* L. cl. V. Ord. Monogyn. Suffrutex hortorum civis.

Odor gravis, fragrans.

Sapor stimulans, calidus, amaricans, siccae debilior.

Virtus antispasmodica, resolvens, carminativa, sudorifera, rubefaciens.

Usus. Ozaena, parulis, ulcera verminosa, hysteria, affectiones nervorum a nimia sensilitate.

Dosis. Uncia dimidia cum aquae fluviatilis libra una infusum; Extus iniectio, collutoria, succo recens expresso ulcera deligantur.

SABADILLAE semen. *Veratrum sabadilla.*
Retzii. Planta Mexicana.

Odor vix ullus, sed pulverisati vehemens er-rhinus.

Sapor acerrimus, amarissimus, causticus.

Virtus anthelmintica, drastica, irritans, pediculos et cimices necans.

Usus. Taeniae, ascarides, lumbrici, pediculi, cimices.

Dosis. Grana quinque ad drachmam dimidiam cum conserva in bolum redacta, et mane cum melle; scrupulus unus cum syrupo rhei unciis duabus, et dimidium cochlear thea-num bis per diem capitur; in clysmate drachmae duae cum aquae unciis decem ad colaturam unciarum septem coquuntur, et aequali copia lactis miscentur; Extrinsecus axungia exceptum capiti inungitur.

Alia securiora remedia, in morbis enarratis, huic infido drastico, imo toxico praeferenda sint.

SABINAE folia. *Juniperus sabina* L. cl. XXII. Ord. Monadelph. Arbor humilior crescens locis excelsis Sibiriae.

Odor gravis, resinosus, ingratus.

Sapor amarus, calidus.

Virtus emmenagoga, anthelmintica, abortiva.

Usus. Scabies, ulcera cancrrosa fungosa, gangraena, spina ventosa, caries; Externe inspersio, cataplasma.

SACCHARUM est sal essentialis, albus, crystallinus, per vaporationem et depurationem obtentus praecipue ex *Saccharo officinarum* L. cl. III. Ord. Digyn. Gramen perenne in Africa et Asiae inferiori parte, ut India orientali, et Arabia felici, solo aquoso crescens.

Odor nullus.

Sapor dulcissimus.

Virtus saponacea, antiseptica, pectoralis, vulneraria, resolvens.

Usus. Scorbutus, ulcera inveterata, raucedo, tussis, pannus, maculae corneae, diarrhoea biliosa.

Dosis. Uncia una cum aqua, pluries, de die, exhibetur.

SAGAPENUM, seu SAGAPENI gummi: *Sagapenum*. Ex planta quadam umbellata? Est succus concretus sive in granis minoribus ex rubro flavescentibus, semipellucidis cornu referentibus, quodque est durius; seu in massis maiori-

bus fuscis, sordibus inquinatum. Ex Alexandria et Persia venit.

Odor fortis, ingratus, alliaceus.

Sapor gravis amaricans¹ caloris et acrimoniae sensu linguam vellicans.

Virtus emmenagoga, resolvens, maturans, sub-eccoprotica.

Usus. Obstructio mensium, tumores duri, scrophulae.

Dosis. Drachma una in emulsione, pilulis. Extus unguenta, emplastra.

SAGU vel SAGO grana. *Cycas circinalis* L. cl. XXI. Ord. Filices. Arbor crescens in insulis Moluccanis praecipue in insula Ceram, frequens; item in reliquis insulis Asiae australioris, nec non in nova Guinea.

Odor nullus nec *Sapor*.

Virtus nutriens, obtundens.

Usus. Phthisis, tabes, arthritis, profluvia varia alvi.

Dosis. Uncia dimidia, cum aquae libra una decoctum.

SAL AMARUS, SULPHAS MAGNESIAE, est sal medius terrestris ex pura magnesia et acido vitrioli constans. Pari modo, huius indolis est Sal catharticus Sibiricus, prius certo modo depuratus. In Confinibus Irkutiae copiosus.

Odor nullus.

Sapor amaricans.

Virtus solvens, purgans.

Usus. Morbi a saburra primarum viarum, hernia a faecibus incarcerata.

Dosis. Uncia una et dimidia ad uncias duas in libra una et dimidia aquae soluta, scopo purgandi datur, alterandi vero ad drachmas duas.

SAL COMMUNIS, s. CULINARIS. MURIAS SODAE, est sal neuter, ex acido salis, et alcali fixo minerali constans. *Muria fontana* L. cl. II. *Minerae*; *Salia*. Ex lacubus Krimeae copiosissime obtinetur.

Odor nullus.

Sapor salsus, proprius.

Virtus resolvens, antiseptica.

Usus. Pustulae alique morbi cutanei, digestio ciborum promovenda, sugillationes; In enemate, stimuli eccoprotici causa, a drachma una ad unciam dimidiam; Fomenta.

Sal decrepitatus aquae maxime bibulus applicatur calidus cruribus hydropicorum.

SALAP radix. *Orchis mascula, morio, militaris, maculata, pyramidalis, latifolia* L. cl. XX. Ord. Diandr. Plantae perennes in Rossia temperata spontaneae.

Odor recentis hircinus.

Sapor vix ullus, bulbus masticatus tener mucilaginosus fere insipidus; Mucilaginis sapor salsus, aquae marinae, vel salis communis aqua soluti.

Virtus nutriens, obtundens, inviscans.

Usus. Dysenteria, ulcus vesicae, excoariatio intestinorum, dysuria, stranguria, tabes, phthisis.

Dosis. Drachma dimidia pulveris; Drachmae duae cum aquae vel lactis unciis decem ad uncias sex decoctum.

SALICIS cortex. *Salix alba*, item, *pentandra*, *fragilis*, *vitellina* L. cl. XXII. Ord. Diandr. Arbor sponte in sylvis crescens.

Odor fragrans, gratus.

Sapor adstringens, amarus, balsamicus.

Virtus praecipue adstringens, roborans, antiseptica, anthelmintica, febrifuga.

Usus. Febris intermittens, vermes, debilitas ventriculi, gangraena a decubitu, ulcera gangraenosa et inveterata crurum.

Dosis. A scrupulo uno ad duos quavis hora in pulvere; In decocto unciae duae cum aquae sufficienti quantitate ad colaturam unciarum sedecim; Balneum.

SALVIAE herba. *Salvia officinalis* L. cl. II. Ord. Monogyn. Planta perennis in Rossia temperata hortensis.

Odor fortis, graviusculus.

Sapor amaricans, aromaticus, calidus.

Virtus resolvens, roborans, antiseptica.

Usus. Laxitas viscerum, colica flatulenta, ulcera oris, sudores nocturni, lactis stillicidium, gutta rosacea.

Dosis. Drachmae duae cum aquae unciis octo infusum, cuius unciae duae omni trihorio dantur.

SAMBUCI cortex medianus, seu interior; flores; baccae recentes. *Sambucus nigra* L. cl. V. Ord. Trigyn. Arbor in Rossia australi spontanea et Petropoli persistens.

Odor corticis intermedii recentis ingratus, virosus.

Sapor primum dulcescens, dein amaricans, acris, nauseosus.

Odor florum fortis, non ingratus.

Sapor amaricans.

Odor baccarum recentium debilior.

Sapor acidulus.

Virtus corticis recentis purgans, hydragoga, subemetica; Florum siccorum diaphoretica, lactifera, discutiens; Baccarum sudorifera, refrigerans.

Usus corticis. Hydrops, tumores oedematosi; Florum et Baccarum. Erysipelas, rheumatismus, arthritis, exanthemata.

Dosis. Corticis uncia una cum aquae libra una ad uncias octo decoctum; Florum drachmae duae ad tres cum aquae unciis quatuor infusum; Baccarum, sub forma roobis, uncia una.

SANTONICI, seu CINAE semen. *Artemisia judaica* et *Artemisia contra*. L. cl. XIX. Ord. Polygyn. superfl. Planta perennis, in Palaestina et

Arabia; Postrema species, spontanea in Rossiae desertis salsis, ad mare Caspium.

Odor fortis peculiaris, subnauseosus.

Sapor valde amarus, subacris.

Virtus anthelmintica.

Usus. Lumbrici.

Dosis Scrupulus unus pulveris subtilissimi infantibus; Drachma una adultis cum melle.

SAPO WOLOGDENSIS est massa ex sevo, et cineribus salinis constans, Wologdae, et aliis in urbibus paratur.

Odor vix ingratus.

Sapor pinguis, acriusculus.

Virtus resolvens, irritans, abstergens.

Usus externus. Sordities ulcerum, scabies crustosa, tumores frigidi indurati.

In forma lotionum, fots, suppositorii adhibetur

SAPONARIAE radix. *Saponaria officinalis* L. cl. X. Ord. Digyn. Planta perennis in Rossia temperata spontanea.

Odor nullus.

Sapor subdulcis, amaricans, subglutinosus.

Virtus saponacea, detergens.

Usus. Tumores rheumatici, arthritici, ulcera sordida, morbi cutanei, icterus.

Dosis. Radicis uncia dimidia cum aquae libra una ad uncias quatuor decoctum.

SARSAPARILLAE radix. *Smilax sarsaparilla* L. cl. XXII Ord. Hexandr. Frutex in regno Peruviano, Mexicano, ex Brasilia crescens.

Odor vix ullus.

Sapor farinosus vix amaricans, obvolvens.

Virtus mundificans, resolvens.

Usus. Syphilis, rheumatismus.

Dosis. Unciae tres cum aquae libris tribus ad colaturam librarum duarum, singulo die hauriantur.

Huic radici ut substituantur radices *Caricis arenariae*, et *Graminis* L. ratio et experientia iubent.

SASSAFRAS lignum, CORTEX ligni sassafras.

Laurus sassafras L. cl. IX. Ord. Monogyn. Arbor Americae meridionalis propria.

Odor ligni fragrans ad foeniculum accedens.

Sapor aromaticus, leniter acris, subdulcis.

Odor corticis Saporque sunt fragrantiores.

Virtus resolvens, sudorifera, diuretica.

Usus. Rheumatismus frigidus, podagra, pituitosae affectiones, ascites.

Dosis. Ligni uncia dimidia pro aquae libra una infusum; Corticis drachma una cum aquae unciiis sex infusum.

SCAMMONIUM est succus accessu aëris inspissatus, gummoso-resinosus, corruptelae expers, levis est, in fracta superficie splendens, et inter digitos friabilis, attactu digiti humidi luteus statim evadit, aqua solutus, lacteum liquorem coloris viridescantis repraesentans, effluit e vulnerata radice *Convolvuli scammoniae* L. cl. V. Ord. Monogyn. Planta perennis crescens in catena mon-

tium, qui inde ab Antiochia usque ad montem Libanon sese extendunt, in monte Tauro, et in Syria.

Odor nauseosus.

Sapor initio nullus, dein subacris, amaricans, salivam proliciens.

Virtus purgans, hydragoga.

Usus. Morbi chronici robustiorum.

Dosis. A granis quinque ad decem, quindécim.

Resinae scammonii à granis duobus ad octo, cum amygdalis, vel vitello ovi tritae.

Scammonium prostat sub tribus nominibus, I. Aleppense, quod est optimum. II. Smyrnaeum, quod est vilius. III. Antiochenum idque vilissimum.

SCILLAE, seu SQUILLAE radix. *Scilla maritima* L. cl. VI. Ord. Monogyn. Planta perennis Europae calidae et Orientis, locis arenosis propria.

Odor vix ullus.

Sapor intensius amarus, acris, ingratus, diu inhaerens.

Virtus valde stimulans, resolvens, diuretica, anthelmintica.

Usus. Hydrops, asthma, nephritis sabulosa, catarrhus suffocativus.

Dosis. Pulveris recentis grana duo cum cremoris tartari drachma dimidia, ter, quater de die.

SCORDII herba. *Teucrium scordium* L. cl. XIV.
Ord. Gymnosp. Planta perennis in Rossia australi
spontanea.

Odor Allium cum levi aromate spirans.

Sapor intense amarus.

Virtus roborans, antiseptica, diaphoretica, diu-
retica.

Usus. Debilitas ventriculi, gangraena, ulcera
sordida, herpes.

Dosis. Infusum theaeforme; Externe cataplas-
ma, gargarisma.

SEDI MAIORIS, seu SEMPERVIVI MAIO-
RIS folia virentia. *Sempervivum tectorum* L.
cl. XI. Ord. Dodecagynia. Planta perennis in
montibus Walday copiose crescit.

Odor recentium debilis.

Sapor subacidus, leniter stypticus.

Virtus refrigerans, adstringens.

Usus. Haemorrhoides, aphtae, ambustiones,
ulcera serpentia, clavi pedum, fissurae papil-
larum nutricum, rhagades linguae febricitan-
tium, ephelides faciei.

Externe folia recentia subcontusa partibus mor-
bosis applicantur, vel in forma linctus.

SENEGAE radix. *Polygala senega* L. cl. XVII.
Ord. Octandr. Planta perennis in Virginia, Pen-
sylvania, Marilandia crescens.

Odor nullus.

Sapor primo farinaceus, post subacidus, deni-
que pungens.

Virtus subemetica, diaphoretica; diuretica, expectorans, anticolubrina.

Usus. Morsus Colubri crotalophori et aliorum serpentum, pleuritis, peripneumonia, febris rheumatica, hydrops, asthma humidum.

Dosis. Radicis uncia una cum aquae libris duabus coquitur et huius decocti cochlearia tria quavis hora sorbillanda dantur. In pulvere a granis decem ad triginta.

SENNAE ALEXANDRINAE folia, folliculi.

Cassia senna L. cl. X. Ord. Monogyn. Planta annua crescit in Aegypto, Arabia, Tripoli, et Italia.

Odor ingratus.

Sapor amaricans, nauseosus, subviscidus.

Virtus purgans.

Usus. Morbi a saburra intestinali.

Dosis. Drachmae tres cum aquae uncis quatuor infusum. Folliculorum sennae eadem dosis.

Alexandrina folia in commercio, de la Palte dicta, sunt optima, quae sunt ovata, superius acuminata, viridia cum suffuso flava. Quae ex Tripoli veniunt, prioribus substituantur, sunt maiora, plane viridia, superius obtusa et aspera. Ea vero, quae ex Italia et Gallia, sunt obtusa lata, pulchre viridia et magnis venis praedita, caeteris debiliora, et saepe cum *Colutea arborescent* L. adulterantur.

SERPENTARIAE VIRGINIANAE radix. *Aristolochia serpentaria* L. cl. XX. Ord. Hexandria. Planta perennis crescit in Virginia et Carolina.

Odor fragrans, camphoram spirans.

Sapor amarus, pungens, inhaerens.

Virtus irritans, diaphoretica, antispasmodica.

Usus. Febres lentae nervosae, intermittentes praecipue dum post paroxysmos febriles sudores non veniunt, febris biliosa putrida, angina gangraenosa, gangraena, morsus serpentis, morbi exanthematici.

Dosis. Pulveris a scrupulo uno ad drachmam unam; sive in infuso.

SERPYLLI herba. *Thymus serpyllum* L. cl. XIV. Ord. Gymnosp. Suffruticulus in australibus Rossiae, et Sibiria spontaneus.

Odor fragrans, gratus.

Sapor aromaticus, subamarus.

Virtus resolvens, nervina, diuretica, emmenagoga.

Usus. Paralysis linguae, stagnantes humores, partes laxae.

Dosis. Drachma una cum aquae unciiis quatuor infusum; Externe sacculi, fomenta.

SEVUM BOVINUM. Pinguedo solida ex omento *Bovis tauri*. Et sebum ovillum, pinguedo ovis arietis. L. cl. I. Mammalia; Pecora.

Odor nullus.

Sapor pinguis.

Virtus emolliens, relaxans.

Usus. Unguenta, emplastra.

SILIQUA DULCIS. *Ceratonia siliqua* L. cl. XXIII. Ord. Trioec. Arbor vulgatissima Europae calidae et orientis.

Odor nullus.

Sapor dulcis, melligenus, siccatae siliquae sunt sapidiore, quam recentes.

Virtus edulcorans, expectorans.

Usus. Soda, raucedo, asthma, tussis.

Dosis. Uncia una et dimidia cum aquae unciiis octodecim ad libram unam decoctum.

SIMARUBAE cortex. *Quassia sinaruba* L. cl. X. Ord. Monogyn. Arbor alta, locis arenosis Cayennae, Guianae et in insula Sandominicana crescens.

Odor nullus.

Sapor amarus.

Virtus tonica, diuretica, stomachica.

Usus. Dysenteria, diarrhoea chronica, colica habitualis deiectionibus cruentis stipata, affectiones coeliacae, obstinata uteri haemorrhagia, fluor albus.

Dosis. Drachma dimidia pulveris; Drachmae duae ad quatuor cum aquae libris duabus ad unam decoctum, cuius quarta pars omni trihorio exhibetur; Extus, injectio, clyisma.

SINAPIS semen. *Sinapis nigra* L. cl. XV. Ord. Siliquosa. Planta annua in Rossia temperata fera et hortensis, Astrachani copiosa colitur.

Odor debilis.

Sapor subamarus, acris.

Virtus rubefaciens, stimulans.

Usus. Scorbutus, cachexia, paralysis linguae, languens eruptio variolarum et morbillorum, suppuratio tumorum aegrius procedens, per-
niones, arthritici dolores, hydrops.

Dosis. Ad drachmam integram cum aqua; sed praecipue in sinapismo seu cataplasmate epispastico adhibetur.

Semina *Sinapeos albae* L. eandem virtutem possident.

SPATUM PONDEROSUM L. *Syst. nat.* III. p. 81. SULPHAS BARYTAE. Est sal medius terrestris acido sulphurico et baryta pura constans. Per totam Europam reperitur.

Usus. Praeparata, ut Terra ponderosa salita.

SPERMA CETI. Est pinguedo ex cerebro *Physeteris macrocephali* L. in mari Groenlandico degentis, excocta, lotione, expressione et ope lixivii alcalini depurata et in substantiam albam pinguem e lamellis siccis et splendentibus compositam, sole, et aëre, efformata.

Odor nullus.

Sapor pinguis.

Virtus emolliens, demulcens.

Usus. Fissurae cutis, unguenta, emplastra.

SPIGELIAE ANTHELMIAE herba cum radice. *Spigelia anthelmia* L. cl. V. Ord. Monogyn. Planta annua Americae meridionalis et Brasiliae spontanea.

Odor et Sapor foetidus.

Codex medic. Europ. Sect. V. P. I.

Virtus narcotica, purgans, anthelmintica.

Usus. Lumbrici, exinde convulsiones.

Dosis. Adultis drachmae duae cum aquae unciis sex infusum, cuius dimidium vesperi, alterum postridie; in pulvere a scrupulo ad drachmam integram de die, continuatione per aliquot dies facta exhibetur.

SPIGELIAE MARYLANDICAE radix. *Spi-gelia marylandica* L. cl. V. Ord. Monogyn. Planta perennis crescens in Carolina australi, solo profundiori fertili.

Odor, Sapor et Virtus praecedentis sed efficacior.

Usus. Febres verminosae, vermes.

Dosis. In pulvere infanti bienni grana duodecim de die bis, in infuso vero grana viginti cum lacte et saccharo; Adultis ad drachmam dimidiam quater per diem, vel ad drachmas duas in infuso.

SPONGIA MARINA. Est habitaculum vermis zoophyti, vel polypi, cellulosum, in mari mediterraneo et rubro obvium, leve, elasticum, coloris citrini, plurimis exiguis foraminibus pervium. *Spongia officinalis* L. cl. VI. Vermes. Zoophyta.

Odor proprius minus gratus.

Sapor nullus.

Virtus humidum absorbens, absorptionem puris impediens. Spongiae ustae resolvens, exsiccans. Praeparatae seu cera penetratae obturans, dilatans.

Usus. Spongiae ustae. Strumae; Praeparatae.
Haemorrhagiae.

Dosis. Ustae ad scrupulos duos.

STANNUM. Est omnium metallorum levis-
simum, parum tenax, facile malleabile, vix ela-
sticum, molle, flexile, in acidis ac alcalibus so-
lubile. *Stannum crystallinum* L. cl. Minerae.
Metalla. In Anglia maxime et in Germania re-
peritur.

Odor inter manus fricti peculiaris.

Sapor metallicus.

Virtus, Usus Dosisque. Vide Part. II. Stan-
num praeparatum.

STRAMONII herba recens. *Datura stramo-
nium* L. cl. V. Ord. Monogyn. Planta annua
Rossiae temperatae in ruderatis spontanea.

Odor virosus, narcoticus, fortior, praecipue in
foliis fricatis.

Sapor amarus.

Virtus anodyna, resolvens, antispasmodica, in-
ebrians, nimia dosi venenata.

Usus. Convulsiones, epilepsia, mania.

Dosis. Extracti granum unum bis, ter, vel se-
xies de die cum camphora, vel extracto
amaro in pilulis.

SUCCINUM. *Succinum electricum* L. cl. II.
Minerae. Sulphura. Est Bitumen plus minus
pellucidum, albidum, vel citrinum, fragile, electri-
cum. Copiosissimum in mari Baltico reperitur.

Odor, si prunis ardentibus iniicitur, fragrans.

Sapor subacris.

Virtus resolvens, discutiens.

Usus. Tumores frigidi, aër impurus; Externe suffitus.

SULPHUR est corpus simplex, combustionem suam, sive copulationem cum oxygenio acidum sulphuricum generans. Occurrit passim nativum circa Samaram ad Volgam. Recipi debet flavum in cylindros fusum, quod quidem citrinum dicitur, aut vivum, aut in flores sublimatum.

Odor nisi fricetur nullus, accensi acidus, suffocans, penetrantissimus.

Sapor modo purum nullus.

Virtus resolvens, diaphoretica, anthelmintica.

Usus. Scabies, chronica cutis exanthemata, rheumatismus, arthritis, exanthema retrogressum, asthma humidum, haemorrhoides coecae, obstructio glandularum, mesenterii, rachitis et atrophia infantum.

Dosis. Grana quinque, decem, viginti, triginta ad drachmam integram; Extus unguenta.

SYMPHYTI seu CONSOLIDAE MAIORIS radix. *Symphytum officinale* L. cl. V. Ord. Monogyn. Planta perennis, in pratis humidis, ad fossas, rivos, ubique frequentissima.

Odor nullus.

Sapor mucilagineus.

Virtus inviscans, emolliens.

Usus. Haemoptysis, diarrhoea, dysenteria, haematuria et stranguria.

Dosis. Uncia dimidia cum aquae unciis octo ad uncias sex decoctum; Fodus, Cataplasma.

TACAMAHACA est gummi resina; quam *Populus balsamifera*? L. cl. XXII. Ord. Octandr. et *Fagara octandra* L. cl. VI. Ord. Monogyn. erogant. *Populus balsamifera* in Sibiria, praecipue ad Ieniseum; *Fagara octandra*, in Curaçao Americis, et in insula Francia crescit.

Odor gratus, fragrans, validus in flores *Lavendulae* incidens.

Sapor leniter amaricans, nauseosus.

Virtus roborans, resolvens.

Usus. Dolores frigidi, hysteria.

Dosis. Externe in forma suffimigii et emplastri.

TAMARINDORUM fructus, pulpa. *Tamarindus indica* L. cl. III. Ord. Monogyn. Arbor crescens in India orientali, Arabia, Aegypto et America calidiori.

Odor subvinosus.

Sapor grate acidus.

Virtus eccoprotica, antibiliosa, refrigerans, antifebrilis.

Usus. Erysipelas, aestus omnis febrilis, coluvies biliosa seu putrida, diarrhoea biliosa, dysenteria epidemica, calculus felleus, ascites.

Dosis. Ad uncias duas.

Pulpa ante usum a fibris, seminibus, membranis purgari debet, quod fit, eius in aqua calida solutione, colatione et post additum

Saccharum inspissatione. Tamarindos cupro inquinatos esse exinde certum est, dum clavus ferreus aut culter, solutioni fervidae immittitur per dimidium horae, et frigefactus colorem cupreum acquirit.

TANACETI herba, semen. *Tanacetum vulgare* L. cl. XIX. Ord. Polyg. superfl. Planta perennis ubique crescens.

Odor fortis, gravis, acutus.

Sapor valde amarus, aromaticus.

Virtus resolvens, roborans, anthelmintica praecipue seminis.

Usus. Vermes, hysteria, arthritis, hydrops, anorexia.

Dosis. Drachma una cum aquae unciis sex infusum; Scrupulus unus ad integram drachmam in pulvere.

TARAXACI radix, herba recens. *Leontodon taraxacum* L. cl. XIX. Ord. Polyg. aequal. Planta perennis ad vias et in pascuis vulgaris.

Odor nullus.

Sapor initio obscure dulcescens, tum amarus.

Virtus solvens, aperiens, diuretica.

Usus. Obstructio viscerum, hydrops, icterus, oedema crurum, herpes, scrophulae.

Dosis. Unciae duae sueci recentis cum iusculo per plures septimanas; Vel herbae et radices recentis uncia una cum libra una iusculi ad uncias octo decoctum; Extracti a granis decem ad drachmam unam.

TARTARUS VINI est sal neuter acidulus proprio acido et potassa constans, spontaneo ex vinis secessu obtinetur, a partibus extractivis et colorantibus coctione cum argillis, et crystallisatione mundatus vocantur Crystalli tartari, sive Cremor tartari.

Odor levis.

Sapor acido-salinus.

Virtus antiphlogistica, diuretica, solvens, maiori dosi eccoprotica.

Usus. Morbi a saburra primarum viarum, ut: erysipelas biliosum, hydrops, haemorrhoides coecae.

Dosis. Scopo purgandi ab uncia dimidia ad unciam unam cum pulpa tamarindorum; Scopo alterandi drachma dimidia bis, ter de die.

TEREBINTHINA LARIGNA, seu **VENETA**.
OLEUM TEREBINTHINAE. COLOPHONIUM.
Pinus larix L. cl. XXI. Ord. Monadelph. In gubernio Archangelopolitano, et Sibiria crescit copiosissima. Haec est liquidior Terebinthina communi, syrupi spissitudinem habens, clara, pellucida, coloris albi, vel pallide lutei.

Odor gravis, ingratus.

Sapor pungens, amaricans, sed mitior Terebinthinae communis.

Virtus diuretica, antiseptica, adhaesiva, extus digerens, resolvens.

Usus. Gonorrhoea, retentio urinae, absenti-

bus febris plethoraeque, hydrops, ulcera, relaxatio ani, sabulum.

Dosis. A scrupulo dimidio ad scrupulum integrum supraque in pilulis, sive in emulsione cum vitello ovi, seu gummi arabico; Extus in unguentis, emplastris, in clysmate praecipue contra colicam, et rebellem constipationem alvi.

Virtus olei terebinthinae s. spiritus terebinthinae destillatione obtenti maxime resolvens, diuretica, sudorifera, irritans; Externe anodyna, antispasmodica, styptica.

Usus internus. Calculi biliarii, rebellis rheumatismus, anchylosis chronica, malum ischiaticum; Sed externus magis est praestans, ut: laesiones nervorum, tendinum, membranarum, arteriarum, venarum, tumores cystici frigidi, ganglia, paralytica membra, gangraena.

Dosis. Ad grana duodecim supraque cum melle; Externe lintea oleo madida calide applicentur.

Odor et Sapor Colophonii balsamicus.

Virtus resolvens, digerens, adhaesiva.

Usus externus. Tumores, ulceraque articulationum, suffitus in rhachitide; Emplastra.

TERRA CATECHU, seu JAPONICA est succus, aut potius extractum aquosum elicatum ex *Mimosa Cate Murray*. Ex *Mimosa Catechu* L. ab *Areca Catechu* Spielmanni et Bergii. Arbor

copiose crescit in montibus Rotas, et Pallamoro, supra Bengaliam sitis.

Odor nullus.

Sapor austerus, subamarus, dein dulcescens, linguae diu inhaerens.

Virtus adstringens, stomachica, valde antiseptica.

Usus. Haemorrhagiae a sanguinis dissolutione, putredo, foetor oris, dentium vacillatio, ulcera gingivarum, diarrhoea et dysenteria ex laxitate, fluor albus, aphtae.

Dosis. A granis decem in pulvere; Sive cum aqua aromatica ad drachmam dimidiam.

Dum hic succus est genuinus, tunc in aceto vini et spiritu vini totus solvitur.

THYMI herba. *Thymus vulgaris* L. cl. XIX. Ord. Gymnosp. Planta perennis in Rossia australi spontanea.

Odor fragrans, non adeo gratus; recentis suavior.

Sapor pungens cum amaritie, non adeo gratus, calidus.

Virtus resolvens, emmenagoga, diuretica, tonica.

Usus. Diathesis pituitosa.

Dosis. Drachmae duae cum aquae unciiis quatuor infusum.

TORMENTILLAE radix. *Tormentilla erecta* L. cl. XII. Ord. Polyg. Planta perennis in tota Rossia per sylvas et pascua sterilia spontanea.

Odor nullus.

Sapor stypticus.

Virtus adstringens, tonica.

Usus. Prolapsus, laxitas articuli, vacillatio dentium.

Dosis. Drachma una et dimidia cum aquae unciis sex ad uncias quatuor decoctum, praecipue externe applicatur.

TRAGACANTHAE gummi. *Astragalus tragacantha* L. cl. XVII. Ord. Decandr. Frutex orientis et Europae australis proprius.

Odor nullus, *Saporque.*

Virtus obvolvens, glutinans, demulcens.

Usus. Fissurae papillarum et labiorum, dysenteria, diarrhoea, stranguria.

Dosis. Drachma dimidia ad integram cum aqua praecipue in clysmate.

Colore variat, unde distinguitur in Tragacantham albam, et flavam, seu rufam. Prior, utpote purior, unice in medicum scopum servari debet; Altera sordibus variis inquinata, opificibus relinquenda est.

TRIFOLII FIBRINI herba. *Menianthes trifoliata* L. cl. V. Ord. Monogyn. Planta perennis in Russia et Sibiria, locorum paludosorum et lacustrium incola.

Odor nonnihil fatuus.

Sapor amarissimus.

Virtus tonica, antiseptica, anthelmintica.

Usus. Scorbutus, icterus, obstructions visce-

rum, tinea, serpigo, impetigo, achores, scabies, fistulae, et ulcera antiqua, arthritis.

Dosis. Drachmae duae cum aquae libra una infusum; Succı cochlear unum quovis mane.

TRITICI seminis farina. *Triticum hybernum* L. cl. III. Ord. Digyn. Planta biennis, ubique in agris seritur.

Odor farinae nullus.

Sapor farinaceus, subinsipidus.

Virtus absorbens, resolvens, emolliens.

Usus externus. Suppressa transpiratio partis, tumores erysipelatosi, serosi, oedematosi, arthritici, rheumatici, sub forma fomentationum.

VALERIANAE SYLVESTRIS, seu MINORIS radix. *Valeriana officinalis* L. cl. III. Ord. Monogyn. Planta perennis per totam Rossiam et Sibiriam in locis humidis, sed quae in montosis crescit, efficacior est.

Odor fragrans, subgravis, subnauseosus.

Sapor amaricans, ingratus, subacris.

Virtus roborans, antispasmodica, diaphoretica, emmenagoga, diuretica, anthelmintica.

Usus. Epilepsia, hysteria, vertigo, chorea St. Viti, vermes, catalepsis, rabies canina, hemi-crania, paralysis, amaurosis, febris putrida, febres intermittentes, visus habetudo.

Dosis. A scrupulo uno ad drachmam dimidiam omni bihorio vel trihorio; Uncia dimidia ad libram unam aquae ad uncias sex

vase clauso decoctum. Olei destillati, quod maioris est praestantiae, guttulae sex ad octo cum saccharo; Extracti aquosi a granis decem ad quindecim ter per diem cum liquore anodyno.

Radix a squalore liberata et probe siccata in vase vitreo probe obturato accuratissime compingenda, et loco sicco frigidoque, ob partes eius volatiles servanda est, in collectione ne confundatur cum *Valeriana dioica* L. quae minores habet fibrillas, et debiliorem odorem.

VANILLAE siliquae, seu VANILLA. *Epidendrum vanilla* L. cl. XX. Ord. Diandr. Planta parasitica, arboribus in America australi et insulis Indiae occidentalis adhaerens.

Odor fragrans, inhaerens exacte Balsami peruviani, vel Styracis, vel Ambrae.

Sapor blande aromaticus, subacidus, unctuosus.

Virtus calefaciens, diuretica.

Usus. Chocolata.

VERBASCI flores, folia. *Verbascum thapsus* L. cl. V. Ord. Monogyn. Planta biennis sponte ubique crescit.

Odor foliorum nullus.

Sapor herbaceus, subamaricans.

Odor florum recentium suavis.

Sapor melleus.

Virtus foliorum emolliens, resolvens.

Usus. Pectoris affectus.

Dosis. Florum drachmae duae cum aquae unciis quatuor infusum; Foliorum unciae duae ad aquae libras duas decoctum; Cataplasma; Enema.

VERMIS MAIALIS, seu SCARABAEUS UNCTUARIUS. *Meloe proscarabaeus* L. cl. V. Insecta, coleoptera. In campis apricis habitans.

Odor nullus.

Sapor acris.

Virtus irritans, diuretica, maiori dosi caustica.

Usus. Morsus canis rabidi, hydrophobia.

Dosis. Adultis omni hora granum unum huius insecti cum aliquot granis nitri contriti datur.

Vermes hi-mense Majo tempestate sicca calida sunt colligendi, ea cum cautela, ut forcipula, leviter absque pressione, ne exsudans mucilago perdat, capti, et capite caute abscisso, trunci eorum statim vitro melle aliquantum repleto, postea bene obturando, immittantur.

VERONICAE herba. *Veronica officinalis* L. cl. II. Ord. Monogyn. Planta perennis ubique per silvas steriles frequens.

Odor vix ullus.

Sapor amaricans, subadstringens.

Virtus pectoralis, tonica, roborans.

Usus. Asthma, tussis, pituita.

Dosis. Drachmae tres cum aquae unciis octo infusum.

VIOLAE flores. *Viola odorata* L. cl. XIX.
Ord. Monogam. Planta perennis in Rossia australi spontanea.

Odor florum recentium gratissimus, specificus.

Sapor mucilaginosus, amaricans.

Virtus florum recentium subanodyna.

Usus. Syrupus.

VIOLAE TRICOLORIS, seu JACEAE herba.
Viola tricolor L. cl. XIX. Ord. Monogyn. Planta annua, in hortis et pratis frequens.

Odor herbae recentis gratus in flores Naphae incidens; Siccae nullus.

Sapor mucilagineus cum sensu acredinis.

Virtus subemetica, laxans, siccatae depurans, diuretica.

Usus. Crusta lactea infantum, tinea, achores, serpigines, herpes, impetigo, scabies, gutta rosacea.

Dosis. Herbae recentis drachmae duae, s. siccatae drachma una, cum unciis sex aquae ebullientis infusum, per diem; Vel pulveris a granis decem ad drachmam unam cum saccharo bis de die. Protrahitur usus huius herbae, donec lotium fetoris felini in totum expers fuerit.

VITIS IDAEAE baccae, folia. *Vaccinium vitis idaea* L. cl. VIII. Ord. Monogyn. Fruticulus sempervirens, ferus in sylvis ubique per Rossiam frequens.

Odor baccharum nullus.

Sapor grate acidus.

Virtus refrigerans, antiseptica, refocillans.

Usus baccarum. Febrium aestus; In forma syrupi, roobis. Folia huius plantae vi sua adstringente in calculo pellendo aemulantur folia Uvae ursi.

VITRIOLUM ALBUM sive ZINCI. SULPHAS ZINCI ex zinco et acido vitrioli conflatum solutione repetita et crystallisatione depuratum. *Vitriolum zinci* L. cl. II. Mineræ. Salia. Paratur in Goslariæ officinis.

Odor nullus.

Sapor nauseosus, austerus.

Virtus adstringens, antiseptica, præstans ophthalmica, emetica.

Usus internus. Venena narcotica, fungi venenati comesti, debilitas hysterica, asthma spasmodicum et convulsivum, epilepsia, fluor albus, colica saturnina, hæmorrhagiæ; Externe scabies, ulcera dysepulotica, aphthæ, lapsus palpebræ, oculi rubentes lacrymas fundentes, nebulae, maculae corneae, fistula lacrymalis a depositione materiae, angina catarrhalis, odontalgia.

Dosis. A grano dimidio ad duo, quinque ad scrupulum unum; Externe collyria, e. gr. Granum unum ad unciam unam aquae rosarum. Sive, drachma dimidia vitrioli ad aquae rosarum uncias sex, cum melle roseo uncia una Gargarisma, quo saepius eluitur os; Unguentum.

VITRIOLUM COERULEUM, VITRIOLUM CYPRIUM, CUPRUM VITRIOLATUM, SULPHAS CUPRI, ex acido vitrioli et cupro constat. *Vitriolum cupri* L. cl. II. Mineræ. Salia. Passim, sive ex gleba cupri pyritosa, sive aes cum sulphure calcinando paratur.

Odor nullus.

Sapor nauseoso-acris, valde stypticus.

Virtus corrosiva, styptica.

Usus externus. Ulcerum caro luxurians.

VITRIOLUM MARTIS, FERRUM VITRIOLATUM, SULPHAS FERRI, ex acido vitrioli et ferro constat. *Vitriolum ferri* L. cl. II. Mineræ. Salia. Existit nativum, vel arte paratur ex terris, et schistis hoc sale gravidis, potissimum ex pyritis fatiscentibus atque ustulatis, indigenum.

Odor nullus.

Sapor adstringens.

Virtus styptica, roborans.

Usus. Haemorrhagiae periculosissimæ a relaxatione, pollutiones nocturnæ, diurnæ, chlorosis, rhachitis, vermes.

Dosis. Granum unum ad grana quatuor infantibus; Scrupulus unus ad drachmam unam cum saccharo, vel aquae libra una adultis; Externe, lintea huius salis solutione madida applicantur. Ad usum medicum præparent ipsi Pharmacopoei.

ULMI cortex medius ramorum, vel radicum.
Ulmus campestris L. cl. V. Ord. Digyn. Arbor
in Rossia temperata frequens.

Odor nullus.

Sapor subamaricans, glutinosus.

Virtus tonica, antiseptica, diuretica.

Usus. Lepra, scabies, fluor albus, herpes universalis, rheumatismi rebelles, tinea capitis, scrophulae, ascites.

Dosis. Unciae quatuor in aquae libris quatuor ad remanentiam librarum duarum decoctum, cuius unciae octo mane et vespere exhauriuntur, cum eiusdem decocti lotionem partium affectarum.

VOMICA NUX. *Strychnos nux vomica* L.
cl. V. Ord. Monogyn. Arbor in Malabar et
Zeylona crescens.

Odor nullus.

Sapor valde amarus.

Virtus tonico-narcotica, venenata, pandiculationes, convulsiones saepe vehementissimas excitans, nimia dosi deleteria.

Usus. Morsus Colubri Najae, rabies canina, hydrophobia.

Dosis. Ad grana quatuor cum maxima cautela.

UVAE URSI folia. *Arbutus uva ursi* L. cl. X.
Ord. Monogyn. Fruticulus sempervirens in Ros-
sia septentrionali spontaneus.

Odor foliorum siccorum in Glycyrrhizae radi-
cem, vel eius extractum incidens.

Sapor stypticus, dein amarus.

Virtus adstringens, diuretica, tonica.

Usus. Sabulum, calculus, ulcera renum et ve-
sicae, ischuria a calculis, fluor albus et in-
continentia urinae.

Dosis. Drachma dimidia bis, ter, quater de
die in pulvere; vel foliorum drachmae duae
cum libra una aquae decoctum.

WINTERANUS s. MAGELLANICUS COR-
TEX. *Wintera aromatica* L. cl. XIII. Ord. Po-
lygyn. Arbor sempervirens ad fretum Terrae
Magellanicae habitans.

Odor dum teritur gratus, aromaticus ad caryo-
phyllaceum accedens.

Sapor aromaticus, linguam faucesque urens,
diu inhaerens.

Virtus antiscorbutica, calefaciens, antiseptica,
sudorifera, carminativa, resolvens, stoma-
chica, saporem odoremque remediorum quo-
rundam nauseosorum corrigit, ut: Sennae
et Rhei.

Usus. Obstructio glandularum mesenterii,
scorbutus.

Dosis. Drachma dimidia pulveris; Drachmae duae cum aquae unciis sex infusum.

ZEDOARIAE LONGAE, ROTUNDAE radix. *Amonum Zedoaria* Bergii. *Kaempferia rotunda* L. cl. I. Ord. Monogyn. Planta perennis. Indiae orientalis, nominatim Malabariae et insulae Luzonis.

Odor camphoraceus.

Sapor aromaticus, acris, amaricans, calidus, diu in ore remanens.

Virtus roborans, incidens, stimulans, sudorifera, emmenagoga, anthelmintica.

Usus. Hysteria, nausea, vermes.

Dosis. Drachma dimidia in pulvere cum saccharo; Drachma una cum vini unciis sex infusum.

ZINCUM est metallum lamellosum, ex coeruleo-argenteum nitoris constantis. *Zincum mineralisatum* L. cl. II. Minerae. Metalla. In India, Anglia, atque Hercynia, potissimum ex Pseudogalena eliquatur.

Odor et Sapor nullus.

Virtus et Usus. Vid. Flores zinci Part. II.

ZINGIBERIS NIGRI, ALBI radix. *Amonum Zingiber* L. cl. I. Ord. Monogyn. Planta perennis, in India orientali, item, in insula Ma-

dagascar, Guinea et aliis Africae occidentalis regionibus spontanea.

Odor fragrans, nares vellicans.

Sapor valde acris, os totum fervoris sensu afficiens.

Virtus calefaciens, incidens, stomachica, stimulans.

Usus. Anorexia, colica flatulenta, tussis convulsiva infantum, uvula ex pituita tumens.

Dosis. Grana decem in pulvere; drachma dimidia cum vini unciiis sex infusum; Collutorium; Condita radix dimidia, vel integra manducata deglutitur.

PHARMACOPOEAE ROSSICAE

P A R S II.

DE

P R A E P A R A T I S

ET

C O M P O S I T I S.

ACETUM ANTISEPTICUM.

Recipe Herbarum Absynthii

Rutae

Menthae

Salviae

Rorismarini ana uncias duas,

Florum lavendulae uncias duas,

Radicum angelicae

Imperatoriae ana unciam unam

et dimidiam,

Spicarum allii drachmas duas.

Mixta incisa, digere in aceti vini libris octo in cucurbita vitrea probe clausa, iusto calore per duodecim, sive balneo arenae, per tres dies; Liquor fortiter expressus, filtratus usui servetur.

Si expetitur hoc acetum cum camphora, tunc camphorae uncia dimidia prius in spiritu vini soluta, additur.

Virtus. Antiseptica, cardiaca, excitans.

Usus. Pestis, diathesis putrida.

Dosis. Interne cochleatim, externe suffitus, lotiones.

Nota. Aceta simplicia, a medicis et ab usu recepto pendentia, ex tempore parentur. Hoc est: uni parti vegetabilis infunditur circiter octuplum boni aceti.

ACETUM SATURNI, EXTRACTUM SATURNI.

Rp. Cerussae in laminis, vel minii triti partem unam.

Aceti vini boni partes quatuor.

Coquantur in lebete leni igne, ad dimidia partis consumptionem, bacillo saepius agitando; Liquor frigefactus, filtratus servetur.

Si liquor in lebete ad siccitatem evaporatur, *extractum saturni siccum* dicitur. Dum vero calx plumbi aceto destillato solvitur, et ad cristallisationis punctum evaporatur, *saccharum saturni* appellatur.

Virtus et Usus. Vide aquam vegetomineralem.

ACETUM SCILLITICUM.

Rp. Radicis scillae praeparatae partem unam.

Aceti vini partes sex Digerantur leni calore per tres dies, forti expressione coletur acetum, et dein filtretur.

Virtus. Incidens, attenuans, diuretica.

Usus. Asthma humidum, hydrops pectoris, affectus catarrhales suffocativi.

Dosis. Drachma una, ad unciam dimidiam.

Rarius per se praescribitur, oxymel inde paratum illi praefertur.

Nota. Acetis diutius servandis decima sexta pars spiritus vini rectificati additur. Sic paratur *acetum colchici*.

ACETUM VINI FRIGORE CONCENTRATUM.

Acetum vini intenso frigore, in vase terreo, aut potius ligneo aperto concreseat in glaciem; quo facto, perfracta aut pertusa glacie, reliquum fluidi a glacie separetur, et in vas vitreum effundatur.

Nota. Satis concentratum est acetum, quod tertiam sui ponderis partem alcali vegetabilis fixi ad saturationem exigit.

Virtus. Antiseptica, confortans, antiphlogistica, diaphoretica, leniter irritans, externe qua odoramentum.

Usus. Febres putridae, pestis, lipothymia, syncope, gangraena inflammatoria, carbunculus, erysipelas biliosum, melancholia, mania, haemorrhagiae, sugillationes, ulcera putrida.

Dosis. Interne, drachma una diluitur aquae libra una. Externe drachmae tres vel quatuor cum eadem aquae quantitate.

ACETUM VINI DESTILLATUM.

Rp. Aceti vini quantum placet, retortae vitreae, cum decima circiter parte pulveris carbonum, committe, et balneo arenae, sexta circiter pars, igne successive aucto eliciatur. Abjecto primum prodeunte phlegmate aethereo, quod seorsim servandum est, labor protrahatur, quamdiu clarus, nec empyreumaticus prodierit liquor, qui ante notam empyreumatis obtentus servetur.

Usus. Varii sunt labores pharmaceutici et chemici.

Nota. *Phlegma aethereum* usurpatur ad parandum *liquorem anodynum vegetabilem*.

ACIDUM ACETI CONCENTRATUM.

ALCOHOL ACETI.

ACIDUM ACETICUM.

Rp. Terrae foliatae tartari probe siccatae, et in subtilem pulverem redactae libram unam, tubulatae retortae immitte, et, per iteratas vices, affunde acidi vitrioli concentrati libram unam aequali aquae quantitate caute diluendam, et ex balneo arenae quousque residuum fere siccum apparuerit, destilletur. Acetum elicited cum pulvere carbonum, dimidio sui ponderis mixtum rectificetur, et tum illi tertia, sive quarta pars liquoris anodyni vegetabilis admisceatur.

Nota 1. Acetum aliquid sulphurosi, in prima destillatione, in se recepisce monstrat eius

turbatio, dum aceto pauxillum concentratae solutionis in acido aceti terrae ponderosae iungitur. Tunc illi, antequam supra pulverem carbonum destillatio suscipietur, dicta solutio guttatim eo usque instilletur, donec nulla turbatio fiet.

Nota 2. Sal primae destillationis residuus aqua solutus, filtratus crystallisetur, crystalli exortae probe siccatae, in subtilem pulverem contritae ad parandum acetum glaciale sub titulo *tartari vitriolati acidi* servantur.

ACIDUM ACETI CONCENTRATISSIMUM.

ACETUM GLACIALE.

Rp. Terrae foliatae tartari partes tres,
Tartari vitriolati acidi partes octo.

Seorsim probe siccentur, et subtiliter pulverisentur in mortario lapideo, exacte inter se terantur, immittantur retortae, et leni igne destillentur ita, ut materies non colliquescat in unam massam. Quam primum guttulae lentissime stillare incipient, recipitur obtentum acetum, et rectificetur ea siccissimi pulveris carbonum quantitate, ut acetum ab hoc pulvere in retorta totum absorbeatur.

Nota. Hocce acetum frigore aut sola frigidiuscula temperatura, in glaciale seu camphorae similem massam crystallisatur.

Virtus. omnium acetorum est princeps.

ACIDUM MURIATICUM CONCENTRATUM,

ACIDUM SALIS, SPIRITUS SALIS FUMANS.

Rp. Salis communis decrepitati libras duas; immissis retortae vitreae successive instilles Acidi vitrioli concentrati libram unam aequali portione aquae fluvialis caute diluendam. Quo facto, ex balneo arenae destilletur primo leni, gradatim validiori igne eo usque, donec nulli amplius ex retorta vapores prodeant. Residuum post destillationem est *sal mirabile Glauberi*, seu *soda vitriolata*, seu *sulphas sodae*.

Virtus. Antiseptica, refrigerans.

Usus. Dysuria, ischuria renalis, fauces gangraenosae, sphacelus.

Dosis. Interne, aliquot guttulae cum aqua ad gratam aciditatem. Externe cum melle rosarum linctus.

ACIDUM NITRI CONCENTRATUM,

SPIRITUS NITRI FUMANS,

ACIDUM NITRICUM.

Rp. Nitri depurati uncias triginta; retortae vitreae immissis per vices, retortam agitando saepius, et caute evitando vapores, affunde:

Acidi vitrioli concentrati uncias quindecim, destilletur igne arenae sensim aucto; Spiritus hac ratione obtentus, satis cito vitro probe clauso asservetur.

Acidum nitri dum partes acidi vitrioli in se continet, optime depuratur hoc modo: instillatur solutio terrae ponderosae nitratae, quousque non amplius illud turbetur, quo facto, destillatio repetitur. Ab acido vero salis pari modo liberatur instillatione solutionis argenti, et destillatione.

Virtus caustica, corrodens.

Usus. Praeparata.

ACIDUM NITRI TENUE seu DILUTUM,
SPIRITUS NITRI, AQUA FORTIS.

Rp. Nitri depurati.

Vitrioli viridis calcinati partes aequales, in pulverem redactae, probe misceantur, et destillentur ex retorta terrea, seu vitrea loricata in excipulum, cui prius aquae dimidia pars ad receptum nitrum infunditur.

Nunquam interne ob vim suam causticam, sed ad alia paranda medicamenta adhibetur.

ACIDUM PHOSPHORI,
ACIDUM PHOSPHORICUM.

Rp. - Ossium ad albedinem calcinatorum, et subtilissime pulverisatorum partes quatuor; in cucurbita vitrea, cum acidi vitrioli concentrati partibus tribus, antea dupla aquae portione diluti probe misceantur; elapsis aliquot momentis, pauxillum aquae iterum affundatur, ut mistio tenuem pultaceam massam consequatur, et spatio viginti quatuor horarum, saepius agitando, digeratur. Deîn

haec massa ope sacci linteï exprimitur, residuum gypsum iterum aqua eluitur; Et hi omnes liquores filtrati eo usque evaporantur, donec vel minima eorum pars dentibus applicata stuporem illis inducat. Post refrigerationem hic liquor filtretur; quo facto, spiritu salis ammoniaci volatilis aliquantulum supersaturetur, a calce ad fundum praecipitata separatus ad siccitatem evaporetur. Post haec crucibulum hoc sale ad tertiam solum partem repletum igne successive protracto liquetur, quousque sal prorsus candeat. Denique in laminam effusus, post refrigerationem in partes diffractus in vitro bene clauso servetur.

Virtus. Analeptica, sudorifera, antispasmodica.

Usus. Epilepsia, mania, melancholia, caries ossium.

Dosis. Grana duo in aethere, seu oleo unguinoso solvuntur. Externe pars una cum septem partibus aquae diluitur.

ACIDUM TARTARI CRYSTALLISATUM,
SAL ESSENTIALE TARTARI,
ACIDUM TARTAROSUM CRYSTALLISATUM.

Rp. Tartari crudi libras quindecim,
Cretae libras quatuor;

Probe pulverisata in lebate stanneo cum aquae frigidae circiter centum libris per vices commisceantur; finita effervescentia, coque hanc mistio-

nem, cui inter ebullitionem affundas solutionem calcis salitae tam diu, quousque nulla ulterius praecipitatio excitetur; omni peracta subsidentia, liquor badius salem digestivum continens decantetur, residuus tartari selenites aqua probe edulcoretur, et huic dein octo olei vitrioli concentrati librae aequali aquae portione diluendae, addantur in vitro. Mixtio per aliquod temporis spatium agitur. Dein iterum aqua diluitur, per quadraginta octo horas, flavus acidus liquor decantetur; Selenites aqua probe elixatus, et omnia liquida cum unciiis sex ad octo (sive quantum sufficit ad plenariam flavi coloris privationem,) subtilis pulveris carbonum permisceantur, in decollata cucurbita vitrea ope balnei arenae ad punctum fere crystallisationis evaporentur, et fervida per filtrum colentur. Post refrigerationem liquor a selenite per linteum separatur, et lenissimo calore crystallisetur.

Nota. Priusquam acidus liquor cum pulvere carbonum miscetur, et evaporationi exponitur, pauxillo huius adduntur aliquot guttulae aceti saturni, quod ostendit albidum sedimentum, et quum ille aliquot guttularum affusione acidi nitrici limpidus fit, tunc acidum est purum, e contrario est inquinatus acido Sulphurico. In ultimo casu denuo illi addatur debita copia tartari selenitis.

Virtus. Antiseptica, incidens, aperiens, antacalina.

Usus. Febres acutae, putridae, biliosae.

Dosis. A granis decem, ad triginta cum aqua.

ACIDUM VITRIOLI CONCENTRATUM DE-
PURATUM, ACIDUM SULPHURICUM.

Rp. Acidi vitrioli concentrati uncias novem;

In retorta vitrea uncias octodecim continente destilletur igne successive aucto, usque dum non ulterius in vaporum forma, sed in striis cohaerentibus in vas recipiens, defluere incipiat. Tunc mutato recipiente, destillatio continuetur, et tandem talis ignis gradus adhibeatur, ut reliquum acidum ascendere possit, quod in vitris probe clausis usui asservetur.

Usus. Summum hoc causticum acidum variis aliis remediis parandis, et laboribus pharmaceuticis et chirurgicis inservit.

ACIDUM VITRIOLI DILUTUM,
SPIRITUS VITRIOLI,
ACIDUM SULPHURICUM DILUTUM.

Rp. Acidi vitrioli concentrati partem unam, cum aquae destillatae partibus octo caute et gradatim misceantur.

Virtus. Antiseptica, adstringens, refrigerans.

Usus. Morbi putridi, ut febres sic dictae caestrenses, dysentericae, petechiales, aliae exanthematicae, et ipsa pestis, febres biliosae, putridae, scabies, angina inflammatoria gangraenosa, aphthae, ulcera putrida.

Dosis. A guttis triginta usque ad integras drachmas, vel in mixturis, vel cum syrupo quodam.

AERUGO CRYSTALLISATA,
ACETAS CUPRI.

Rp. Viridis aeris pulverisati q. l.

Dissolve in sufficiente quantitate aceti destillati, solutionem filtratam ad cuticulam evaporet, et, ut crystalli surgant, reponatur.

Virtus. Mundificans, exsiccans.

Usus externus isque prudens sub forma unguenti.

AETHIOPS MARTIALIS,
OXIDUM FERRI NIGRUM.

Rp. Vitrioli ferri puri in sufficiente quantitate aquae destillatae soluti quantum lubet. Solutio cinerum clavellatorum depuratorum instilletur, quousque nulla praecipitatio amplius appareat. Haec calx ferri eluta et siccata redigatur cum oleo lini in massam spissam, quae leni igne ad perfectam olei consumptionem calcinata, vitro probe clauso, servetur.

Virtus et Usus. Vid. Ferrum. Part. I.

Dosis. A granis quinque ad decem, quindecim supraque.

AETHIOPS MINERALIS,
SULPHURETUM HYDRARGYRI.

Rp. Florum sulphuris partes duas. Terantur in mortario lapideo, instillando pedetentim mercurii vivi partes quatuor, quousque globuli mercurii in totum disparuerint.

Virtus. Resolvens, mundificans, anthelmintica.

Usus. Tumores glandularum colli, exulcerationes antiquae fistulosae, scabies sicca, febris quartana cum vermibus.

Dosis. Ad scrupulum dimidium.

AETHIOPS ANTIMONIALIS,
SULPHURETUM HYDRARGYRI STIBIATUM.

Rp. Antimonii crudi pulverisati.

Mercurii vivi ana partes aequales,
misce in mortario vitreo eo usque,
donec in totum mercurius disparuerit.

Virtus. Anthelmintica, resolvens.

Usus. Vermes, obstructio glandularum, scabies venerea, vitia oculorum.

Dosis. Infantibus a grano uno ad quinque;
Adultis ad scrupulum.

ALCALI CAUSTICUM,
CAUTERIUM POTENTIALE,
LAPIS CAUSTICUS,
POTASSA PURA seu CAUSTICA.

Rp. Lixivii caustici quantum lubet,

In vase ferreo tam diu evaporetur, donec guttula lapidi frigido instillata indurescat. Tunc sal crucibulo immittatur, et ignis ei admoveatur, usque dum olei forma fluat, quod subito effundatur in canalem ferreum calefactum et oleo olivarum illitum, qui pennae anserinae magnitudinem habet; tandem in

frustula idonea secatur, et in vitro probe clauso servetur.

Virtus Corrodens, vesicans.

Usus. Externe callosi margines ulcerum, hypersarcosis, vulnera in rabie canina, et morsu viperarum.

ALCALI MINERALE, CARBONAS SODAE.

Rp. Salis communis libras viginti.

Solve in aquae fluviatilis libris sexaginta, solutioni adde cinerum clavellatorum et sicce contritorum libras viginti quinque. Hoc fluidum evaporetur, quousque salina pellicula exoriens aliquoties subsidat, et de novo efformetur. Tunc lebate ab igne dimoto, quum refrigerare incipit, per flanelam coletur. Elapso unius horae spatio, liquor ab excusso, hoc tempore, sale digestivo, in aliud vasculum decantetur, in quo alcali minerale, loco frigido, crystallisetur, et haec crystallorum genesis, additis huius salis siccis crystallis acceleratur. Hic alcalinus sal repetita solutione, filtratione et crystallisatione perfecte purus evadit.

Virtus et Usus sunt, ut cinerum clavellatorum depuratorum.

ALCOHOL VINI, SPIRITUS VINI RECTIFICATISSIMUS.

Rp. Spiritus vini depurati q. l.; destillationi iterum subiiciatur, et exinde tertia solum pars eius eliciatur.

ALCOHOL VINI ALCOHOLISATUM,
SPIRITUS VINI DEPHLEGMATISSIMUS.

Rp. Alcoholis vini q. l. sub diligenti succusione, tam diu siccam depuratam potassam admisceas, et inde provenientem aqueam salis solutionem ope separatorii saepius auferas, quousque ultimae potassae particulae, nec deliquescant, nec inter se congruescant. Dein retorta superimpletur potassa probe siccata, cribro trajecta, depurata, cui affunditur supradicti aqua privati alcoholis tantum, quantum ab illa perfecte resorberi potest. Retorta balneo arenae committitur adaptato recipiente cum vesica, et post viginti quatuor horas, lenissimo semper aequali continuato igne destilletur. Quamprimum guttulae lentius stillent, tunc destillatus et perfecte aqua privatus alcohol recipitur et servetur.

Virtus longe praestantior spiritus vini rectificati.

Nota 1. Supra hoc in retorta residuo sale, expulsis sat valido igne remanentibus phlegmaticis partibus, nova portio alcoholis saepius extrahi potest, donec sal in massam duriusculam non compingatur.

Nota 2. Quod alcohol alcoholisatum hac methodo elicatum sit perfectissime aqua privatum, docet eius specifica gravitas, quae in temperatura $+ 15$ Reaumur grad. non plus $= 791$ ad 1000 aquae.

ALUMEN USTUM.

Rp. Aluminis crudi q. l.

Calcinetur in vase fictili, crusta non obducto, vel ferreo, donec omne humidum expulsum fuerit, et massa spongiosa sicca friabilisque evaserit.

Virtus. Exsiccans, adstringens, leniter caustica.

Usus. Externe, ulcera fungosa sordida.

ANTIMONIUM CRUDUM PRAEPARATUM.

Rp. Antimonii selecti q. l. in mortario lapideo contundatur, et per sindonem traiciatur; pulvis traiectus denuo teratur donec omnes, vel plurimae saltem particulae micantes disparuerint, dein servetur.

Virtus et Usus. Vid. P. I. Antimonium.

AQUA AERIS FIXI.

Aqua fluviatilis saturetur aëre fixo ex solutione cretae, aut melius spati calcarei in acido vitrioli tenui prodeunte, aut alia simili. Idem fieri potest ex fermentantibus liquoribus.

Cui si additur ferrum, dicitur *aqua aëris fixi martialis*.

Virtus antiseptica.

Usus externus. Ulcera putrida, gangraena.

AQUA CALCIS VIVAE.

Rp. Calcis vivae recentis libram unam.

Cui gradatim affundas aquae calidae libras quindécim, post extinctionem, et calcis sub-

sidentiam, liquor per chartam colatus vitro munito servetur.

Paratur haec aqua etiam prout exigitur ex testis calcinatis.

Virtus abstergens, diuretica, resolvens, stimulans, acidum involvens, siccans.

Usus. Cachexia, chlorosis, exanthemata chronica, ulcera interna, caries et mollities ossium.

Dosis. Aliquot unciae cum lacte; externe iniectiones, fomenta.

AQUA COMMUNIS DESTILLATA.

Rp. Aquae communis libras viginti quatuor, destillentur lege artis ad quartae partis remanentiam, vel eousque, dum guttae decedentes aquam turbare incipiant.

Adhibetur ubicunque aqua purissima requiritur.

AQUA OPHTHALMICA CAERULEA.

Rp. Aquae calcis vivae libram unam.

Salis ammoniaci depurati drachmam unam.

Viridis aeris crystallisati pulverisati grana quinque, exacte misceantur et colentur.

Virtus discutiens, mundificans, abstergens, refrigerans, desiccans.

Usus. Ophthalmia serosa, serpigio, ulcera palpebrarum, corneae, sacci lacrymalis.

Dosis. Per diem aliquot guttulae oculis instillantur, vel lintea ea imbuta applicentur.

AQUA PHAGADAENICA.

Rp. Aquae calcis vivae libram unam,
Mercurii sublimati corrosivi scrup. duos
et grana quatuor.

Probe terendo solvatur et servetur.

Virtus externe mundificans, corrosiva.

Usus. Ulcera venerea.

AQUA PICEA.

Rp. Picis liquidae libras duas,
Aquae libras sex,
In vase ligneo mixta agita bacillo ligneo,
dein per duos dies subsidat pix; aqua
decantetur et per linteum coletur.

Virtus stimulans, resolvens, diaphoretica, diuretica.

Usus. Diathesis frigida.

Dosis.—Vasculatim.

AQUA VEGETOMINERALIS,

AQUA SATURNINA.

Rp. Aquae simplicis destillatae libras duas,
Extracti saturni unciam dimidiam,
Spiritus vini unciam unam.
Mixta servantur in vase vitreo.

Virtus temperans, refrigerans, discutiens, repellens, adstringens, exsiccans.

Usus. Externe. Inflammationes a causis externis ortae: contusiones, fracturae, luxationes, sugillationes, oculorum affectus, ophthalmia, fistula, ulcera, ambustiones, sphace-

lus. Sub forma cataplasomatis, vel lintea ea madida partibus affectis applicantur.

AQUAE DESTILLATAE VEGETABILIIUM SIMPLICES.

AQUA FRAGARIAE.

Rp. Baccarum recentium Fragariae partes quatuor, in mortario lapideo contusis affunde. Aquae communis partes decem, post duodecim horarum macerationem destillatione partes sex eliciantur.

Sic paratur *aqua rubi idaei*.

AQUA CHAEREFOLII.

Rp. Herbae chaerefolii recentis libras duas. Macerentur per viginti quatuor horas in aquae libris sedecim; Postea destillatione leni igne extrahantur librae octo. Pari modo parantur:
Aqua menthae crispae,
piperitidis,
sambuci florum.

AQUA CINAMOMI SINE VINO.

Rp. Corticis cinamomi contusi libram unam. Aquae communis libras duodecim. Per aliquot dies macerentur et destillatione eliciantur librae octo ad novem.

AQUA CINAMOMI CUM VINO.

Rp. Cinamomi acuti s. Florum cassiae unc. sex, Vini albi gallici libram unam, Aquae fluviatilis libras quinque.

Post viginti quatuor horarum macerationem
destillatione eliciatur pars dimidia.

Virtus et Usus. Vid. Cinamomum P. I.

Dosis. Ad aliquot drachmas.

AQUA ROSARUM.

Rp. Florum rosarum recentium libras decem,
Aquae communis libras quadraginta.
Destillantur exinde quindecim,
At ex floribus rosarum salitis duodecim li-
brae.

AXUNGIARUM DEPURATIO.

Cellulosa, quae adipem habet, in frusta dissecatur, et cum aqua tam diu conquassatur, usque dum aqua ipsi denuo affusa inde defluat prorsus limpida, leni deinde calore liquatur adeps, ut omnis ex cellulosa secedat et ipsi limpidus supernatet, eodem quoque calore aqua, quae ipsi sub priore labore adhaeserat, diffлатur; difflatam autem esse, una aut altera adipis gutta carbonibus iniecta ac sine strepitu deflagrans indicio est; Adeps depuratus adhuc fluidus ollae committitur.

BALSAMUM ARCAEI,

seu

UNGUENTUM ELEMI.

Rp. Resinae Elemi,
Terebinthinae ana uncias sex,
Sevi vervecini uncias octo,
Axungiae porci uncias quatuor.
Liquentur simul leni igne, tandem per pannum

traiciantur. Massa dein cum pistillo ligneo trituretur, et agitetur, donec refrigescat.

Virtus digestiva, emolliens, maturans.

Usus. Suppuratio ulcerum promovenda.

BALSAMUM OPHTHALMICUM RUBRUM.

Rp. Butyri recentis non saliti drachmas tres,
Cerae albae grana quadraginta quinque;
Cerae leni igne liquatae admisceatur butyrum, ut simul liquescant, in mortario lapideo exactissime permisceantur, et cum his mercurii praecipitati rubri in subtilissimum pulverem triti grana septemdecim intime conterantur.

Nota. Si huic massae addantur camphorae tritae grana quinque, Florum zinci grana octo inter se probe contrita, et cum illa optime mixta, fit Balsamum St. Yveanum.

Virtus corrodens, detergens, resolvens, roborans.

Usus. Ophthalmia serosa, venerea, maculae corneae, ulcuscula conjunctivae, incipiens suffusio.

Dosis. Granum dimidium ad integrum infricatur oculo bis de die.

BUTYRUM ANTIMONII seu STIBII, CAUSTICUM ANTIMONIALE, MURIAS OXYGENATUS STIBII.

Rp. Antimonii crudi calcinati uncias octo,
Salis communis libram unam.

Misceantur probe in mortario vitreo, et immittantur retortae tubulatae vitreae in arenae balneo positae, debito igne accenso, applicatur recipiens satis amplum, et probe lutata commissura, sensim, et minimis semper portionibus adde:

Acidi vitrioli concentrati libram dimidiam cum aquae unciiis quatuor diluti, et tunc igne gradatim aucto destilletur usque dum nihil amplius prodeat.

Virtus potens, caustica.

Usus. Externe, gangraena, caries, staphyloma, elevatio scleroticæ, proptosis iridis. Ope penicilli cautissime tangantur partes affectae.

CALX ANTIMONII SULPHURATA.

Rp. Testarum recenter ustarum Ostrearum drachmas decem,

Sulphuris drachmas quatuor,

Antimonii drachmas tres.

Probe mixta in pulverem prius subtilissimum redigantur, et in crucibulo bene lutato per horam igni exponantur, post fusionem mixtio habet colorem pallido-luteum, pondere drachmarum quindecim. Tunc statim in mortario vitreo pulverisetur, et in vitris drachmam solum unam capientibus probe obturatis ab aëre servetur.

Virtus aperiens, diuretica, sudorifera.

Usus. Arthritis inveterata, ulcera chronica, anchylosis, scabies, obstructions viscerum ex atonia, ex qua etiam haemorrhoides, morbi cutanei metastatici, asthma, tussis chronica ex pituita tenaci, scrophulae, rheumatismus

chronicus, reliquiae luis syphiliticae, vermes, fluxus aurium, gonorrhoea, fluor albus, haemorrhoides mucosae.

Dosis. Calcis huius drachma una cum aquae libris quinque in vase figulino probe vitreato atque tecto, ad remanentiam librarum quatuor coquatur, dein aqua pellucida sulphurea adhuc calida lagenis infundatur sine mora bene claudendis; Huius aquae per tres aut sex horas tantum ingeritur, ut quotidie libra dimidia, ad libras duas, tres, vel quatuor, habito semper respectu aetatis, constitutionis, vehementiae morbi, consumatur. In maxime sensilibus aliquod antispasmodicum; in debilibus vero infusum Quassiae exhibendum.

Externe, fomenta, balnea, e. g. Huius calcis uncia una, seu unciae duae cum aquae libris triginta, seu quadraginta coquantur, et postea sufficiente quantitate aquae diluantur.

CERATUM LABIALE.

Rp. Olei amygdalarum uncias octodecim,
Cerae albae libram unam,
Spermatidis ceti sescunciam,
Olei lavendulae, seu cuiuslibet expetiti drachmam dimidiam.

Fiat ceratum, Alkanna, ut roseus sit color, tingendum.

Virtus emolliens.

Usus. Fissurae labiorum, papillarum, narium, impetigo, ambustio.

CERATUM SATURNINUM.

Vid. *Unguentum saturninum*.

CEREI MEDICATI,

CANDELAE SATURNINAE.

Rp. Cerae flavae libram unam,

Liquetur leni igne, eique successive et sub continua agitatione instilletur,

Extracti saturni uncia dimidia.

Massa perfecte mixta ab igne removeatur, eique adhuc calenti et quasi ebullienti immergatur tela tenuis, quae post refractionem super marmore levigata et sapone fricata servetur.

Iidem cerei fiant cum duplo, triplo et quadruplo extracti saturni.

Usus. Externe, urethra a venereis affectibus angustata, medicamenta varia urethrae applicanda, fistulae vesicae, et urethrae carunculae, gonorrhoea suppressa.

CINERES CLAVELLATI DEPURATI,

ALCALI VEGETABILE,

CARBONAS POTASSAE.

Rp. Cinerum clavellatorum q. l. solve.

In aquae simplicis frigidae aequali quantitate.

Solutio reponatur per viginti quatuor horas, saepius agitando, dein filtretur, in vitro ferreo ad siccitatem evaporetur, et in vitro bene clauso servetur.

Virtus. Acidum involvens, destruens, abstergens; resolvens, arrodens, acris.

Usus. Acidum primarum viarum, humores pituitosi, venena mineralia, induratio glandularum, et testiculi, rhachitis, scabies, tumores lactei, achores.

Dosis. Drachmae tres in aquae destillatae libra una solvantur. Cuius solutionis guttae triginta ad centum cum aqua exhibeantur.

Externe fomentationes, e. g. Drachmae duae cinerum clavellatorum solvuntur cum libra aquae destillatae communis, qua solutione imbibuntur panniculi ex lana confecti, qui partibus affectis applicentur.

CONSERVA ACETOSAE.

Folia Acetosae recentia ope pistilli lignei in mortario lapideo comminuantur in pulpam tenerriam, cui duplum sacchari adiicitur, et tundendo simul misceatur exactissime. Loco frigido servetur in vitro.

sic parantur:

Conserva Acetosellae,

Cerefolii,

Cochleariae,

Hyssopi,

Melissae,

Menthae,

Nasturtii aquatici,

Rosarum rubrarum.

Hae conservae vires suorum vegetabilium retinent.

CUPRUM AMMONIACALE.

Rp. Vitrioli coerulei uncias duas,
Aquae communis bullientis uncias sex,
Spiritus salis ammoniaci aquosi quantum sufficit ut cuprum coëat, penitusque iterum solvatur in liquorem cyaneum, postea colatura evaporetur lenissimo igne ad siccitatem, dein pulverisetur et in vitro bene clauso asservetur.

Virtus. Adstringens, roborans, antispasmodica.

Usus. Spasmi, epilepsia, paralysis, convulsiones, malum hystericum, debilitas nervorum.

Dosis. A grano dimidio sensim ascendendo usque ad quatuor in forma pilulari.

Heroicum remedium prudentem medicum requirit.

DECOCTUM ALBUM.

Rp. Rasurae cornu cervi drachmas sex.
Gummi arabici drachmas duas,
Cum aquae communis libris tribus coquantur ad remanentiam librarum duarum.
Colatura pro lubitu edulcoretur.

Virtus demulcens, temperans.

Usus. Aestus, sitis febrilis, acrimonia, fluxus alvi.

Dosis. Vasculatim.

DECOCTUM HORDEI.

Rp. Hordei integri uncias sex,
Aquae communis libras decem,

Coquantur ad libras octo.

Colaturae si addantur oxymellis simplicis
unciae quatuor, Acidulatum dicitur.

Virtus temperans, demulcens.

Usus. Febres, haemorrhagiae, morbi biliosi,
in potus ordinarii vicem bibitur.

ELECTUARIUM ANTHELMINTICUM.

Rp. Pulveris radices Jalappae,
Valerianae,
Tartari vitriolati ana drachmam unam,
Oxymellis scillitici uncias tres, fiat Electua-
rium.

Dosis. A drachmis duabus, ad sex.

ELECTUARIUM LENITIVUM e SENNA.

Rp. Foliorum sennae unciam unam,
Radices rhei unciam dimidiam,
Seminum Anisi drachmas duas, seorsim pul-
verisatorum,
Pulpae tamarindorum,
Roob baccarum sambuci ana uncias quatuor,
Inter se probe misceantur.

Virtus. Laxans, stimulans.

Usus. Saburra primarum viarum.

Dosis. Ab uncia dimidia ad integram.

ELECTUARIUM THERIACA.

Rp. Radicis Serpentariae virginianae
Contrajervae ana uncias sex,
Angelicae
Valerianae

Calami aromatici

Gentianae rubrae

Zedoariae ana uncias quatuor,

Cardamomi decorticati

Myrrhae

Macis ana uncias duas,

Opium in vino hispanico soluti unc. duas et
drachmas tres,

Roob baccarum sambuci uncias octoginta,

Roob baccarum Juniperi uncias quadraginta,

Syrupi simplicis libras duas;

Omnes partes prius recens pulverisatae cum
succis ultimis probe misceantur.

Virtus irritans, carminativa, antiseptica, dia-
phoretica, alexipharmaca, sopiens, roborans.

Dosis. Ad drachmam dimidiam.

Drachma una continet opii granum unum.

ELAEOSACCHARA.

Scrupulo uni sacchari albissimi pulverisati in mor-
tario vitreo admisceatur olei destillati cuiusvis
expetiti guttula una.

ELIXIR ACIDUM.

Rp. Spiritus vini rectificatissimi unciam unam,

In vase vitreo capaciori loco frigido ne mi-
stio excalescat, instilla sensim et guttatim
acidi vitrioli concentrati unciam unam.

Et in vitro probe clauso servetur.

Virtus refrigerans, antiseptica, anodyna.

Usus. Febres biliosae, malignae, variolarum
putrida purpura, haemoptysis, menstruorum

et haemorrhoidum nimius fluxus, spasmi, convulsiones, epilepsia, arthritis, efflorescentiae aestivae, exanthemata chronica, scorbutus.

Dosis. Guttae decem ex multa aqua.

ELIXIR AURANTII COMPOSITUM.

Rp. Flavedinis corticum aurantium recentis unc. quatuor. In parva frustula concisae et in mortario lapideo in massam pultaceam reductae, affundantur.

Vini hispanici librae duae, per tres dies digerantur et fortiter per pannum exprimantur, in quo dissolyas digerendo:

Extracti absynthii,

Cardui benedicti,

Gentianae ana unciam unam,

Terrae foliatae tartari unc. dimidiam.

Virtus roborans, appetitum excitans.

Usus. Digestio mala, lienteria, diarrhoea a debilitate, flatus hypochondriorum.

Dosis. A guttis sexaginta ad centum.

EMPLASTRUM ANGLICANUM.

Rp. Ichthyocollae optimaе minutim incisae unciam unam,

Benzoes drachmam unam,

Spiritus vini uncias duodecim;

Immissa cucurbitae, coquantur usque dum omnia fuerint dissoluta, solutioque colata refrigerata consistentiam gelatinae induat; Postea leni calore liquata oblinatur penicilli

magni et mollis ope, serico tenso. Antequam prius fuerit exsiccatum, non inducatur alterum stratum, eademque sub cautela fiat stratorum iteratio, usque dum requisita crassities surrexerit.

Virtus adhaerens, combinans, consolidans.

Usus. Leviora recentia vulnera.

EMPLASTRUM CITRINUM.

Rp. Resinae flavae libram unam,
Cerae flavae uncias octo,
Sevi ovilli uncias quatuor,
Terebinthinae uncias duas.
Colliquatis, et colatis addatur,
Radici curcumae pulverisatae uncia dimidia.

Virtus emolliens, digerens, maturans.

Usus. Ulcera maturanda.

EMPLASTRUM CICUTAE CUM AMMONIACO.

Rp. Cerae flavae libras duas,
Olei olivarum libram unam. Colliquatis, colatis admisceas
Extracti cicutae uncias sex,
Gummi ammoniaci,
Herbae cicutae pulveratae ana uncias octo;
Fiat Emplastrum.

Virtus resolvens, discutiens, aperiens, emolliens.

Usus. Scirrhus, carcinoma, tumores duri.

Nota. Longe efficacior usus externus ipsius plantae sub forma fomentationum.

EMPLASTRUM GUMMOSUM,
DIACHYLON COMPOSITUM.

Rp. Emplastri communis libras duas, leni igne
liquatis sub perpetua agitatione adde
Gummi ammoniaci,
Galbani pulverisati,
Terebinthinae ana uncias duas,
Separatim antea liquefactas; mixtis probe
inter se, fiat emplastrum.

Virtus maturans, digerens, emolliens.

Usus. Abscessus fientes et ruptorum aliqua
durities, glandularum tumores.

EMPLASTRUM LYTHARGYRII
COMMUNE, DIACHYLON SIMPLEX.

Rp. Olei olivarum libras sex,
Lithargyrii pulverati libras tres,
Coque leni igne sub perpetua agitatione
sensim addendo pauxillum aceti ad perfe-
ctam emplastri consistentiam. Si ad sin-
gulas libras emplastri communis addas re-
sinae albae uncias duas, habebis *empla-
strum adhaesivum*.

Virtus discutiens, repellens, exsiccans.

Usus. Copiosus affluxus humorum in ulceri-
bus, ambusta ulcera inflammata.

EMPLASTRUM MELILOTI.

Rp. Resinae albae uncias viginti quatuor,
Sevi ovilli uncias sedecim,
Cerae flavae uncias duodecim,

Redigatur in emplastrum, quod in vesica oleo uncta servetur.

Virtus emolliens, resolvens.

Usus. Tumores frigidi, hypochondriorum durities, mammarum tumores lactei, dolores arthritici, rheumatici.

EMPLASTRUM VESICATORIUM, CANTHARIDUM.

Rp. Cerae flavae libram unam,
Terebinthinae uncias quatuor,
Liquatis adde
Cantharidum tritarum uncias quatuor,
Camphorae drachmas tres in olei olivarum
unciis duabus solutae. Fiant magdaleones.

Nota. Loco huius emplastri vesicatorii sumitur emplastrum citrinum, cui extenso in lintheo inspergatur pulvis cantharidum.

Virtus stimulans, rubefaciens, vesicans.

Usus. Languor virium, paralysis, apoplexia serosa, materia ad viscus nobile deposita, deliria febrium, ut phrenitidis, pleuritidis, praesertim si respiratio suppressa, et excretio per pulmones interrupta sit, lethargus, cephalalgia a causa pituitosa, hemicrania, angina, ophthalmiae serosae, otalgia et odontalgia a causa pituitosa, eruptio exanthematum stimulo indigens, retrogressa scabies, arthritis, podagra, rheumatismus, vulnera canis rabidi,

loca serpiginosa, et variae spasmodum species.

Dosis. Uncia una emplastri extensa supra corium diversis locis, antea bene linteo frictis applicetur ut plurimum per duodecim horas.

EMULSIO AMYGDALARUM.

Rp. Amygdalarum dulcium unciam unam,
In mortario lapideo contusis paulatim
affunde

Aquae communis libram unam,
Sacchari albi unciam dimidiam.

Virtus humectans, demulcens, nutriens.

Usus. Morbi febriles.

Dosis. Cochleatim.

EMULSIO PURGANS.

Rp. Resinae jalappae grana octo,
Vitelli ovi,
Sacchari ana drachmas duas,
Aquae unciam dimidiam,
Resina cum saccharo et vitellis probe conteratur et ope aquae fiat emulsum.
Haec quantitas propinatur adulto.

EXTRACTA PER COCTIONEM PARATA.

EXTRACTUM ABSYNTHII.

Rp. Herbae siccatae absynthii vulgaris q. l.

Cum aquae simplicis sufficiente quantitate coque ad perfectam virium eius extractionem. Decoctum filtretur, et leni igne,

usque dum mellis spissioris consistentiam acquirat, perpetuo spatula lignea agitatum, in extractum evaporetur.

Plantae siccae ad hunc scopum requirunt sex partes aquae ad unam plantae. At recentes duas ad tres. Cortices vero, ligna et radices duriores maiorem copiam aquae postulant.

Pari modo parantur:

Extractum cardui benedicti

dosis a 10 ad 20 grana.

Centaurei minoris

dosis prioris.

Chinae corticis

dosis a gran. 10 ad 30.

Gentianae rubrae

dosis prioris.

Hippocastani corticis

dosis prioris.

Liquiritiae, sive succus,

dosis a 30 ad 60 grana.

Nucum juglandum

dosis a 6 ad 10 grana.

Quassiae,

Taraxaci,

dosis a 10 ad 20 grana.

Turionum pini

dosis prioris.

Haec extracta vires ususque vegetabilium ex quibus elicitae sunt, habent.

EXTRACTA e SUCCIS VEGETABILIVM
RECENTIBUS LENI IGNE INSPISSATA.
EXTRACTUM ACONITI.

Rp. Herbae aconiti recentis ante florum eruptionem collectae q. l.

Contunde in mortario ferreo, seu lapideo cum tantillo aquae, succus exprimatur, et statim ad formam extracti leni igne redigatur.

Virtutem, Usum, Dosinque vide P. I. Aconitum.

Hoc modo fiunt:

Extracta Conii maculati,

Cicutae,

Daturae seu stramonii,

Flammulae jovis,

Hyosciami,

Lactucae virosae,

Pulsatillae nigricantis,

Singulorum horum extractorum virtus, usus, dosisque vid. P. I.

EXTRACTUM MARTIS CUM SUCCO POMORUM.

Rp. Limaturae martis libram unam,

Succi expressi pomorum libras quatuor.

Loco calido per octo dies digesta coque leni igne ad dimidiam partem, et liquor post subsidentiam clarus, effusus caute ad consistentiam mellis evaporetur.

Virtus tonica, aperiens.

Usus. Chlorosis et mensium defectus, laxitas fibrarum et languidus humorum motus, febres intermittentes quartanae, infantes verminosi.

Dosis. A granis octo ad scrupulum in forma pilulari.

Nota. Aquae vinosae cinamomi partes sex cum parte una huius extracti *Tincturam martis pomatam* constituunt.

FLORES BENZOES,

ACIDUM BENZOICUM.

Rp. Benzoes pulveratae libram unam,
Alcali mineralis uncias tres; coque
In sufficiente quantitate aquae communis,
et repetatur coctio sine additione salis mineralis. Hi liquores filtrati et commisti ad libras quatuor evaporentur. Acidum sulphuricum dilutum ad saturationem instilletur. Praecipitatus Benzoes sal filtro separetur, probeedulcoretur, et lenissime siccetur.

Virtus nervina, stimulans, resolvens, diaphoretica.

Usus. Affectus pectoris pituitosi, asthma pituitosum, catarrhus suffocativus.

Dosis. A granis duobus ad sex, octo, decem, in emulsione seu ex ovo sorbili.

FLORES SALIS AMMONIACI MARTIALES,
SAL AMMONIACUM MARTIALE,
MURIAS FERRI AMMONIACALIS.

Rp. Limaturae ferri unciam unam, cui admisceas:
Acidi muriatici tantum, ut massa tenuis evadat. Quae massa commisceatur cum salis ammoniaci libra una, in cucurbita sublimetur, sublimatum conteratur cum remanente in cucurbita residuo, et iterata sublimatio instituat.

Virtus tonica, aperiens, diuretica.

Usus. Obstructiones viscerum ab atonia tubi intestinalis, rachitis infantum, cachexia, hydrops, obstructio menstruum a laxitate fibrarum, febres intermittentes.

Dosis. A granis tribus ad decem.

Dum una pars in quatuor partibus spiritus vini solvitur, huius solutionis guttae viginti ad triginta propinantur.

FLORES ZINCI,

OXYDUM ZINCI.

Zinci frustula ignito crucibulo capaci, alto et inclinato, repetitis vicibus injiciantur, ut inflammantur, flores albi leves sublimati eximantur gradatim, ne aëris accessum impendant. Exempti flores tandem per cribrum trajiciantur.

Virtus externe exsiccans, roborans, interne antispasmodica.

Usus. Ophthalmia serosa, affectiones convulsivae, ascarides.

Dosis. A quarta grani parte ad duo grana cum saccharo trita; externe in unguentis.

HEPAR ANTIMONII.

Rp. Antimonii crudi,

Nitri ana partes aequales,

Pulverisentur seorsim, inter se exacte misceantur, in crucibulum eadem injiciantur, fiat detonatio, qua finita relinquatur crucibulum tectum per pluscula minuta in igne. Tum eximatur, et frigescat. Invenietur in illo massa hepatica splendens dura tecta scoriiis magis cinereis dicta *Hepar stibii*.

Si hepar stibii aqua sufficiente elixetur, siccetur, dicitur *Crocus metallorum s. antimonii*.

Usus. Praeparata.

HEPAR SULPHURIS,

SULPHURETUM POTASSAE.

Rp. Cinerum clavellatorum depuratorum partem unam,

Sulphuris pulverati partes duas;

Mixta immitte crucibulo, et sufficiente ignis gradu fluant; Dein post refrigerationem statim in vitro probe clauso servetur.

Virtus incidens, penetrans, resolvens.

Usus. Venena deglutita: ut arsenicum, mercurius sublimatus corrosivus, aes viride, plumbum.

Dosis. Drachma una in aquae libra solvitur,

et cochleatim copiose omni quadrante horae sorbilletur, usque dum graviores arsenici effectus devictos conspiciamus.

INFUSUM RHEI AQUOSUM,
ANIMA RHEI.

Rp. Rhabarbari concisi electi uncias duas,
Cinerum clavellatorum depuratorum drachmam unam et dimidiam.
Aquaе ebullientis uncias octodecim, digere per duodecim horas, infusum cum expressione coletur.

Virtus resolvens, laxans.

Usus. Diarrhoea, dysenteria, obstructions viscerum, icterus.

Dosis. Drachmae sex supraque.

KERMES MINERALIS,
OXYDUM STIBII SULPHURATUM RUFUM.

Rp. Antimonii pulverisati partem unam,
Cinerum clavellatorum depuratorum partes quatuor.

Coque per quadrantem horae in vase ferreo cum aquae partibus sedecim.

Lixivium filtretur fervidum, ex quo refrigerante praecipitatus sponte pulvis castaninus edulcoretur, siccetur et servetur.

Virtus et Usus Sulphuris aurati antimonii.

Dosis. A grano uno ad duo.

LAPIS INFERNALIS,
CAUSTICUM LUNARE,
NITRAS ARGENTI FUSUS.

Rp. Argenti purissimi q. v.

Aquae fortis q. s. ad perfectam solutionem;
Balnei calore solutio in vase vitreo ad siccitatem evaporetur. Massa haec vasi argenteo sive porcellaneo indita successivo igne fundatur, et quam primum instar cerae placide fluxerit, effundatur in tubulos ferreos, vel modulos lapideos calefactos oleo prius inunctos.

Virtus caustica, rodens.

Usus. Hypersarcosis, caries cranii, costarum, naevi materni.

Si drachma dimidia huius lapidis in aquae simplicis destillatae unciis duabus solvitur, et haec solutio dein aquae unciis octo permiscetur, validum fit roborans in fistula lacrymali, si per puncta lacrymalia injicitur.

LAUDANUM LIQUIDUM,
TINCTURA OPII.

Rp. Opii thebaici unciam unam,
Croci orientalis unciam dimidiam,
Vini hispanici uncias novem;
Leni calore per tres dies digerantur. Tinctura colata servetur.

Virtus anodyna, hypnotica, antispasmodica.

Usus. Affectiones spasmodicae, sensibilitas praeternaturalis.

Dosis. A guttis tribus ad sex et ultra.

Nota. Huius liquidi drachma una continet
Opii grana circiter sex.

LINIMENTUM VOLATILE,
SAPO AMMONIACALIS.

Rp. Spiritus salis ammoniaci caustici unciam semis,
Olei olivarum uncias duas;
Misceantur exacte in vitro per succusionem,
donec perfecte coeant.

Virtus stimulans, resolvens.

Usus. Externe dolores rheumatici, colica flatulenta, tympanitis, angina, ictus serpentum, peripneumonia, pleuritis.

LIQUOR ANODYNUS MINERALIS,
SPIRITUS VITRIOLI DULCIS,
VINOSUS VITRIOLICUS.

Rp. Acidi vitrioli concentrati partem unam,
Spiritus vini rectificatissimi partes quatuor.
Leni calore destillentur ex balneo arenae circiter tres librae; si sulphurosi quidpiam in excipulum transierit, liquor, addito paulillo salis alcalini, de novo destilletur, et in vitro probe clauso servetur.

Nota. Via breviori paratur extemplo hic liquor, dum cum novem partibus spiritus vini rectificatissimi (alcohol vini s. quod melius alcoholisati) una pars naphthae vitrioli purissimae additur.

Virtus et Usus Naphthae vitrioli.

Dosis. A guttis decem ad viginti in saccharo seu mixturis.

LIQUOR ANODYNUS VEGETABILIS,
ACETUM DULCIFICATUM.

Rp. Primum prodeuntis in destillatione aceti, seorsim collecti aetherei phlegmatis, q. l. quod a superfluis aqueis partibus repetita rectificatione liberetur. Cui dein, sub continua succussione, admisceatur sicca depurata potassa, quousque non amplius lique scat, quo facto, iterum rectificetur. Cuius $\frac{3}{4}$ pars e retorta eliciatur.

Virtus, Usus et Dosis Liquoris anodyni mineralis, et Spiritus salis dulcis.

Hic liquor ad inducendam maiorem Alcoholi aceti suavitatem adhibetur.

LIQUOR TERRAE FOLIATAE TARTARI,
LIQUOR ACETATUS POTASSAE.

Rp. Terrae foliatae tartari partem unam, solve in partibus duabus aquae destillatae. Filtra.

Virtus et Usus Terrae foliatae tartari.

Dosis. A drachma una, ad tres in mixturis.

LIXIVIUM CAUSTICUM
SAPONARIORUM.

Rp. Calcis vivae uncias quatuor,
Immitte lebeti ferreo et successive instilla pauxillum aquae calidae ad extinctionem calcis. Tum adde.

Aquae fervidae uncias octodecim;
Cinerum clavellatorum depuratorum unc. tres;
agitetur spatula ferrea, lixivium refrigera-
tum filtretur. Residuum elixetur aquae fer-
vidae tanta copia, ut unciae octodecim li-
xivii obtineantur, quod in vitris parvis ser-
vetur.

Virtus summe rodens.

Usus. Paranda alia medicamenta, et labores
pharmaceutici; externe pauxillum hujus lixi-
vii multa aqua dilutum, nodos podagricos,
morsus viperæ et canis rabidi sanat.

MAGNESIA AERATA, MITIS,
CARBONAS MAGNESIÆ.

Rp. Salis amari libras duas; solve

In aquae simplicis fervidae libris quatuor
et calide filtretur: dein

Cinerum clavellatorum depuratorum libram
unam,

Aquae communis fervidae libras quatuor sol-
vantur et calide filtrentur.

Liquorem ultimum priori salis amari, du-
rante ebullitione, tam diu sub continua
agitatione instilles, usque dum non am-
plius turbetur. Porro haec mistio in vase
cupreo stanno bene obducto aliquoties
ebulliat, et ut refrigescat, reponatur. De-
nique praecipitata magnesia separetur,
perfecte edulcoretur, siccetur, servetur.

Virtus absorbens, leniter laxans, diuretica.

Usus. Acidum primarum viarum, haemorrhoides, hypochondriasis, hysteria, flatulentia, vomitus, viridis alvus infantum, inquietus infantum somnus a torminibus et dentitione gravi.

Dosis. Infantibus grana quinque, sive quod melius est, ad unciam syrupi quatuor scrupuli veniant, quod medicamentum per parva cochlearia saepius in die datur; adultis a granis decem ad triginta, sexaginta.

MAGNESIA PURA, USTA.

Rp. Magnesiae albae optime edulcoratae q. 1.

In crucibulo tecto, valido igne calcinetur per unam vel duas horas, dein magnesia refrigerata in vitris probe clausis servetur.

Virtus prioris magnesiae, sed longe eminentior.

Dosis. A granis tribus, ad quinque.

MEL ROSARUM.

Rp. Rosarum siccatarum uncias tres,

Aquae fervidae libras tres;

Spatio trium horarum macerentur, et filtratum liquorem coque cum mellis libris sex ad sufficientem spissitudinem.

Virtus detergens, incidens.

Usus. Ulcera oris; in forma gargarismatum, linctus.

MERCURIUS DULCIS, PANACEA MERCURIALIS,

MURIAS HYDRARGYRI DULCIS.

Rp. Mercurii sublimati corrosivi partes quatuor,
Vivi depurati partes tres;

In mortario vitreo cum pauxillo aquae conterantur, cucurbitae immittantur, et ex balneo arenae sublimentur, finita sublimatione, massa crystallina compacta a mercurio vivo superius adhaerente et a partibus levioribus et pulverulentis provide separetur, eximatur, pulverisetur, et aqua destillata tepida parca salis ammoniaci quantitate impraegnata perfecte edulcoretur, servetur.

Nôta. Si globuli mercurii vivi adhuc conspiciantur, auferantur spiritu nitri et dein edulcoretur.

Virtus resolvens, depurans, sialagoga, anthelmintica.

Usus. Lues venerea, obstructiones viscerum, scirrhi, scrophulae, vermes, hydrophobia.

Dosis. A grano uno ad tria scopo alterante.
Scopo autem laxante a tribus ad sex grana.

MERCURIUS PRAECIPITATUS ALBUS,

MURIAS HYDRARGYRI PRAECIPITATUS.

Rp. Mercurii vivi uncias quatuor.

Solve

In aquae fortis sufficiente quantitate ad perfectam saturationem.

Solutio sufficiente quantitate salis communis in aqua dissoluti praecipitetur.

Liquor mox decantetur, et mercurius praecipitatus aqua calida perfecte edulcoratus servetur.

Virtus mundificans, antisiphylitica, corrosiva.

Usus Externus. Ulcera venerea, affectus oculorum venerei, scabies, exanthemata serpigiosa, sub forma unguenti exhibetur.

MERCURIUS PRAECIPITATUS RUBER,
CORROSIVUS RUBER,
OXYDUM HYDRARGYRI RUBRUM.

Rp. Mercurii vivi depurati uncias quatuor;

Solve

In sufficiente quantitate aquae fortis;

In cucurbita vitrea ex balneo arenae usque ad siccitatem evaporetur.

Massa exenta in crucibulo, debito ignis gradu, sub continua baculi vitrei agitatione tam diu calcinetur, usque dum colorem pulcherrime rubrum et splendentem induerit.

Virtus leniter corrosiva.

Usus. Externe, Ulcera callosa, fungosa, ophthalmia venerea, macula corneae; Sub forma unguenti.

MERCURIUS SOLUBILIS,
MERCURIUS PRAECIPITATUS NIGER,
OXYDUM HYDRARGYRI NIGRUM.

Rp. Mercurii vivi depurati quantum lubet.

Solve

Lente successiveque in sufficiente quantitate aquae fortis purissimae. Ponatur phiala, in qua solutio perficienda est, in vas amplum aqua fluviali frigida repletum, et processus peragatur semper loco frigidiori.

Mercurio soluto, crystallisque aqua destillata frigida ablutis, iisque dein solutis, et filtratis, adde guttatim saepius agitando

Spiritus salis ammoniaci caustici ad mercurium penitus ex acido praecipitandum;

Pulvis dein aqua ferventi repetitis vicibus lavetur, et sine omni calore exsiccetur.

Virtus mercurii dulcis, sed tardius salivam produciens.

Usus. Phimosis, ulcera genitalium canerosa, fluor albus, bubones, testes tumentes atque indurati, aliaque mala ex causa venerea orta.

Dosis. Interne granum dimidium ad integrum primo die; quotidie granum medium augeatur, ut sensim grana quinque propinentur.

MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS,
CORROSIVUS ALBUS,

MURIAS HYDRARGYRI CORROSIVUS.

Rp. Mercurii vivi depurati partem unam,
Acidi sulphurici concentrati partes duas; solvantur, ebulliant ad siccitatem;
Dein terantur et misceantur cum aequali quantitate salis culinaris probe siccati et

pulverati. Inmittantur in cucurbitam vitream, et ex balneo arenae fiat sublimatio.

Virtus antisyphilitica, validissime resolvens.

Usus. Morbi venerei.

Dosis. Grana sex solve in aquae destillatae libra una, mane et vesperi cochlear unum propinetur.

MERCURIUS VIVUS DEPURATUS,
ARGENTUM VIVUM,
HYDRARGYRUM.

Rp. Mercurii vivi q. v.

Immitte retortae vitreae in balneo arenae positae, excipulo aqua repleto simul imposito, ignem quantum potes lenem administra, attamen sufficientem, ut mercurius in excipulum transcendat, finita operatione, ab aqua separatus usui servetur.

Virtus, Ususque. Vid. P. I. Mercurius.

MIXTURA ANTEMETICA,
HAUSTUM SALINUM ANTEMETICUM.

Rp. Cinerum clavellatorum depuratorum scrupulum unum,

Succi citri recentis cochlear unum.

Virtus antemetica, solvens, antiseptica.

Usus. Phthisis pituitosa, vomitus febrilis.

Tempore effervescentiae propinetur.

NAPHTHA ACETI,
AETHER ACETICUS.

Rp. Spiritus vini rectificatissimi,
Aceti radicalis ana partes aequales;
Mixta digere; et dein ex retorta, leni igne
ad dimidium destilla. Liquori abstracto
admisce
Cinerum clavellatorum depuratorum partem
decimam sextam, in quatuor partibus aquae
solutam, Naphtha supernatans asservetur.
Virtus, Usus Dosisque. Naphthae vitrioli.

NAPHTHA VITRIOLI,
AETHER VITRIOLI.

Rp. Acidi vitrioli concentrati depurati,
Spiritus vini rectificatissimi partes aequales,
caute mixta destillantur in retorta vitrea
tubulata balneo arenae quousque nihil
sulphurosi odoris ascenderit.
Residuo iterum adde
Spiritus vini rectificatissimi partem dimidiam,
et destillantur pristino modo. Hic labor
duabus vicibus repetatur. His repetitis
solutionibus in excipulo obtentus aether
addito cinerum clavellatorum depuratorum
pauillo denuo in retorta vitrea leni igne
destilletur, dein separatus vitro probe clauso
servetur.

Virtus et Usus sequentis Naphthae.

NAPHTHA VITRIOLI PURISSIMA.

Rp. Naphthae vitrioli q. l. sub validis concussio-

nibus adde calcis salitae probe siccatae quantum sufficit, ut mistio in duos diversos liquores dividatur. Hoc tam diu cum Naphtha ope infundibuli a liquore inferiori semper separanda repetitur, quousque salita calx naphthae ultro addita perfecte sicca maneat. Dein retorta calce siccata salita superimpletur, et affunditur naphthae tantum, quantum ab interstitiis hujus salis plenarie suscipietur. Quo facto, retortae balneo arenae immissae lutatur recipiens amplissimum, quod elapsis viginti quatuor horis inter lenissimam destillationem, in frigida cum glacie sive nive aqua detineatur. Quam primum naphtha hoc semper aequali protracto lenissimo igne lentius stillare incipiet, tunc recipitur illa vitris munimento vitreo instructis, et loco frigido servetur.

Nota 1. In hac operatione calx salita eripit aetheri partes spirituosas.

Nota 2. Per succussionem aetheris cum calce salita obtenti inferiores liquores destillatione dant *Liquorem anodynum mineralem Hoffmanni* optimae notae.

Nota 3. Residua calx salita solutione, filtratione, et ad siccitatem inspissata, ad novas eiusmodi parandas operationes servetur.

Virtus antispasmodica, reficiens, anodyna, antiseptica, carminativa.

Usus. Affectus spasmodici, hysterici, soporosi,

paralytici, lentor humorum, febres nervosae, putridae, arthritis, rheumatismus, diarrhoea, dysenteria, labores parturientium, dolores a dentibus cariosis.

Dosis. A guttulis tribus ad sex supraque cum saccharo, aut mixturis.

NITRUM DEPURATUM,
NITRAS POTASSAE.

Rp. Nitri crudi q. l.
dissolve

In aquae fluviatilis fervidae q. s.

Filtratum evaporetur donec guttula inspersa frigido lapidi coaguletur, et reponatur in loco temperato ad crystallisandum; Residuus liquor denuo paululum evaporetur, et in crystallos redigatur. Hic labor eo usque repetatur, donec crystalli pulchrae surgunt.

Virtutem, Usum et Dosis, vid. P. I.

OLEA DESTILLATA, AETHEREA, VOLATILIA.

OLEUM ABSYNTHII DESTILLATUM.

Rp. Summitatum absynthii ante florum evolutionem collectarum modiceque siccatarum q. l.

Macerentur per triduum cum aquae communis sufficiente quantitate;

Destillantur postea e vesica ad tertiam partem repleta, oleum aquae innatans separetur, ipsa vero particulis adhuc olei im-

praegnata aqua novis destillationibus inservit.

Dosis. A guttula una, ad duas cum saccharo.

Nota. Eodem artificio alia quoque olea destillata parantur, ita tamen ut vegetabilia duriora, radices, ligna, et cortices huic usui destinata prius comminuantur, diutiusque macerentur, addito etiam sale muriatico.

Oleum Anisi,

Aurantiorum corticum,

Carvi seminum,

Caryophyllorum,

Chamomillae florum,

Cinamomi corticis,

Citri corticis,

Foeniculi seminum,

Juniperi baccarum,

Lavendulae florum,

Macis,

Melissae e herba,

Menthae crispae e herba,

Piperitidis,

Nucis moschatae,

Origani,

Rorismarini anthos,

Rutae e herba cum

summitatibus,

Sabinae e summitatibus,

Tanaceti florum,

Terebinthinae,

Valerianae e radicibus.

Oleorum destillatorum propinandi methodum
vid. *Elaeosacchara*.

OLEA EMPYREUMATICA,

OLEA DESTILLATA FOETIDA.

OLEUM ANIMALE DIPPELII.

OLEUM CORNU CERVI RECTIFICATUM.

Rp. Olei cornu cervi q. l.

Leni igne ex cucurbita vitrea, cum imposito alembico destillatur, et quod primum extillat oleum limpidum ab insequenti magis jam flavescenti, et ita secundum a tertio, mutato excipulo, separetur. Ad primam portionem limpidam perfecte rectificandam unica destillatio leni igne instituta sufficit: Posteriores vero portiones ut plurimum binas destillationes requirunt, in quibus itidem pars limpida, mutato excipulo, ab insequenti impuriori separetur, et tali modo labor continetur, usque dum omne oleum limpidum et album fluat. Postea in vasis exiguis vitreis epistomiis et ligatura probe munitis in arena inverso modo positis servetur.

Virtus resolvens, sudorem excitans, antispasmodica.

Usus. Convulsiones, passio hysterica, epilepsia, hydrophobia, cephalalgia, hemicrania, otalgia, odontalgia a pituita s. spasmo orta. Arthritis, podagra, rheumatismus absente ple-

thora et inflammatione, febres vehementes intermittentes, tophi, exostoses, tubercula post arthritidem, glandulae induratae.

Dosis. A guttulis quinque, decem, cum saccharo s. liquore anodyno. Externe inunctio.

OLEUM CORNU CERVI.

Rp. Cornu cervi frustulatum concisi q. l.

Immitte retortae cum amplo excipulo, ac igne reverberio gradatim aucto destilletur.

Sic prodibit *spiritus, sal et oleum.*

Oleum a spiritu separatum servetur.

Sal collectum repetita sublimatione cum dimidia carbonum parte ad albedinem rectificetur.

Spiritus repetita destillatione item cum quarta carbonum parte in balneo arenae rectificatus servetur.

Virtus insigniter stimulans, resolvens.

Usus externus. Ulcera frigida, nodi arthritici, glandulae induratae.

OLEA EXPRESSA,

FIXA.

OLEUM AMYGDALARUM.

Rp. Amygdalarum dulcium q. l.

Contusis et sacco forti linteo inclusis,

Sub praelo eliciatur oleum.

Sic quoque parantur:

Oleum seminum lini

Oleum ricini.

(Nota, dempto antea cortice qui urente acritate gaudet.)

Virtutem et Usum horum oleorum vid. P. I.

OLEUM TARTARI PER SOLUTIONEM,
LIQUAMEN SALIS TARTARI,
LIQUOR CARBONATIS POTASSAE.

Rp. Cinerum clavellatorum depuratorum partem unam,

Aquae destillatae partes tres. Solve, filtra.

Virtus et Usus cinerum clavellatorum.

Dosis. Drachma una cum syrupi cujusdam uncia dimidia miscetur et partitis praeberiis sumitur, in assumtis venenis drachma integra cum uncia una aquae, quavis horae quarta parte bibitur.

OXYMEL AERUGINIS,
UNGUENTUM AEGYPTIACUM.

Rp. Aeruginis pulveratae uncias quinque,

Aceti totidem,

Mellis uncias quatuordecim;

Leni igne sub continua spatulae agitatione redigatur in consistentiam mellis.

Virtus exsiccans, mundificans, leniter corrosiva,

Usus. Externe ulcera sordida, callosa.

OXYMEL SCILLITICUM.

Rp. Aceti scillitici partem unam,

Mellis partes duas;

Leni igne in vase figulino coque ad consi-

stentiam syrupi, dein calide colatum asservetur.

Virtus et Usus Aceti scillitici.

Dosis. A drachmis duabus, ad tres.

Hoc modo paratur:

Oxymel colchicum

Oxymel simplex,

Cujus est virtus antiseptica, refrigerans, diaphoretica, diuretica.

Usus. Morbi acuti.

Dosis. Uncia una ad duas in mixturis, et decoctis.

PASTA de ALTHAEA.

Rp. Radicum althaeae incisarum uncias quatuor,
Aquae communis libras octo;

coque leni igne ad consumptionem dimidii, colaturae adde

Gummi arabici contusi purissimi,

Sacchari canariensis ana libras duas cum dimidia; colatus liquor leni igne evaporetur ad extracti consistentiam, radícula lignea semper agitando, remove dein ab igne et sub perpetua agitatione admisce successive

Albumina ovorum recentium numero viginti cum aquae florum aurantiorum conquassata, lento igne sub perpetua agitatione inspissa, donec materies manibus non adhaereat: Dein effundatur in laminam, conspergatur amylo et siccetur.

Virtus emolliens, leniens, involvens, expectorans, incrassans, demulcens.

Usus. Tussis sicca, rauco, catarrhales affectiones, asthma.

PASTA GLYCYRRHIZAE.

Rp. Radicum glycyrrhizae decorticatarum uncias octo,

Aquae bullientis libras quatuor,

Infunde per duodecim horas, et in colatura solve

Gummi arabici,

Sacchari albissimi ana libras duas cum dimidia.

Colatura lenissimo igne evaporetur caute empyreuma vitando, donec gutta lapidi frigido instillata gelatinae instar concreseat, et detracta pellicula, in patellas oleo amygdalarum illitas, effundatur massa in hypocausto siccanda.

Virtus et Usus Pastae Althaeae.

PILULAE ALTERANTES.

Rp. Mercurii dulcis drachmas duas,

Sulphuris antimonii aurati drachmam unam,

Resinae guajaci,

Extracti gentianae ana drachmam unam et dimidiam;

Tere priores tres partes in pulverem tenuissimum, dein probe misce cum extracto gentianae, fiat massa pilularum.

Virtus resolvens, stimulans.

Usus. Obstructiones viscerum, indurationes glandularum, cutanei venerei morbi.

Dosis. A granis quatuor ad sex.

PULPA PRUNORUM.

Rp. Prunorum damascenorum q. l.

In sufficiente aquae fluviatilis quantitate coquantur, usque dum probe mollescant, per cribrum trajecta, ad mellis spissitudinem evaporentur. Tum cuilibet librae addantur sacchari unciae quatuor, et leni igne, usquedum consistentia electuarii surgat, coquantur.

Virtus et Usus. Vid. P. I.

Sic paratur

Pulpa Tamarindorum.

PULVIS ALTERANS.

Rp. Mercurii dulcis,

Sulphuris antimonii aurati ana unciam unam;
Terantur in mortario marmoreo tam diu usque dum pulvis subtilissimus fiat.

Virtus resolvens, antisiphylitica.

Usus. Obstructiones viscerum, scabies venerea, morbi venerei.

Dosis. A granis quatuor ad sex.

PULVIS CARBONUM.

Rp. Carbonum q. l.

Probe exurantur, quousque nullum amplius fumum edant, laminae ferreae exponantur, iisque extinctis, ab adhaerente iis ci-

nere ope follis liberentur et pulverisati in vitro servantur.

Virtus absorbens, antiseptica, detergens, anthelmintica.

Usus. Inveterata foetida ulcera, gangraena, vermes, dysenteria putrida; foetor oris.

Dosis. Interne drachma dimidia ad integram; externe inspersio, collutorium.

Nota. Ubi salia filtranda sint, optime illa hujus pulveris ope sacco immissi depurantur.

PULVIS DENTIFRICIUS.

Rp. Corticis peruviani uncias duas,

Radicis ireos Florentinae unciam unam,

Salis ammoniaci unciam dimidiam,

Catechu drachmas sex,

Myrrhae drachmas sex,

Misce, fiat pulvis, cujus unciae ad quamlibet praescriptionem addantur

Olei caryophyllorum guttae duodecim.

Virtus antiseptica, adstringens, roborans.

Usus. Externe, Mucus tartareus dentium, scorbutica gingivarum profluvia, dentes vacillantes, sub forma electuarii, gingivae et dentes mucore obducti fricentur.

PULVIS FUMALIS.

Rp. Mastichis,

Olibani,

Succini ana partes tres,

Styracis calamitae partes duas,

Benzoës,

Ladani ana partem unam,

Misce, fiat pulvis grossus,

Omissis olibano et succino, habetur *Pulvis
fumalis nobilis*, cui, si cum floribus exi-
gitur, adde

Florum lavendulae

Rosarum rubrarum ana partem unam.

PULVIS GALACTOPOEUS.

Rp. Magnesiae albae unciam unam,

Pulveris flavedinis corticum aurantiorum,

Seminis foeniculi ana drachmas duas,

Sacchari albi unciam dimidiam.

Misce, fiat pulvis.

Virtus antacida, roborans, absorbens.

Usus vid. *Magnesium*.

Dosis. Nutricibus ad aliquot cochlearia parva
de die datur.

PULVIS INFANTUM.

Rp. Magnesiae albae unciam unam,

Pulveris cinamomi drachmam unam,

Sacchari albi unciam dimidiam.

Virtutem et *Usum* vid. *Magnesium*.

Dosis. A granis sex ad quindecim ter qua-
terve de die.

PULVIS IPECACUANHAE CUM OPIO.

Rp. Tartari vitriolati drachmas tres,

Pulveris radices ipecacuanhae,

Opii puri ana scrupulum unum;

Terantur seorsim in pulverem subtilem, dein invicem exactissime permisceantur.

Hujus pulveris grana undecim continent in se granum unum opii.

Virtus incidens, aperiens, antispasmodica, diaphoretica.

Usus. Malum ischiaticum.

Dosis. A granis quinque ad undecim.

PULVIS MOSCHI COMPOSITUS.

Rp. Moschi optimi grana sedecim,

Pulveris radice valerianae sylvestris scrupulum unum,

Camphorae grana sex,

Misce, fiat pulvis.

Virtus penetrans, circulum sanguinis augens, irritans, resolvens, diaphoretica, nervina, antispasmodica, anodyna.

Usus. Morbi convulsivi, hysterici, epileptici, singultus, spasmi, tremor, subsultus tendinum, deliria, anxietas, tussis spasmodica, hydrophobia, mania, symptomata febrium malignarum.

Dosis. A granis decem ad viginti, infantibus a granis duobus ad sex.

PULVIS NITROSUS TEMPERANS.

Rp. Tartari vitriolati,

Nitri depurati ana partes aequales,

Misce, fiat pulvis.

Virtus refrigerans, resolvens, antispasmodica.

Usus. Orgasmus sanguinis.

Dosis. A scrupulo uno ad duos.

PULVIS OPHTHALMICUS.

Rp. Sacchari albi,

Boli Rubrae,

Cremoris tartari ana unciam dimidiam, misce,
fiat pulvis subtilissimus.

Usus. Pannus oculi, pellicula ex variolis superstes. Applicetur sine flatu parva portio hujus pulveris oculo.

RESINA JALAPPAE.

Rp. Radicis jalappae ponderosae q. l.

Contundatur in pulverem crassiusculum,
affunde

Spiritus vini rectificatissimi sufficientem quantitatem.

Digeratur leni calore per aliquot dies, postea coletur et fortiter exprimatur, extractio haec toties repetatur, donec ultimus spiritus superaffusus non amplius tingatur, omnibus dein extractionibus acquisitis, commistis et filtratis aqua affundatur, et spiritus vini destillationis ope inde evocetur, sic resinosa substantia jalappae fundo cucurbitae haerebit, quae aqua limpida aliquoties lavetur, et ex balneo mariae ad piceam consistentiam redigatur, ac denique in cylindros contortos efformata asservetur.

Vid. *Radice[m] jalappae* P. I.

Sic parantur:

Resina ligni guaiaci.

scammonii.

ROOB JUNIPERI.

Rp. Baccarum juniperi maturarum recentium con-
quassatarum libras octo.

Coque in sufficiente quantitate aquae simpli-
cis donec mollescant, tunc per setaceum
et modice exprimantur, succus inde elici-
tus cum sacchari albi libra una leni igne
ad mellis consistentiam redigatur.

Dosis. Ad uncias duas.

ROOB SAMBUCCI.

Rp. Succ[i] baccarum sambuci maturarum libras
sex,

Sacchari albi libram unam;

Leni igne sub continua agitatione ad justam
consistentiam redigatur.

Dosis. Ad unciam integram.

Hoc modo parantur:

Roob Berberum,

Oxycocci,

Ribium nigrarum,

rubrarum.

SAL AMMONIACUM DEPURATUM,

MURIAS AMMONIAE.

Rp. Salis ammoniaci crudi q. l.

Pulveretur in mortario lapideo, solvatur in

quinque partibus aquae simplicis ferventis, filtretur, et in vase vitreo ad cuticulam evaporetur, in loco frigido reponatur, et crystalli inde enatae, exsiccatae servantur. Cum residuo hicce labor eousque repetatur, donec nullae amplius crystalli surgant. Vid. P. I.

SAL MIRABILE GLAUBERI,
ALCALI MINERALE VITRIOLATUM,
SODA VITRIOLATA,
SULPHAS SODAE.

Rp. Residui post destillationem acidi salis communis q. l.

solve

In sufficiente quantitate aquae ferventis, peracta ope alcali mineralis saturatione, filtretur, evaporetur, et in loco frigido reponatur, ut crystalli enascantur, quae puriores redduntur repetita solutione.

Virtus et Usus Tartari vitriolati.

Dosis. Scopo resolvendi a drachma una ad tres; scopo vero laxandi ab uncia ad unciam unam et dimidiam.

SAL POLYCHRESTUS SEIGNETTI,
SODA TARTARISATA,
TARTRITIS SODAE.

Rp. Crystallorum tartari libras duas in sufficiente quantitate aquae solutas, in lebete stanno

probe obducto, tempore coctionis potassa saturentur, et dein adde-

Salis communis uncias quinque et drachmas duas;

Solutione frigefacta, et tartaro vitriolato deposito filtretur, ad crystallisationemque evaporetur. Prima et secunda crystallisatio largitur pulchras crystallos salis Seignetti, sed illae repetita solutione et crystallisatione denuo depurentur.

Nota 1. Loco salis communis, sal mirabile Glauberi etiam adhiberi potest; in hoc casu tres librae crystallorum tartari saturantur potassa, in lixivio solvantur salis mirabilis Glauberi librae duae et dimidia, et expulso tartaro vitriolato, ut artis est, crystallisetur.

Nota 2. In utroque casu residuum lixivium acido tartari parando inservit, quum illud decenter aqua diluitur, filtratur et solutio calcis salitae additur eousque, donec nihil ulterius excidat. Selenites tartari aqua edulcoratur, sufficiente acidi vitrioli quantitate decomponitur. Et resolutus acidus liquor ulterius ad artis regulas tractetur.

Virtus incidens, detergens, resolvens, diuretica.

Usus. Humores crassi, urina movenda, alvus lubrica reddenda, varii morbi.

Dosis. A drachma una ad tres, scopo vero laxandi ad unciam unam et dimidiam.

SAL VOLATILE SALIS AMMONIACI,
ALCALI VOLATILE SICCUM,
CARBONAS AMMONIAE.

Rp. Salis ammoniaci pulverati sicci libram unam,
Cretae purae pulveratae libras duas;
Mixa exacte, in retorta vitrea collo brevi
praedita sublimentur; Excipulum tamen
lintheis humidis saepius mutatis frigide ser-
vetur, et juncturae vesica madida optime
custodiantur. Sal, vasis refrigeratis, exi-
matur, inque vitris bene clausis, in loco
frigido asservetur.

Nota. Residuum cum aqua coquitur, filtratur,
ad siccitatem inspissatur, et ad parandum
Acidum tartari crystallisatum et *Naphtham*
depurandam sub titulo: *Calx salita* servetur.

Virtus penetrans, aperiens, stimulans, excitans,
resolvens, diuretica, sudorifera.

Usus. Nervorum debilitas, exanthemata re-
tropulsa, soporosa et apoplecticae affectio-
nes, sphacelus senum, asphyxia, deliquium
animi.

Dosis. Ab uno grano ad quatuor in forma
liquida. Externe qua odoramentum.

SAPO MEDICATUS.

Rp. Lixivium causticum ex alcali minerali para-
tum evaporatione ad eam concentrationem
perducendum, ut vitrum, quod unciam aquae
capit, ejusdem drachmas undecim recipiat.
Hoc lixivium cum partibus duabus olei oli-

varum purissimi in vase vitreo commisceatur, spatula lignea saepius agitando, quae mixtio spatio septem vel octo dierum accipiet albedinem et consistentiam saponis.

Virtus aperiens, resolvens, abstergens.

Usus. Obstructiones viscerum, acidum prae-dominans, rhachitis, scirrh.

Dosis. A granis sex ad decem in forma pilulari.

SAPO MERCURIALIS.

Rp. Saponis alicantini q. l.

Teratur cum aqua calida donec totus plenarie solvatur, cui paulatim affunde

Solutionem mercurii vivi acido nitri perfecte saturatam ad plenariam saponis decompositionem.

Tunc oleum cum mercurio junctum in forma massae caseosae innatans multa aqua eluatur, et prius ope lintei fortiter, dein leniter praelo exprimatur.

Virtus antisymphilitica, potissimum resolvens, discutiens.

Usus. Omnes affectiones venereae, ut bubones, ulcera phagadaenica, tumores.

Nota. Sapo hic prius in mortario vitreo teratur cum spiritu salis ammoniaci caustici eo usque, donec haec massa instar linimenti evaserit. Quod indicat, spiritus salis ammoniaci sufficientem quantitatem additam fuisse, dum parva huius massae portio cum aqua

exacte solvatur. Quo facto, fricentur tumores venerei, et quidem hoc modo: Dum bubo in inguine sit, pars interna femoris, quando glandulae subaxillares affectae sint, brachium fricetur, et sic de caeteris locis. Interne a granis tribus ad quinque, ulteriori tamen experientiae res, adhuc committitur.

SPECIES EMOLLIENTES.

Rp. Herbae malvae,

Verbasci cum floribus ana partes duas,
Seminis lini contusi partes quatuor,
Incisis contusis fiant species.

vel:

Rp. Herbae althaeae,

Verbasci cum floribus ana partes duas,
Seminis lini contusi partes quatuor,
ut prius.

SPECIES PECTORALES.

Rp. Herbae tussilaginis

Hyssopi ana partes sex,
Radicis althaeae partes duas,
concisis contusis fiant species.

vel:

Rp. Herbae veronicae

Hederae terrestris
Tussilaginis ana partes sex,
Radicis liquiritiae,
Stipitum dulcamarae ana partes duas,
ut prius.

SPECIES PRO DECOCTO cum LIGNO GUAIACI.

Rp. Rasurae ligni guaiaci,
Radice Bardanae ana partes sex,
Caricis arenariae
Saponariae partes tres,
Liquiritiae partes duas,
Concisis, contusis, fiant species.

vel:

cum LIGNO SASSAFRAS.

Rp. Radicis bardanae partes sex,
Ligni sassafras,
Stipitum dulcamarae ana partes duas,
Radice liquiritiae partem unam,
fiant ut prius species.

vel:

cum LIGNO JUNIPERI.

Rp. Radicis bardanae,
Ligni juniperi ana partes sex,
Radice graminis,
Baccarum juniperi ana partes tres,
Radice liquiritiae partes duas,
misce, fiant species.

SPECIES PRO INFUSO THEAEFORMI.

Rp. Florum chamomillae vulgaris,
Herbae veronicae ana partes sex,
Foliorum salviae partes duas,
misce, fiant species.

SPECIES RESOLVENTES.

Rp. Herbae absinthii,
Menthae crispae,

Herbae Rutae ana partes sex,
Florum sambuci partes duas,
misce, fiant species.

vel:

Rp. Herbae Abrotani
Absynthii ana partes quatuor,
Tanaceti,
Serpilli ana partes duas,
ut prius.

In quibus speciebus requiritur radix liquiritiae separatim praescribatur, et sub fine coctionis illis addatur.

SPIRITUS AURANTIORUM CORTICIS.

Rp. Aurantium corticum partem unam,
Spiritus vini gallici partes quinque,
E cucurbita vitrea leni igne destillantur librae quinque.

Virtus carminativa, stomachica, calefaciens.

Dosis. A guttulis quadraginta ad centum.

SPIRITUS COCHLEARIAE.

Rp. Cochleariae recentis floridae libras octo,
Spiritus frumenti depurati libras decem,
Aquae communis libras decem,
destillantur librae octo.

Supra recentem herbam hic spiritus iterum cohobetur.

Virtus antiscorbutica, diuretica, carminativa.

Usus. Interne a guttis viginti ad sexaginta;
externe collutoria.

SPIRITUS FORMICARUM.

Rp. Formicarum mensibus Junio aut Julio recens
captarum libram unam,
Spiritus frumenti depurati libras duas,
Aquae communis libras duas,
destillentur inde librae duae.

Virtus tonica, nervina, resolvens.

Usus. Externe membra paralytica fricentur.

SPIRITUS FRUMENTI DEPURATUS.

Rp. Vini frumenti q. l.

Vesicae destillatoriae immittatur, et illi, per vi-
ces, eo usque admisceatur pulvis carbonum
donec ingrato odore perfecte privetur, quod
cognoscitur, spiritum manibus confricando,
aut illum aquae tepidae affundendo, et dein
ut artis est, destilletur.

Nota. Dum vino frumenti, in vesica pauxil-
lum fere drachma una olei vitrioli ad am-
phoram additur, tunc depuratio spiritus mi-
norem pulveris carbonum quantitatem re-
quirit.

Virtus roborans, adstringens, irritans, antiseptica, inspissans, diaphoretica, stomachica.

Usus. Articulationum, aliarum partium laxi-
tas, herniae, tumores oedematosi, ulcera vel
vulnera pure nimio manantia, calli ossei
mollities, gangraena a debilitate vis vitalis.

Dosis. Uncia una in aquae uncüs quatuor bi-
bitur, externe frictiones.

SPIRITUS LAVENDULAE.

Rp. Florum Lavendulae siccatorum libram dimidiam.

Aquae lavendulae libram unam.

Spiritus vini rectificati libras quatuor;

Per viginti quatuor horas macerentur, et tres inde librae eliciantur.

Hoc modo parantur:

Spiritus Menthae,

Melissae,

Rosmarini s. anthos,

SPIRITUS MINDERERI,

SALSILAGO AMMONIACALIS,

LIQUOR ACETATUS AMMONIAE.

Rp. Cinerum clavellatorum depuratorum unc. quatuor.

Aceti destillati q. s. ad perfectam saturationem, evaporetur ad siccitatem, et in aceti destillati uncis octo solvatur, cui adde

Salis ammoniaci depurati pulverati retortae immissi uncias duas. Et ex balneo arenae leni calore destilletur ad siccitatem, sed, ne spiritus aduratur, caveas, et dein iterum cum uncis sedecim aquae diluatur, et pulveris carbonum ope filtretur.

Virtus aperiens, resolvens, excitans, antispasmodica, diuretica, sudorifera.

Usus. Languens eruptio exanthematum, variolarum, morbillorum, purpurae, febres pu-

tridae, arthritis, rheumatismus, hysteria, tussis suffocativa.

Dosis. A drachmis duabus ad unciam integram aliquoties de die.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI AQUOSUS,
LIQUOR CARBONATIS AMMONIAE.

Rp. Salis ammoniaci depurati libram dimidiam,
Cinerum clavellatorum depuratorum libram
unam, cucurbitae vitreae immissis
affunde

Aquae communis libras quinque,

E retorta vitrea, juncturis probe lutatis, in balneo arenae leni igne destilletur eo usque, donec liquor transiens omnem sublimatum in recipiente haerentem salem solvat, minusque salinus esse percipiatur, quo facto, excipulum mutetur et spiritus primo prolectus seorsim servetur.

Virtus et Usus Salis volatilis ammoniaci.

Dosis. A guttis triginta ad sexaginta cum menstruo idoneo.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI CAUSTICUS, CUM CALCE PARATUS,
LIXIVIUM AMMONIACALE,
LIQUOR AMMONIAE PURAE.

Rp. Calcis vivae recens ustae libram unam,
Extinguatur in aqua, quae refrigerata immitatur retortae, cui adde
Salis ammoniaci uncias sex,
Aquae frigidae uncias triginta sex;

Quo facto retorta balneo arenae committatur, juncturis probe lutatis, leni igne destillentur spiritus unciae octo ad duodecim, qui vitro probe clauso asservetur.

Nota. Ex residuo, de quo sub praeparatione salis volatilis ammoniaci dictum est, elixetur *Calx salita*.

Virtus valde excitans, resolvens.

Usus. Pituitosae affectiones, catarrhus suffocativus, apoplexia serosa, paralysis.

Dosis. A guttulis decem ad viginti cum multa aqua. Externe cum oleo unguinoso frictiones.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI SUCCINATUS.

Rp. Olei succini rectificati guttas sexaginta,
Spiritus salis ammoniaci vinosi unc. duodecim;
Probe inter se mixta servantur ad usus externos.

Virtus prioris.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI VOLATILIS VINOSUS.

Rp. Salis ammoniaci libram dimidiam
Cinerum clavellatorum depuratorum libram unam;
Mixta immittantur retortae vitreae,
quibus affunde
Spiritus vini libras duas, et leni igne ex retorta bene lutata destillentur, et spiritus

volatilis prodeuntis libra circiter colligatur.

Virtus resolvens, incidens, diuretica.

Usus. Pituitosorum humorum copia, menstruorum retentio a lenta pituita, febres intermittentes tempore frigoris. Externe pro odoramento.

Dosis. Ad guttulas quindecim in vehiculo.

SPIRITUS SALIS DULCIS,
VINOSUS MURIATICUS,
ACIDUM SALIS DULCIFICATUM.

Rp. Magnesiae vitrariorum partem unam et dimidiam.

Caute immittas retortae, et affunde
Acidi muriatici concentrati partes quinque,
Spiritus vini rectificatissimi partes tres;
Leni igne, e balneo arenae, recipiente adaptato, destillentur,

Liquor in vitro probe clauso servetur.

Virtus analeptica, antiseptica, excitans, refrigerans, antispasmodica, diuretica.

Usus. Febres nervosae putridae, biliosae, affectiones spasmodicae, dysenteria, cholera, colica flatulenta, arthritis, rheumatismus, dolores ex menstruis, fluxus nimius haemorrhoidum, ulcera oris, debilitas ventriculi.

Dosis. A guttis quadraginta ad sexaginta in mixturis; externe collutoria cum melle rosarum.

SPIRITUS SAPONIS.

Rp. Saponis albi hispanici rasi uncias quatuor,
 Cinerum clavellatorum depuratorum uncias
 duas, coque in lebate cum aquae libra
 una saepius agitando ad consistentiam ex-
 tracti, immitte in cucurbitam, et affunde
 spiritus lavendulae uncias sedecim, digere
 leni igne ad perfectam saponis solutio-
 nem, per quatuor dies repetitis vicibus
 agitetur, dein filtretur.

Virtus detergens, resolvens, attenuans.

Usus externus.

Nota. Spiritus hic efficacior fit, dum illi uncia
 dimidia camphorae additur.

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.

Rp. Spiritus vini rectificati libram unam
 Camphorae unciam unam et dimidiam, sol-
 vantur in vase clauso et serventur.

Virtus discutiens roborans.

Usus. Externe, sugillationes, tendinum et li-
 gamentorum debilitas, sed in fibra rigida,
 et inflammatione ubique vitandus sit.

STANNUM PRAEPARATUM,

PULVIS STANNI.

Rp. Stanni anglici puri lima prius comminuti par-
 tes duas.

Cretae purae partem unam;

Mixta in mortario lapideo terantur in pul-
 verem non nimis tenuem.

Virtus anthelmintica.

Usus. Taeniae.

Dosis. A granis viginti ad quadraginta.

Cave ne stannum plumbo sit inquinatum.

SUCCUS AD SCORBUTICOS.

Rp. Cochleariae, sive alius expetitae herbae q. l.

Praelo succus expressus subsidentia et colo
puretur.

SULPHUR AURATUM ANTIMONII, OXYDUM STIBII SULPHURATUM AURAN- TIACUM.

Rp. Antimonii partes duas,

Sulphuris partes tres,

In pulverem subtilem contritae commiscean-
tur cum sufficiente lixivio caustico, in le-
bete ferreo per coctionem solvantur, per
saccum filtrentur, liquor aqua sufficiente
diluatur. Sulphur antimonii ope acidi
sulphuris tenuis praecipitetur, caute tamen
ne copia nimia acidi admisceatur. Et ob-
tentum praecipitatum aqua tepida perfecte
edulcoretur, leniter siccetur.

Virtus resolvens, diuretica, diaphoretica, in ma-
jori dosi emetica.

Usus. Obstructiones viscerum abdominalium,
mucositas pectoris, febres intermittentes lar-
vatae, hydrops, tussis ferina, catarrhus suf-
focativus, chronica exanthemata, glandula-
rum tumores, rhachitis, cachexia, rheumatis-
mus, podagra.

Dosis. A granis tribus ad quatuor et ultra adultis, infantibus a quarta grani parte ad granum unum cum saccharo, sive cum menstruo liquido idoneo.

SYRUPUS ACETI.

Rp. Aceti vini fragrantis libras duas,
Sacchari albi libras quatuor,
Coquantur intra unicam ebullitionem in vase vitreo in syrupum.

Virtus antiseptica, refrigerans.

SYRUPUS ALLII.

Rp. Capitum allii minutim incisorum unc. sex,
Aque ferventis uncias duodecim.
Macerentur per duodecim horas in vase vitreo probe clauso. Quo facto, in liquore percolato solvatur
Sacchari albi pulverati duplum respectu liquoris, ut fiat syrupus.

Virtus sub *Allio* dicta est.

Dosis. Cochlear theanum.

SYRUPUS ACETOSITATIS CITRI.

Rp. Succu citri depurati uncias decem,
Sacchari albi uncias viginti,
Mixta aliquoties ebulliant et per flannelam calide filtrentur.

Hoc modo fiunt:

Syrupus Berberum,
Rubi idazi.

SYRUPUS ALTHAEAE.

Rp. Radicum Althaeae decorticatarum libram dimidiam,

Aquae libras sex; coque ad consumptionem tertiae partis, colaturae expressae et subsidentia depuratae adde sacchari albi libras sex, et fiat unica ebullitione syrupus.

Virtus et Usus sub Althaea.

Dosis. Ad unciam unam.

SYRUPUS AURANTIORUM CORTICUM.

Rp. Flavedinis corticum aurantium libr. dimidiam.

Aquae communis fervidae libras tres.

Per biduum in vase clauso macerentur, et colaturae depuratae adde

Sacchari albi libras quatuor.

Virtus et Usus vid. Aurantium cortex.

Dosis. Ad unciam integram.

SYRUPUS CINAMOMI.

Rp. Cinamomi acuti (florum cassiae) contusi uncias quinque,

Aquae cinamomi vinosae libras duas,

In cucurbita vitrea clausa per Nychtemeron digerantur.

Colaturae adde

Sacchari albi clarificati libras tres et unc. quatuor.

Virtus et Usus vid. Cinamomi corticem.

Dosis. Cochlear theanum.

SYRUPUS E MANNA.

- Rp. Foliorum sennae uncias quatuor,
seminis foeniculi drachmas duas,
affunde
Aquae ebullientis libras duas;
In loco calido per aliquot horas maceren-
tur, et in infuso expresso dissolve
Mannae electae uncias sex,
sacchari albi uncias viginti duas,
coque in syrupum.
Virtus aperiens, laxans.
Dosis. Ad unciam integram.

SYRUPUS RHEI.

- Rp. Rhei uncias duas
Cinerum clavellatorum depuratorum drach-
mam unam et dimidiam;
Digerantur per duodecim horas in aquae
simplicis unciiis octodecim, et in colatura
expressa solve
Sacchari albi partes duas, leni igne in syru-
pum redigatur.
Virtus et Usus vid. *Rheum*.
Dosis. Ad uncias integras.

SYRUPUS VIOLARUM.

- Rp. Florum violarum recentium a calice viridi
liberatorum libram unam,
Aquae destillatae libras tres;
Per Nychtemeron macerentur in vase vitreo,
et coletur sine expressione, dein cum sac-
chari albi duplo sine calore fiat syrupus.

Virtus solvens, leniter laxans, analeptica.

Usus. Saporis gratia mixturis additur.

TARTARUS EMETICUS,
STIBIATUS,
ANTIMONIALIS,
POTASSAE STIBIATUS.

Rp. Vitri antimonii subtilissime pulverati uncias
duas,

Crystallorum tartari pulverisatarum uncias
quatuor,

Aquae destillatae libras sex,

Coquantur in vase vitreo sive vitro incru-
stato, per duodecim horas et ultra, spa-
tula lignea agitando, et jactura aquae
nova affusione ejus subinde redimpleatur,
lixivium obtentum filtretur fervidum, eva-
poretur lente ad siccitatem, statimque tota
massa pulverisetur, et in vase vitreo siccio
servetur.

Virtus emetica, in minima dosi resolvens, dia-
phoretica, diuretica, antispasmodica.

Usus. Obstructiones, exanthemata retropulsa,
hemiplegia, paralysis, lethargus, incipiens ca-
taracta, pituita pectoris, tussis ferina, arthri-
tis, rheumatismus, febres biliosae, putridae,
malignae intermittentes, dysenteria biliosa pu-
trida, catarrhus suffocativus, ventriculi mo-
lesta oneratio, venenum ingestum, exanthe-
matum languens eruptio.

Dosis. Grana duo ad tria cum aqua destillata;
scopo resolvendi ad granum dimidium.

TARTARUS BORAXATUS,
CREMOR TARTARI SOLUBILIS.

Rp. Crystallorum tartari uncias sedecim,

Boracis depurati uncias quatuor;

Seorsim subtilissime pulverisentur, inter se probe permisceantur, et vitro probe clauso servantur.

Virtus incidens, aperiens, refrigerans, in majori dosi laxans.

Usus. Dysenteria biliosa, febris inflammatoria, haemoptysis, obstructio viscerum, icterus, haemorrhoides.

Dosis. A granis decem, ad drachmas.

TARTARUS TARTARISATUS,
ALCALI VEGETABILE TARTARISATUM,
TARTRIS POTASSAE.

Rp. Cinerum clavellatorum depuratorum q. l.

solve

In aquae simplicis partibus octo;

Solutioni calenti adde cochleatim crystallos tartari pulverisatas ad punctum saturationis, liquor calidus filtretur, leni igne in vase figulino ad siccitatem evaporetur, salque vitro bene clauso servetur.

Virtus et Usus sequentis T.

Dosis. A drachma ad drachmas tres.

TARTARUS VITRIOLATUS,
ARCANUM DUPLICATUM,
ALCALI VEGETABILE VITRIOLATUM,
SULPHAS POTASSAE.

Rp. Cinerum clavellatorum depuratorum q. l.

Solvantur in sufficiente quantitate aquae communis.

Solutioni successive et guttatim instilla

Spiritus vitrioli quantum satis ad perfectam saturationem. Liquor filtratus leni igne ad crystallisationem evaporetur.

Virtus solvens, aperiens, diuretica, majori dosi laxans.

Usus. Sordes primarum viarum, febres intermittentes, febris inflammatoria, icterus, podagra, atrophia, rhachitis, hydrops, chlorosis, menstrua suppressa.

Dosis. Scopo digerendi a granis quindecim ad triginta.

TERRA FOLIATA TARTARI,
OXYTARTARUS,
ALCALI VEGETABILE ACETATUM,
ACETAS POTASSAE.

Rp. Cinerum clavellatorum depuratorum q. l.

Immissis vitro amplo successive affunde

Aceti destillati quantum sufficit ad perfectam saturationem et paululum plus. Dein liquor ope pulveris carbonum filtratus leni calore inspissetur. Sive, sumitur sal so-

dae aceto destillato saturatus, evaporetur ad cuticulam, filtretur pristino modo, in crystallos redigatur, et vocatur *Terra foliata tartari crystallisata*, seu *Acetas sodae*, sive *Soda acetosa*.

Virtus refrigerans, aperiens, diuretica, abstergens, laxans.

Usus. Pituita primarum viarum, scirrhus hepatis, arthritis, rheumatismus, obstructio viscerum, hydrops, chlorosis, strumae, febres acutae, intermittentes, atrophia, rhachitis, icterus, ataxia mensium, affectus haemorrhoidales, scorbutus, melancholia, mania.

Dosis. A scrupulo ad drachmam.

TERRA PONDEROSA SALITA,

MURIAS BARYTAE.

Rp. Spati ponderosi purissimi in subtilem pulverem redacti partes duas,

Potassae depuratae partes tres.

Coquantur cum tribus ad quatuor partibus aquae communis, sub continua mixtione, ad siccitatem, et hoc dein cum denuo affusa aequalis quantitatis aqua duabus adhuc vicibus repetatur. Quo facto Terra ponderosa excussa, ope aquae ferventis, ab omnibus partibus salinis perfecte edulcoretur; Dein illi acidum muriaticum parvis dosibus affundatur eousque, donec prorsus effervescentia cesset. Liquor filtratus in cucurbita ad perfectam siccitatem evaporetur, sal in cruci-

bulo tecto, successive aucto igne fundatur, decantetur in laminam, solvatur fere quinta ad sextam aquae quantitate. Liquor filtratus, ut superstites forsan metallicaе particulae perfecte expellantur, cum pauca additione terrae ponderosae aeratae purae praecipitationem per potassam obtentae, per breve tempus leniter digeratur. Denique iterum filtretur, leni evaporatione secundum artis regulas crystallisetur; Et obtentae crystalli, omni vice, antequam illae siccantur, aliquantisper aqua frigida cito abluantur.

Virtus diuretica, resolvens, irritans.

Usus. Scrophulae, strumae, scirrhi, canceri, pituita, asthma, ascarides, ulcera scrophulosa.

Dosis. Crystallorum drachma dimidia solvitur uncia una aquae destillatae, hujus solutionis infantibus guttae decem ad viginti, aliquando syrupo rubi idaei temperatae exhibentur. Vel grana quatuor binis aquae destillatae unciis dissolvuntur, ejusque liquoris guttae quinquaginta ad sexaginta aegris propinantur.

TINCTURA CANTHARIDUM.

Rp. Cantharidum pulveratarum unciam unam,
Spiritus vini libram unam;
Per triduum digerantur, filtrentur.

Virtus Externe rubefaciens, resolvens, cathartica.

Usus. Interne diabetes vera, rabies canina.

Dosis. A guttis decem ad triginta cum Emulsione.

TINCTURA CASTOREI.

Rp. Castorei Nostratis in parva frustula concisi
unciam unam.

Cinereum clavellatorum depuratorum drachmas
duas.

Spiritus vini rectificati libras duas,

Per triduum digerantur, Tinctura cum ex-
pressionem colata servetur.

Virtus antispasmodica.

Usus. Passiones hystericæ et spasmodicæ.

Dosis. A guttis viginti ad quadraginta.

TINCTURA CATECHU.

Rp. Catechu grosse contusi partem unam,

Spiritus vini rectificati partes sex;

Per tres dies digerantur, filtrentur.

Virtus et Usus vide P. I.

Dosis. A viginti ad triginta guttulas.

TINCTURA EUPHORBII.

Rp. Euphorbii unciam unam,

Spiritus vini rectificati uncias octo;

Per tres dies digere, filtra.

Virtus Cathartica.

Usus externus. Caries ossium.

TINCTURA LACCAE AQUOSA.

Rp. Granorum laccae unciam unam,
Aluminis crudi unciam dimidiam,
Aquae destillatae uncias sex;
Coctis et refrigeratis adde
Aquae destillatae salviae,
Rosarum ana uncias duas,
Dein filtra.

Virtus et Usus sequentis T.

TINCTURA LACCAE SPIRITUOSA.

Rp. Laccae tritae unciam unam,
Myrrhae drachmas tres,
Spiritus cochleariae libram unam et dimi-
diam;
Per aliquot dies digerantur, colentur.

Virtus roborans.

Usus externus. Laxitas gingivarum, stoma-
cace, ulcera scorbutica.

TINCTURA MYRRHAE.

Rp. Myrrhae pulveratae uncias quatuor,
Spiritus vini rectificati libras duas.
Per tres dies digere, filtra.

Virtus stimulans.

Usus externus. Ulcera.

TINCTURA SALINA COMPOSITA.

Rp. Flavedinum corticum aurantiorum,
Radiciis gentianae concisae ana unciam unam,

Aquae destillatae communis libram unam,
Cinerum clavellatorum depuratorum uncias
quatuor;

Per quatrimum digerantur, colatis adde
Spiritus vini rectificati uncias quatuor.

Virtus resolvens, attenuans, antacida, diure-
tica.

Usus. Acidum primarum viarum, digestio de-
pravata, defectus bilis, obstructio viscerum,
icterus, atrophia infantum, rhachitis, scabies,
sabulum.

Dosis. A drachma una ad duas.

TINCTURA TONICA MARTIALIS FLAVA.

Rp. Limaturae martis purissimae q. l.

Solve

In acido salis ad saturationem. Liquor fil-
tratus ad siccitatem evaporetur, et sal in
retorta successive aucto igne usque dum
retorta candeat sublimetur; Tum in collo
depositus laxis squamosus fuscusque
sal per intervalla ope spatulae lignae exi-
matur, finita sublimatione omnis elicitus
sal libero aeri aut cellae, ut deliquescat,
exponatur. Drachmae tres huius fluidi
cum unciis duodecim alcoholis vini mi-
sceantur et in albis vitris obturatis tam
diu radiis solis exponantur, donec tin-
ctura flavum suum colorem perfecte ami-
serit et instar aquae pellucidae evaserit.

In umbra huic tincturae pristinus flavus color redit.

Dosis. A guttulis quinque, decem, ad viginti quinque in menstruo idoneo.

TROCHISCI BECCHICI ALBI,
ALTHAEAE COMPOSITI.

Rp. Pulveris radice althaeae unciam unam,
 iridis florentinae unciam di-
 midiam,
Sacchari albi libram unam et dimidiam;
Misce, fiat cum mucilagine gummi arabici
q. s. massa, ex qua trochisci formentur.
Virtus et Usus Pastae Althaeae.

UNGUENTUM ALTHAEAE,
CITRINUM.

Rp. Mucilaginis radice althaeae,
 seminis lini ana uncias octo,
Butyri non saliti uncias triginta duas,
Radice curcumae pulveratae drachm. tres;
Coque ad humiditatis consumptionem, dein
filtratis adde
Cerae flavae uncias quatuor,
Terebinthinae larignae unciam unam;
Omnia simul mixta per pannum lineum
pressa servantur.
Virtus emolliens, leniens.
Usus. Extus Tumores duri, fibrae rigidae.

UNGUENTUM BASILICUM.

Rp. Olei olivarum uncias duodecim,

Cerae flavae,

Picis navalis,

Sevi vervecini,

Terebinthinae ana uncias tres;

Leni igne liquentur, colentur.

Virtus emolliens, digerens, maturans.

Usus. Externe, Ulcera sordida.

UNGUENTUM DIGESTIVUM.

Rp. Terebinthinae larignae libram unam, cum vitellis ovorum numero octo misceantur, subigantur in unguentum.

Extempore paretur.

Virtus digerens, maturans.

Usus externus. Suppuratio ulcerum promovenda.

UNGUENTUM MERCURIALE,
GRISEUM.

Rp. Axungiae porcinae recentis depuratae uncias octo,

Liquatae, ab igne remotae, et jam frigescenti successive adde

Mercurii vivi depurati uncias quatuor;

In mortario lapideo diligenter terantur quousque globuli mercuriales perfecte disparuerint. Quo facto, labor spatio duarum horarum adhuc protrahatur.

Nota. Loco mercurii vivi assumitur mercurius solubilis, cujus drachmae duae cum axungiae porcinae unciis tribus, continua et diu protracta trituratione inter se intime commisceantur.

Virtus maxime resolvens, antisiphylitica, valde discutiens.

Usus. Tumores venerei extus fricentur ad drachmam unam et ultra.

UNGUENTUM NERVINUM.

Rp. Sevi ovilli depurati uncias octo,

leni calore liquato adde

Olei laurini libram unam,

destillati terebinthinae unciam unam;

Petrae unciam dimidiam;

Mixta subigantur, donec refrixerint.

Virtus irritans, resolvens, roborans.

Usus. Externe, Debilitas ligamentorum, partium mollium rigiditas, paralysis, colica flatulenta spasmodica, diarrhoea a laxitate intestinorum.

UNGUENTUM POMADINUM, ROSACEUM.

Rp. Axungiae porcinae recentis uncias triginta
duas, infunde guttatim

Aquae rosarum uncias quatuor

Continue instillando, optime pistillo ligneo subigendo, donec niveam acquisiverit

albedinem; Tunc pro lubitu olea odorata,
ut oleum lavendulae, addantur.

Virtus emolliens, lubricans, demulcens.

Usus. Externe, Fissurae mammarum, labiorum,
manuum, uberum rhagades, haemorrhoides
dolentes.

UNGUENTUM SATURNINUM.

Rp. Cerae leni igne liquatae uncias decem,
Olei olivarum libram unam et dimidiam,
Aceti saturnini uncias octo;
Subigantur spatula lignea donec refrixerint.

Virtus resolvens, refrigerans, discutiens, exci-
tans.

Usus. Externe, Ambustiones, ulcera cutis.

UNGUENTUM SULPHURIS COMPOSITUM, CONTRA SCABIEM.

Rp. Axungiae porcinae libram unam,
Florum sulphuris uncias duas,
Vitrioli albi unciam unam,
misce, fiat unguentum.

Virtus adstringens, repellens, exsiccans.

Usus. Externe, scabies.

VINUM ANTIMONIALE.

Rp. Vitri antimonii pulverati unciam unam,
Vini hispanici libras duas.

Digerantur per duodecim horas, interdum agitando. Liquor filtretur, et in vitro bene obturato servetur.

Virtus valide resolvens, alterans.

Usus. Impuritates sanguinis, exanthemata chronica, obstructions viscerum, scabies, tinea, facies variis maculis defoedata, rachitis, atrophia, diathesis pituitosa, melancholia, mania, epilepsia.

Dosis. A guttis duabus ad quatuor infantibus; Adultis a guttis viginti ad triginta, et, semel in die sensim guttas augendo, exhibeatur.

VITRUM ANTIMONII.

Rp. Antimonii in pulverem tusi q. l.

ustuletur in vase vitreo plane non vitreato, movendo perpetim fistula tabacaria donec nullum ultra fumum spargat. Si massa igne conglutinatur, de novo tundi debet; Tum haec calx in crucibulo igni fortiori exponatur, fundatur in vitrum pellucidum hyacinthinum.

VITRUM ANTIMONII CERATUM.

Rp. Cerae flavae drachmam unam,

Liquefactae in vase vitreo injiciatur

Vitri antimonii subtilissime pulverati uncia una, detineatur super ignem lenem per horam dimidiam, spatula assiduo agitando, dein effundatur materies in chartam, et frige facta in pulverem teratur.

Virtus emetica.

Usus. Dysenteria, et diarrhoea rebellis, haemorrhagia uteri.

Dosis. A grano uno ad sex cum syrupo quodam, bis, ter, per duodecim horas.

INDEX PARTIS I.

A.

	pag.		pag.
Abietis turiones	1	Amygdalae dulces	10
thus, s. lacryma,		amaræ	11
s. resina nativa	1	nanae	11
resina communis	1	Amylum tritici	11
Abrotani herba	2	Anagallidis herba	12
summitates	2	Anchusae radix, <i>vid.</i> Al-	
Absynthii vulgaris herba	2	cannae spuriae.	
summitates	2	Anethi semina	12
Acaciae flores	2	Angelicae sativae radix	12
Acetosae folia recentia	3	Angusturae cortex	13
Acetum	3	Anisi semina	13
Aconiti herba	4	Anisum stellatum	14
Acori veri radix	4	Anthophylli, <i>vid.</i> Caryo-	
Aes, <i>vid.</i> Cuprum.		phyll. aromat.	
Agaricus chirurgorum, s.		Anthos flores, <i>vid.</i> Roris-	
pracparatus, s. querci-		marini hortens.	
nus	4	Antimonium crudum	14
Agaricus muscarius	5	Aquifolii folia.	15
Alcannae spuriae radix	5	Argentum	15
Allii radix	5	vivum <i>vid.</i> Mercurius.	
Alni folia	6	Aristolochiac trilobatae	
Aloe pellucida s. lucida	6	stipites	15
succotrina	6	radix	15
hepatica	6	Aristol. vulgaris radix	16
caballina	6	Armoraciae rad. recens	16
Althaeae radix	7	Arnicae flores	17
folia	7	herba	17
Alumen crudum	8	radix	17
Ambra grisca	8	Ari radix	17
Ammoniacus sal	9	Arsenicum album	18
Ammoniacum gummi	10	Asa dulcis, <i>vid.</i> Benzoe.	

	pag.		pag.
Asari radix	19	Campechense lignum	30
folia	19	Camphora	30
Asa foetida gummi	19	Cannabis semina	31
Astragali exscapi radix	20	Cantharides	31
Avenae semina excortica	21	Cardamomi minoris fructus	32
Augustinae cortex, <i>vid.</i>		Cardui benedicti herba	32
Angusturae.		tomentosi herba	
Aurantiorum		recens	33
malum immaturum	21	Caricae pingues	33
flores	21	Caricis arenariae radix	34
folia	21	Carvi semina	34
cortex	21	Caryophylli aromatici	35
succus	21	Caryophyllatae radix	36
Axungia porci	22	Cascarillae cortex	36
		Cassiae lignae cortex	37
		Cassiae flores, <i>vid.</i> Cinnamonum.	
		Castoreum	37
B.		Cataputiae majoris semina, <i>vid.</i> Ricini vulgaris.	
Balsamum canadense	22	Centaurei minoris herba	38
copaivae	23	Cepae radix	38
peruvianum, album et nigrum	23	Cera apum	39
Bardanae radix	24	flava	39
Belladonnae folia	25	alba	39
radix	25	Cerasorum rubrorum acidorum fructus	39
Benzoe, sive benzoinum gummi	25	Cerefolii herba	39
Berberis baccae	26	succus	39
cortex medius	26	Cerussa	40
Bistortae radix	27	Chamaedryos herba	40
Borax	27	Chamaemori baccae	41
Botryos vulgaris herba	28	Chamaepityos herba	41
		Chamomillae vulgaris	
		flores	42
C.		herba	42
Cacao fructus, s. nucleus	28	Romanae flores	42
oleum, s. butyrum	28	Chelidonii majoris radix	42
Cajeput, s. cajeput oleum	29	herb. rec.	42
Calami aromatici radix, <i>vid.</i> Acori veri.		Cherophylli herba, succus	
Calx arsenici alba, <i>vid.</i>		<i>vid.</i> Cerefolii.	
Arsenic. alb.		Chinae cortex	43
Calx viva	29		

	pag.		pag.
China rubra	44	Dictamni albi radix	54
Cichorei radix	44	Diervillae stipites	54
herba	44	Digitalis folia	55
Cicutae herba	45	flores	55
succus inspissatus	45	Dulcamarae stipites	55
Cinae semen, <i>vid.</i> Santonici.			
Cineres clavellati	46		
Cinamomi cortex	46	E.	
Cassiae flores	46	Elemi gummi	56
Citri malum	47	Enulae radix	56
caro s. pulpa	47	Erucae semina	57
succus expressus	47	Euphorbii gummi, s. Eu-	
cortex	47	phorbium.	57
Cochleariae herb. rec.	47		
Colchici radix recens	48	F.	
Colla piscium	49		
Colocynthis pulpa	49	Farfarae radix	57
Columbo radix	49	folia	57
Contrajervae radix	50	flores	57
Conii maculati herba, <i>vid.</i>		Ferrum	58
Cicutae.		Ferrum vitriolatum, <i>vid.</i> Vi-	
Consolidae majoris radix,		triolum inartis.	
<i>vid.</i> Symphyti.		Filicis foeminae radix	58
Coriandri semen	50	maris radix	59
Cortex peruvianus, <i>vid.</i>		Flammulae jovis folia	59
Chinae.		flores	59
Cortex peruvianus, ruber,		Foeniculi semen	60
<i>vid.</i> China rubra.		aquatici semen,	
Creta alba	51	<i>vid.</i> Phellandrii.	
Croci stigmata	51	Formicae cum acervo	61
Cumini semina	52	Fraxini cortex	61
Cuprum	52	Fumariae herba recens	61
Curcunae longae radix	53	Fungus melitensis	62
Cydoniorum fructus	53		
semina	53	G.	
Cumini semina, <i>vid.</i> Cumini.			
Cynosbatus fructus, <i>vid.</i> Ro-		Galangae majoris et mi-	
sae sylvestris.		noris radix	62
		Galbani gummi	63
D.		Gallae quercinae, s. tur-	
		cicae	63
Dauci vulgaris, s. sativi		Gei rivalis, s. palustris	
radix	54	radix	64

	pag.		pag.
Geiurbani radix, <i>vid.</i> Ca- ryophyllatae.		Iuglandis putamen	75
Gentianae luteae, s. ru- brae radix	64	Iuniperi baccae	76
Geoffroyae jamaic. cor- tex	65	lignum	76
Glycyrrhizae radix	66	K.	
Graminis radix	66	Kino gummi	77
Gratiolae herba	67	L.	
radix	67	Laccae gummi	77
Guajaci lignum	67	Lactucae sylvestris herb.	77
gummi	67	Lapathi aquatici radix	78
Gummi arabicum	68	Lavendulae spica florens	78
guttae	68	Laurocerasi folia	79
myrrhae, <i>vid.</i> Myrrha.		Lauri folia	79
Gummi sagapeni, <i>vid.</i> Sa- gapenum.		baccae	79
		Levistici herba	80
		radix	80
		semen	80
H.		Lichen islandicus	80
Hellebori albi radix	69	Lini semen	80
nigri fibrae	69	oleum	80
Helmintochothon	70	cathartici herba	81
Hippocastani cortex	71	Liquiritiae radix, <i>vid.</i> Gly- cyrrhizae.	
Hordei semen crudum	71	Lithargyrium	81
decorticatum, per- latum	71	Lobeliae radix	82
maltum	71	Lycopodii semen	82
Hyosciami folia	72		
Hyssopi herba	73	M.	
I.		Magellanicus cortex, <i>vid.</i> Winteranus.	
Iaceae herba, <i>vid.</i> Violae tricoloris.		Magnesia nigra, s. vitra- riorum	82
Ialappae radix	73	Majoranae herba, s. sum- mitates	83
Iaponica terra, <i>vid.</i> Terra Catechu.		Malvae radices	83
Iasmini flores	74	vulgaris herba	83
Imperatoriae radix	74	arboreae flores	83
Ippeacuanhae radix	74	Manna s. M. calabrina	84
Ireos, vel Iridis florenti- nac radix	75	Mari veri herba, s. sum- mitates	85

	pag.	O.	pag.
Marrubii, s. M. albi herba	85		
Mastix, s. mastiche	86	Olibanum	96
Mel	86	Olivarum oleum	96
Meliloti herba c. floribus	87	Opium	97
Melissae herba	87	Origani vulgaris herba c. floribus	98
Menthae crispae herba	88	Oryzac semen decortica- tum	98
piperitae, s. piperitidis herba	88	Ovi gallinae albumen vitellus	99
Mercurius	88	Oxycocci baccae	99
Mezerei cortex	89	Oxydum arsenici album, vid. Arsenicum album.	
radix	89		
Millefolii herba	90		
flores	90		
nobilis herba	91		
flores	91	P.	
Millepedes	91	Paeoniae radix	100
Minium	91	Passulae majores	100
Mori baccae, s. Morum	92	minores, s. Co- rinthiacae	100
Moschata nux	92	Pecurim, sive Pichurim	
macis	92	faba	101
oleum nucistae		Petroleum	101
expressum	92	album	101
Moschus	93	rubrum	101
Murias ammoniac, vid. Am- moniacus sal.		nigrum	101
Muscus islandicus, vid.		Petrosclini semina	102
Lichen island.		herba recens	102
Muriaticum sal et murias sodae, vid. Sal commune.		radix	102
Myrrha	94	Phellandrii semen	102
Myrtilli baccae	94	Phytolaccae herb. rec.	102
		radix	102
		Pimpinellae albae radix	103
		Pini turiones	103
		terebinthina com- munis	103
N.		pax nigra, solida, na- valis	104
Napelli extractum, vid. Aco- niti.		Piper album et nigrum	104
Nasturtii aquatici herba recens	95	Plumbum	104
Nicotianae folia	95	Polygalae amarae herb.	105
Nitrum commune. Nitras potassae	96	radix	105

	pag.		pag.
Polypodii radix	105	Rorismarini hortensis her-	
Pruna damascena	105	ba	113
prunorum pulpa	105	flores anthos	113
Pruni sylvestris flores,		sylvestr. herba	114
<i>vid.</i> Acaciae.		Rubiac tinctorum rad.	114
Psyllii semen	106	Rubi arctici baccae	115
Ptarmicae radix	106	Idaei baccae	115
herba c. flor.	106	Rutae herba	115
Pulegii herba	106		
Pulsatillae nigricantis her-		S.	
ba	107	Sabadillae semen	116
Pyrethri radix	107	Sabinae folia	117
		Saccharum	117
Q.		Sagapenum	117
Quassiae lignum	108	Sagu v. Sago grana	118
Quercus cortex	108	Sal amarus	118
folia	108	sibiricus	118
		communis	119
R.		Salap	119
Ranunculi albi flores	109	Salicis cortex	120
herb. rec.	109	Salviae herba	120
Raphani rustici rad.		Sambuci cortex median.	121
rec. <i>vid.</i> Armoraciae.		flores	121
Rasura cornu cervi	109	haccae recent.	121
Rhabarbari radix	109	Santonici semen	121
Sibirici radix	110	Sapo Wologdensis	122
Rhei radix <i>vid.</i> Rhabar-		Saponariae radix	122
bari.		Sarsaparillae radix	122
Rhododendri folia	110	Sassafras lignum	123
stipites	110	cortex	123
Ribesiorum nigrorum bac-		Saturnus <i>vid.</i> Plumbum.	
cae	111	Scammonium	123
folia c. stipiti-		Scarabaens unctuarius, <i>vid.</i>	
bus	111	Vermis majalis	
Ribesiorum s. Ribium ru-		Scillae radix	124
brorum baccae	112	Seordii herba	125
Ricini vulgaris semina	112	Sedi majoris, s. Semper-	
Rosae damascenae et ru-		vivi majoris folia vi-	
brae flores	113	rentia	125
sylvestris cynosba-		Senegae radix	125
tos fructus	113	Sennae alexandrinae	
		folia	126

Sennae alex. folliculi	pag. 126	Taraxaci radix	pag. 134
Italicae folia	126	herba recens	134
Serpentariae Virginianae radix	127	Tartarus albus et ruber	135
Serpylli herba	127	Terebinthina larigna, seu veneta	135
Sevum bovinum	127	oleum, seu spiritus	135
Siliqua dulcis	128	Terra catechu	136
Sinarubae cortex	128	Thymi herba	137
Sinapis nigrae semen	128	Thus, vid. Olibanum.	
Spatum ponderosum	129	Turcicae gallae, vid. Gal- lae quercinae.	
Sperma ceti	129	Tormentillae radix	137
Spigeliae anthelmiae herba c. radice	129	Tussilaginis radix, folia, vid. Farfarae.	
Marilandicae radix	130	Tragacanthae gummi	138
Spongia marina	130	Trifolii fibrini herba	138
Stannum	131	Tritici seminis farina	139
Stibium, vid. Antimonium crudum.		V.	
Stramonii herba rec.	131	Valerianae sylvestris, s. minoris	139
Sulfas aluminae, vid. Alu- men crudum.		radix	139
Sulfas cupri, vid. Vitriolum coeruleum.		Vanillae siliquae	140
ferri, vid. Vitriolum martis.		Venus, vid. Cuprum.	
magnesiae, vid. Sal amarum.		Verbasci flores	140
zinci, vid. Vitriolum album.		folia	140
Succinum	131	Vermis majalis	141
Sulphur	132	Veronicae herba	141
Symphyti radix	132	Violae flores	142
		tricoloris herba	142
T.		Vitis idaeae baccae	142
Tabaci folia, vid. Nicotia- nae.		folia	142
Tacamahaca	133	Vitriolum album, sive zinci	143
Tamarindorum fructus	133	cocruleum, s.	
pulpa	133	cyprium	144
Tanaceti herba, semen	134		

	pag.	W.	pag.
Vitriolum martis	144	Winteranus cortex	146
Vomica nux	145	Z.	
		Zedoariae longae rotun-	
U.		dae radix	147
		Zincum	147
Ulmi cortex medius	145	Zingiberis albi et nigri	
Uvae ursi folia	146	radix	147

INDEX PARTIS II.

A.

	pag.
Acetas cupri, <i>vid.</i> Aerugo crystallisata.	
potassae, }	
sodae, } <i>vid.</i> Terra fol. tart.	
Acetum antisepticum	150
colchici	150
destillatum	152
dulcificatum, <i>vid.</i> Liquor anod. vegetab.	
glaciale, <i>vid.</i> Acid. aceti concentratiss.	
saturni	150
scilliticum	150
vini frigore concentratum	151
Acidum Aceticum, <i>vid.</i> Acid. acetic. concentr.	
aceti concentratum	152
concentratissimum	153
benzoicum, <i>vid.</i> Flores benzoës.	
muriaticum concentratum	154
nitri concentratum	154
tenue s. dilutum	155
nitricum, <i>vid.</i> Acid. nitri concentrat.	
phosphori	155
phosphoricum, <i>vid.</i> Acid. phosphori.	
salis, <i>vid.</i> Acid. muriatic. concentrat.	
dulcificatum, <i>vid.</i> Spirit. sal. dulc.	
sulphuricum, <i>vid.</i> Acid. vitriolati concentr.	
sulphuricum dilutum, <i>vid.</i> Acid. vitrioli. dilut.	
tartari crystallisatum	156
tartarosum crystallisatum, <i>vid.</i> Acid. tartari	
crystallisat.	
vitrioli concentratum, s. depuratum	158
dilutum	158
Aerugo crystallisata	159
Aether aceticus, }	
vitrioli, } <i>vid.</i> Naphtha aceti.	

	pag.
Aethiops antimonialis	160
martialis	159
mineralis	159
Alcali causticum	160
minerale	161
vitriolatum, <i>vid.</i> Sal mirab. Glaub.	
vegetabile, <i>vid.</i> Cin. clavell. depur.	
acetum, <i>vid.</i> Terra fol. tartar.	
tartarisatum, } <i>vid.</i> Tart. tartarisat.	
vitriolatum, }	
volatile siccum, <i>vid.</i> Sal volat. salis ammon.	
Alcohol aceti, <i>vid.</i> Acidum aceti concentrat.	
vini	161
alcoholisatum	162
Alumen ustum	163
Anima rhei, <i>vid.</i> Infus. rhei aquos.	
Antimonium crudum praeparatum	163
Aqua aëris fixi	163
martialis	163
calcis vivae	163
cerefolii	166
cinamomi cum vino	166
sine vino	166
communis destillata	164
fortis, <i>vid.</i> Acid. nitri dilut.	
fragariae	166
menthae crispae	166
piperitidis	166
ophthalmica caerulea	164
phagadaenica	165
picea	165
rosarum	167
sambuci	166
saturnina, <i>vid.</i> Aqua vegetomineral.	165
Arcanum duplicatum, <i>vid.</i> Tart. vitriolat.	
Argentum vivum, <i>vid.</i> Mercur. viv. depur.	
Axungiarum depuratio	167

B.

Balsamum Arcae	167
ophthalmicum rubrum	168
Benzoes flores	
Butyrum antimonii, s. stibii	168

C.

Calx antimonii sulphurata	169
salita	222
Candelulae saturninae, <i>vid.</i> Cerei medicati.	
Carbonas ammoniae, <i>vid.</i> Sal volat. salis ammon.	
magnesiae, <i>vid.</i> Magnesia aërata.	
potassae, <i>vid.</i> Ciner. clavell. depur.	
sodae, <i>vid.</i> Alkali minerale.	
Causticum antimoniale, <i>vid.</i> Butyr. antimon.	
lunare, <i>vid.</i> Lapis infernal.	
potentiale, <i>vid.</i> Alkali caust.	
Ceratum labiale	170
saturninum	171
Cerei medicati	171
Cineres clavellati depurati	171
Conserva acetosae	172
acetosellae	172
ceresfolii	172
cochleariae	172
hyssopi	172
melissae	172
menthae	172
nasturtii aquatici	172
rosarum rubrarum	172
Cremor tartari solubilis, <i>vid.</i> Tartar. boraxat.	
Crocus metallorum s. antimonii	186
Cuprum ammoniacale	173

D.

Decoctum album	173
hordei	173
Diachylon compositum, <i>vid.</i> Empl. gummos.	
Simplex, <i>vid.</i> Empl. Lithargyrii.	

E.

Electuarium anthelminticum	174
lenitivum e senna	174
theriaca	174
Eleosacchara	175
Elixir acidum	175
aurantii compositum	176
Emplastrum adhaesivum	178
anglicanum	176

	pag.
Emplastrum cantharidum, <i>vid.</i> Empl. vesicator.	
cicutae c. ammoniaco	177
citrinum	177
commune, <i>vid.</i> Emplastr. lithargyr.	
diachylon compositum	178
simplex	178
gummosum	178
lithargyrii	178
meliloti	178
mercuriale	179
saponatum	179
vesicatorium	180
Emulsio amygdalarum	181
purgans	181
Extractum absinthii	181
aconiti	183
cardui benedicti	182
centaurii minoris	182
chinae corticis	182
cicutae	182
daturae	182
flammulae jovis	182
gentianae	182
hyosciami	182
hippocastani corticis	182
lactucae virosae	182
liquiritiae	182
martis c. succo pomorum	183
nucum juglandum	183
pulsatillae nigricantis	183
quassiae	183
saturni, <i>vid.</i> Acetum saturni.	
taraxaci	183
turionum pini	183
F.	
Flores benzoës	184
salis ammoniaci martiales	185
zinci	185
H.	
Hepar antimonii	186
sulphuris	186
Hydragryrum, <i>vid.</i> Mercur. viv. depur.	

pag.

I.

Infusum rhei aquosum 187

K.

Kermes mineralis 187

L.

Lapis causticus, *vid.* Alkali causticum.

infernalis 188

Laudanum liquidum 188

Linimentum volatile 189

Liquamen salis tartari, *vid.* Oleum tart. per solut.

Liquor acetatus ammoniae, *vid.* Spirit. Minder.

potassae, *vid.* Liq. terrae fol. tart.

ammoniae purae, *vid.* Spiritus sal. ammon. caust.

anodynus mineralis 189

vegetabilis 190

carbonatis ammon. *vid.* Spirit. sal. ammon. simpl.

potassae *vid.* Ol. tart. per solution.

terrae foliatae tartari 190

Lixivium ammon. *vid.* Spirit. sal. ammon. caust.

causticum 190

saponarium, *vid.* Lixiv. caust.

M.

Magnesia aerata s. mitis 191

pura s. usta 192

Mel rosarum 192

Mercurius corrosivus albus, *vid.* Mercur. sublim. corrosiv.

ruber, *vid.* Merc. praecip. rub.

dulcis 193

praecipitatus albus 193

niger, *vid.* Mercur. solubil.

ruber 194

solubilis 194

sublimatus corrosivus 195

vivus depuratus 196

Mixtura antemetica 196

Murias ammoniac, *vid.* Sal ammoniac. depur.

barytae, *vid.* Terra pond. sal.

ferri ammoniac., *vid.* Flores sal. amm. martial.

hydrargyri corrosiv., *vid.* Mercur. sublim. corros.

Murias hydrargyri dulcis,	}	<i>vid.</i> Mercur. dulc.	pag.
praecipitatus,			
oxygenatus stibii, <i>vid.</i> Butyr. antimon.			
N.			
Naphtha aceti			197
vitrioli			197
purissima			197
Nitras argenti fusus, <i>vid.</i> lapis infernalis.			
potassae, <i>vid.</i> Nitr. depur.			
Nitrum depuratum			199
O.			
Oleum absynthii destillatum			199
amygdalarum			202
anisi			200
animale Dippelii			201
aurantiorum corticum			200
carvi seminum			200
caryophyllorum			200
chamomillae florum			200
cinamomi corticis			200
citri corticis			200
cornu cervi			201
rectificatum, <i>vid.</i> Ol. anim. Dippel.			201
foeniculi seminum			200
juniperi baccarum			200
lavendulae florum			200
lini sem.			202
macis			200
melissae e herba			200
menthae crispae e herba			200
piperitidis			200
nucis moschatae			200
origani			200
ricini			200
rorismarini anthos			200
rutae e herba cum summitatibus			200
sabinae e summitatibus			200
tanaceti florum			200
tartari per solutionem			203
terebinthinae			200
valerianae e radicibus			200

pag.

Oxydum hydrargyri nigrum, <i>vid.</i> Mercur. solub.	
Oxydum hydrargyri rubrum, <i>vid.</i> Merc. praecip. rub.	
ferri nigrum, <i>vid.</i> Aethiops martial.	
stibii sulphur. aurantiacum, <i>vid.</i> Sulph. aur. antim.	
rufum, <i>vid.</i> Kerm. miner.	
zinci, <i>vid.</i> Flores zinci.	

Oxymel aeruginis	203
colchici	204
scilliticum	203
simplex	204

Oxytartarus, *vid.* Terra fol. tart.

P.

Panacea Mercurialis, <i>vid.</i> Merc. dulc.	
Pasta de althaea	204
glycyrrhizae	205
Pilulae alterantes	205
Potassa pura, s. caustica, <i>vid.</i> Alkali caustic.	
Pulpa prunorum	206
tamarindorum	206
Pulvis alterans	206
carbonum	206
dentifricius	207
fumalis	207
nobilis	208
galactopocus	208
infantum	208
ipecacuanhae cum opio	208
moschi compositus	209
nitrosus temperans	209
ophthalmicus	210
stanni, <i>vid.</i> Stannum praep.	

R.

Resina jalappae	210
ligui guajaci	211
scammonii	211
Roob berberum	211
juniperi	211
oxycocci	211
ribium nigrarum	211
rubrarum	211
sambuci	211

	pag
S.	
Saccharum saturni	150
Sal ammoniac. martiale, <i>vid.</i> flores sal. ammon. mart.	
Sal ammoniacum depuratum	211
essentiale tartari, <i>vid.</i> Acid. tartari crystallisat.	
mirabile Glauberi	212
polychrestum Seignetti	212
volatile salis ammoniaci	214
Salsilago ammoniacalis, <i>vid.</i> Spirit. Minder.	
Sapo ammoniacalis, <i>vid.</i> Liniment. volat.	
medicatus	214
mercurialis	215
Soda acetata, <i>vid.</i> Terra fol. tart.	
tartarisata, <i>vid.</i> Sal polychr. Seignetti.	
vitriolata, <i>vid.</i> Sal mirab. Glauberi.	
Species emollientes	216
pectorales	216
pro decocto c. ligno guajaci	217
juniperi	217
sassafras	217
infuso theacformi	217
resolventes	217
Spiritus aurantiorum cort.	218
cochleariae	218
formicarum	219
frumenti depuratus	219
lavendulae	220
menthae	220
melissae	220
Rorismarini	220
Mindereri	220
nitri, <i>vid.</i> Acid. nitri tenue.	
fumans, <i>vid.</i> Acid. nitri concentrat.	
salis ammoniaci aquosus	221
causticus	221
c. calce paratus	221
succinatus	222
volatilis, vinosus	222
salis dulcis	223
fumans, <i>vid.</i> Acid. muriatic. concentr.	
saponis	224
vini camphoratus	225
dephlegmatissimus, <i>vid.</i> Alcohol vini alcoholisat.	

	p ^{ag.}
Spiritus rectificatissimus, <i>vid.</i> Alcohol vini.	
vinosus muriaticus	223
dulcis, <i>vid.</i> Liquor anod. miner.	
Stannum praeeparatum	224
Succus ad scorbuticos	225
liquiritiae, <i>vid.</i> Extract. liquirit.	
Sulphas potassae, <i>vid.</i> Tart. vitriolat.	
sodae, <i>vid.</i> Sal mirab. Glaub.	
Sulphur auratum antimonii	225
Sulphuretum hydrargyri, <i>vid.</i> Aethiops mineral.	
hydrargyri stibiatus, <i>vid.</i> Acthiops antimon.	
potassae, <i>vid.</i> Hepar sulphuris.	
Syrupus aceti	226
acetositis citri	226
allii	226
althaeae	227
aurantiorum cort.	227
Berberum	226
cinamomi	227
e manna	228
rhei	228
rubi idaei	226
violarum	228

T.

Tartarus antimonialis	229
boraxatus	230
emeticus	229
stibiatus	229
tartarisatus	230
vitriolatus acidus	231
Tartris potassae	230
sodae, <i>vid.</i> Sal polychr. Seignetti.	
Terra foliata tartari	231
crystallisata	232
ponderosa salita	232
Tinctura cantharidum	233
castorei	234
catechu	234
euphorbii	234
laccae aquosa	235
spirituosa	235
martis pomata	184

Tinctura myrrhae.	pag. 235
opii, <i>vid.</i> Laudanum liquid.	
salina composita	235
tonica martialis flava	236
Trochisci althaeae compositi	237
hecchici albi	237

U.

Unguentum althaeae	237
aegyptiacum, <i>vid.</i> Oxymel aerug.	
basilicum	238
citrinum, <i>vid.</i> Ungu. alth.	
contra scabiem	240
digestivum	238
elemi, <i>vid.</i> Balsam. Arcaei.	
griseum	238
mercuriale	238
nervinum	239
pomadinum	239
rosaceum	239
saturninum	240
sulphuris compositum	240

V.

Vinum antimoniale	240
Vitrum antimonii	241
ceratum	241

PHARMACOPOEA FENNICA.

*Cum gratia et privilegio Sacrae Imperialis
Majestatis.*

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

NORMAE PHARMACEUTICAE.

1. *Herba et folia* colligantur sub coelo sereno, proxime ante florescentiam. Siccentur celeriter sub umbra loco ventoso *Flores* legantur, quamprimum aperti sint. Siccentur ut herbae. *Radices* vegetabilium biennium perenniumque effodiantur primo vere; purgentur e pulvere humi, similiterque siccentur loco umbroso. Succosae radices in furno arescant.
 2. *Horrea* pro materiis vegetabilibus spatiosa sunt, sicca et ab aëre libero non seclusa. Substantiae quae *volatiles* foveant partes in vasis probe clausis conserventur, neque in antecessum maiore copia pulverentur, quam prout poposcerit usus quotidianus.
 3. In praeparatione pharmacum compositorum singulae *substantiae solidae*, post pulverationem seorsim ponderentur.
 4. *Extracta*, pauxillo alcoholis adpersa, in vasis terreis bene clausis loco frigido servantur.
 5. *Pilulae*, inprimis quae volatiles habent partes, conserventur in vasis probe obturatis, neque maiore quantitate parentur, quam quae brevi consumatur.
 6. *Alcholes, Tincturae, Aetheres, Aetherolea, Olea, Electuaria, Unguenta, Emplastra* conserventur in locis frigidis; *Syrupi, Vina et Aquae destillatae* in cellis subterraneis, et *Aquae* quidem in vasis terreis nonnisi papyro obtectis.
 7. *Resinae et Gummi-resinae* praeprimis hieme, frigidissima tempestate pulverentur.
 8. *Quantitates* materialium pondere, non vero mensura ut magis incerta, definiantur.
-

Typus ponderum.

Libra nostra pharmaceutica, eadem quae apud Germanos in usu est, continet 357,6639 Grammas Gallorum, 7443,997 Asses Belgicos vel Troicos, 0,84132 Libras victualium Svecicas, 0,87687 Libras Rossicas mercatorias.

Divisio ejus hoc modo in partes secta est ut contineat

	uncias.	drachm.	scrup.	grana.
Libra (℔j) s. grammæ	357,6639	12	96	288 - 5760.
Uncia (ʒj) s. gr.	29,805	-	-	8 - 24 - 480.
Drachma (ʒj)	5,7256	-	-	- 3 - 60.
Scrupulus (ʒ)	1,24	-	-	- - 20.
Granum (gr.j)	0,062.			

MATERIA PHARMACEUTICA.

ABSINTHIUM. Summitates.

Artemisia absinthium L.

ACETUM VINI GALLICUM.

ACETUM SICERAE.

ACIDUM VITRIOLI vulgo *Oleum vitrioli*.

Acidum sulphuricum.

ACONITUM. Folia.

Aconitum Neomontanum Willd. *Napellus* L.

Cammarum L. et *tauricum* L.

AERUGO sive *Viride aeris*.

Acetas supercupricus impurus.

ALCANNA. Radix.

Anchusa tinctoria L.

ALLIUM. Bulbus recens.

Allium sativum L.

ALOE. Succus foliorum inspissatus.

CAPENSIS.

SOCCOTRINA.

Aloë arborescens, mitraeformis et soccotrina

Decand.

ALTHAEA. Radix.

Althaea officinalis L.

ALUMEN CRUDUM.

Sulphas aluminae subpotassicus.

AMMONIACUM. Gummi-resina.

Ferula ferulago L.

AMYGDALAE. Nuclei.

Amarae.

Dulces.

Amygdalus communis L.

AMYLUM.

Triticum hibernum et turgidum L.

ANGELICA. Radix.

Angelica archangelica L.

ANGUSTURA. Cortex.

Bonplandia trifoliata Willd.

ANISUM. Semina.

Pimpinella anisum L.

ANISUM STELLATUM. Capsulae cum seminibus.

Illicium anisatum L.

ANTIMONIUM CRUDUM.

Sulphuretum stibii.

AQUA FORTIS.

Acidum nitricum impurum.

ARGENTUM FOLIATUM.

ARMORACIA. Radix recens.

Cochlearia armoracia L.

ARNICA. Flores. Radix.

Arnica montana L.

ARSENICUM ALBUM.

Acidum arsenicosum.

ASA FOETIDA. Gummi-resina.

Ferula asa foetida L.

AURANTIUM. Aetheroleum fructus, s. oleum

Bergamot. Cortex fructus ma-

turi siccatus. Flavedo s. epidermis corticis. Flores saliti s. fl. Naphae. Fructus immaturus s. pomum.

Citrus aurantium L.

AURUM FOLIATUM.

AXUNGIA PORCI s. *adeps suilla*.

Sus scrofa L.

BALSAMUM COPAIVAE BRASILIENSE.

Copaifera officinalis L.

BALSAMUM PERUVIANUM s. *indicum*.

Myroxylon peruiferum L.

BARDANA. Radix.

Arctium lappa et bardana Willd.

BELLADONNA. Folia. Radix.

Atropa belladonna L.

BENZOE. Resina.

Styrax benzoin Dryandri.

BERBERIS. Baccae. Succus baccarum.

Berberis vulgaris L.

BISTORTA. Radix.

Polygonum bistorta L.

BISMUTHUM s. *Marcasita*.

BOLUS ARMENIA.

Argilla cum oxido ferrico.

BORAX.

Borax supersodicus.

CACAO. Nuclei.

Theobroma cacao L.

CAJEPUT. Aetheroleum foliorum.

Melaleuca leucadendron L.

CALAMUS AROMATICUS. Radix.

Acorus calamus L.

CALX USTA.

CAMPHORA DEPURATA.

Laurus camphora L.

CANELLA ALBA. Cortex.

Canella alba Murray.

CANNABIS. Semina.

Cannabis sativa L.

CANTHARIDES.

Lytta vesicatoria Fabricii.

CARDAMOMUM MINUS. Capsulae cum seminibus.

Elettaria cardamomum Roscoe.

CARDUUS BENEDICTUS. Herba.

Centaurea benedicta L.

CAREX ARENARIA. Radix.

Carex arenaria L.

CARVUM. Semina.

Carum carvi L.

CARYOPHYLLATA. Radix.

Geum urbanum L.

CARYOPHYLLI. Flores nondum explicati.

Eugenia caryophyllata Thunb.

CASCARILLA. Cortex.

Croton eluteria Swartz.

CASTOREUM MOSCOVITICUM. Materia folliculis in confinio genitalium majoribus inclusa.

Castor fiber L.

CATECHU s. *Terra japonica*. Extractum
aquosum ligni et fructus induratum.
Acacia catechu Willd.

CEPA. Bulbus recens.

Allium cepa L.

CERA ALBA et FLAVA.

Apis mellifica L.

CERASUS. Drupae acidulae recentes et siccatae.
Prunus cerasus L.

CERUSSA.

Carbonas plumbicus.

CHAMOMILLA VULGARIS sive *Nostras*.
Flores.

Matricaria chamomilla L.

CHINA. Radix.

Smilax china L.

CINA s. *Santonicum*. Semina.

Artemisia judaica, vel santonica vel Contra L.

CINNABARIS FACTITIA.

Sulphuretum hydrargyri rubrum.

CINAMOMUM CEYLANICUM. Cortex interior.

Laurus cinamomum L.

CITRUS. Cortex fructus. Flavedo corticis.
Aetheroleum flavedinis s. oleum de
Cedro. Succus fructus.

Citrus medica L.

COCCINELLA.

Coccus cacti L.

COCHLEARIA. Herba recens.

Cochlearia officinalis L.

COLOCYNTHIS. Fructus.

Cucumis colocynthis L.

COLOPHONIUM. Resina.

Pinus abies et sylvestris L.

COLUMBO. Radix.

Menispermum palmatum Lamark.

CONIUM. Folia.

Conium maculatum L.

CORIANDRUM. Semina.

Coriandrum sativum L.

CORNU CERVI.

Cervus elaphus, Alces et Tarandus L.

CRETA ALBA.

Carbonas calcis.

CROCUS. Stigmata.

Crocus sativus L.

CUBEBAE. Semina.

Piper cubeba L.

CUPRUM.

CURCUMA. Radix.

Anomum curcuma Jacquini.

CYDONIA. Semina.

Pyrus cydonia L.

CYMINUM s. *Cuminum*. Semina.

Cuminum cyminum L.

DIGITALIS. Folia.

Digitalis purpurea L.

DULCAMARA. Stipites s. ramuli.

Solanum dulcamara L.

ENULA. Radix.

Inula helenium L.

EUPHORBIIUM, Gummi-resina.

Euphorbia officinarum L.

FABA PICHURIM. Semina.

Laurus pichurim Humboldt.

FEL TAURINUM RECENS.

Bos taurus L.

FERRUM. Limatura.

FICUS PASSAE s. *Caricae*. Receptacula car-
nosa.

Ficus carica L.

FILIX MAS. Radix.

Aspidium filix mas Swartz.

FOENICULUM. Semina.

Anethum foeniculum L.

FOENUM GRAECUM. Semina.

Trigonella foenum graecum L.

FRAXINUS. Cortex ramulorum.

Fraxinus excelsior L.

FUMARIA. Herba.

Fumaria officinalis L.

GALANGA. Radix.

Alpinia galanga Roscoe.

GALBANUM. Gummi-resina.

Bubon galbanum L.

GALLAE. Excrescentiae foliorum et petiolo-
rum a nidulantibus insectis exci-
tatae.

Quercus infectoria Olivieri.

GENTIANA RUBRA. Radix.

Gentiana lutea L.

GRAMEN. Radix.

Triticum repens L.

GRATIOLA. Herba.

Gratiola officinalis L.

GUAIACUM. Lignum. Resina.

Guaiacum officinale.

GUMMI ARABICUM.

Acacia vera Willd.

GUMMI GUTTA s. *Cambogia.* Gummi-resina.

Cambogia gutta L.

GUMMI TRAGACANTHA.

Astragalus creticus Lamark.

HELLEBORUS NIGER. Radix.

Helleborus niger L.

HIRUDINES VIVAE.

Hirudo medicinalis L.

HYDRARGYRUM.

HYOSCYAMUS. Folia.

Hyoscyamus niger L.

HYSSOPUS. Herba.

Hyssopus officinalis L.

JALAPPA. Radix.

Convolvulus jalappa L.

ICHTHYOCOLLA.

Accipenser huso et sturio L.

IPECACUANHA. Radix.

Psycotria emetica Mutis.

IRIS FLORENTINA. Radix.

Iris florentina L.

JUGLANS. Putamen drupae immaturae. Oleum nucleorum.

Juglans regia L.

JUNIPERUS. Baccae. Lignum.

Juniperus communis L.

KINKINA. Cortex flavus s. regius.

Cinchona cordifolia Mutis.

Cortex fuscus s. Peruvianus.

Cinchona officinalis L.

KINO s. *Gummi kino*. Materia concreta, fragilis, dubiae adhuc originis.

LAPIS CALAMINARIS.

Carbonas zincico-ferricus nativus.

LAVENDULA. Flores. Aetheroleum.

Lavandula spica L.

LAURUS. Baccae. Folia. Oleum baccarum.

Laurus nobilis L.

LEDUM s. *Rosmarinus sylvestris*. Summitates

Ledum palustre L.

LICHEN s. *Muscus islandicus*.

Cetraria islandica Acharii.

LIGNUM CAMPECHIANUM.

Haematoxylon campechianum L.

LINUM. Semina. Oleum.

Linum usitatissimum L.

LIQUIRITIA. Radix. Succus inspissatus.

Glycyrrhiza glabra et echinata L.

LITHARGYRIUM.

Oxidum plumbicum.

LUPULUS. Strobili.

Humulus lupulus L.

LYCOPODIUM. Farina s. pollen.

Lycopodium clavatum L.

MAGNESIA NIGRA.

Superoxidum manganicum nativum.

Codex medic. Europ. Sect. V. P. II.

S

MALVA. Folia.

Malva rotundifolia L.

MANNA. Succus concretus.

Fraxinus ornus et rotundifolia L.

MASTIX. Resina.

Pistacia lentiscus L.

MEL ALBUM et FUSCUM.

Apis mellifica L.

MELILOTUS. Herba cum floribus.

Trifolium melilotus officinalis L.

MELISSA CITRINA. Herba.

Melissa officinalis L.

MENTHA CRISPA. Herba.

Mentha crispa L.

MENTHA PIPERITIS. Herba.

Mentha piperita L.

MEZEREUM. Cortex.

Daphne mezereum L.

MILLEFOLIUM. Summitates.

Achillea millefolium L.

MINIUM.

Superoxydum plumbosum.

MOSCHUS. Materia folliculo subumbilicali inclusa

Moschus moschiferus L.

MYRRHA. Gummi-resina.

Amyris Kataf Forskahl.

MYRTILLUS. Baccae.

Vaccinium myrtillus L.

NICOTIANA. Folia.

Nicotiana tabacum L.

NITRUM CRUDUM.

Nitras potassae impurus.

NUX MOSCHATA. Nucleus. Oleum nuclei expressum s. oleum nucistae.
Involucrum nuclei s. macis.
Aetheroleum macis.

Myristica moschata L.

NUX VOMICA. Semina.

Strychnos nux vomica L.

OLIVA. Oleum drupae.

Olea Europaea L.

OPIUM. Succus capsularum inspissatus.

Papaver somniferum L.

ORIGANUM CRETICUM. Flores spicati. Aetheroleum.

Origanum Creticum L.

OSTREA. Testae.

Ostrea edulis L.

OVUM GALLINACEUM.

Phasianus Gallus L.

OXYCOCCOS. Succus baccarum.

Vaccinium Oxycoccos L.

PADUS. Cortex ramulorum.

Prunus Padus L.

PAPAVER. Capsulae immaturae.

Papaver somniferum L.

PASSULAE MAJORES, s. *uvae passae*. Baccae siccatae.

Vitis vinifera L.

PETROLEUM, s. *Oleum petrae*.

Aetheroleum bituminosum.

PETROSELINUM. Semina.

Apium Petroselinum L.

PHELLANDRIUM AQUATICUM. Semina.

Phellandrium aquaticum L.

PHOSPHORUS.

PIMPINELLA. Radix.

Pimpinella saxifraga L.

PINUS. Turiones.

Pinus sylvestris.

PIPER ALBUM. Baccae maturae decorticatae,

NIGRUM. Baccae immaturae.

Piper nigrum L.

PIPER HISPANICUM, s. *Indicum*. Fructus.

Capsicum annuum L.

PIPER JAMAICENSE Baccae immaturae.

Myrtus Pimenta L.

PIX LIQUIDA. Resina cum aetheroleo empyreumatico juncta.

SOLIDA. Resina ab aetheroleo empyreumatico per coctionem separata.

Pinus sylvestris L.

PLUMBAGO.

Supercarboretum ferri.

PLUMBUM.

POMPHOLYX s. *Nihilum album*.

Oxidum zincicum album impurum.

POTASSA VULGARIS s. *Cineres clavellati*.

Carbonas superpotassicus impurus.

PSYLLIUM. Semina.

Plantago Psyllium L.

QUASSIA. Lignum.

Quassia excelsa Swartz.

QUERCUS. Cortex. Glandes.

Quercus Robur L.

RHEUM s. *Rhabarbarum sibericum*. Radix.
Rheum palmatum L.

RIBES NIGRUM. Baccae. Folia tenerrima. Ramuli.
Ribes nigrum L.

RICINUS. Semina. Oleum.
Ricinus communis L.

ROSA DAMASCENA. Petala.
Rosa centifolia L.

ROSA RUBRA. Petala.
Rosa Gallica L.

ROSMARINUS s. *Anthos*. Folia. Aetheroleum.
Rosmarinus officinalis L.

RUBUS IDAEUS. Baccae.
Rubus idaeus L.

SABADILLA. Semina.
Veratrum Sabadilla L.

SABINA. Ramuli tenerrimi foliosi.
Juniperus Sabina L.

SACCHARUM Album.
Saccharum Officinarum L.

SACCHARUM LACTIS.
Bos Taurus L.

SACCHARUM SATURNI s. *Sal Saturni*.
Acetas plumbicus.

SAL ACETOSELLAE.
Oxalas subpotassicus.

SAL AMMONIACUM.
Murias ammoniacae.

SAL ANGLICUM s. *Catharticum*.
Sulphas magnesiae.

SAL COMMUNE.

Murias sodae.

SAL GLAUBERI.

Sulphas sodae.

SALEB. Radix.

Orchis Morio et mascula L.

SALIX. Cortex.

Salix fragilis L.

SALVIA. Folia.

Salvia officinalis L.

SAMBUCUS. Flores. Rob s. succus baccarum
inspissatus.

Sambucus nigra L.

SAPO HISPANICUS s. *Alicantinus.*

SAPO ROSSICUS.

SAPO VENETUS.

SAPONARIA. Radix.

Saponaria officinalis L.

SASSAPARILLA. Radix.

Smilax siphilitica Humboldt.

SASSAFRAS. Radix lignosa.

Laurus Sassafras L.

SCAMMONIUM ALEPPENSE. Gummi-resina.

Convolvulus Scammonia L.

SCILLA. Bulbi laminae siccatae.

Scilla maritima L.

SCORDIUM. Herba.

Teucrium Scordium L.

SENEGA. Radix.

Polygala Senega L.

SENNA. Folia.

Cassia Senna L.

SERPENTARIA VIRGINIANA. Radix.

Aristolochia Serpentaria L.

SEVUM BUBULUM.

Bos Taurus L.

SIMARUBA. Cortex radicis.

Quassia Simaruba L.

SINAPIS. Semina.

Sinapis nigra L.

SODA HISPANICA.

Carbonas supersodicus impurus.

SPATUM PONDEROSUM.

Sulphas Barytae.

SPERMA CETI s. *Cetaceum*. Pinguedo propriae indolis.

Physeter macrocephalus L.

SPIRITUS FRUMENTI.

Alcohol aquosus impurus grav. spec. 0,94.

SPIRITUS VINI GALLICUS.

Alcohol aquosus impurus grav. spec. 0,933.

SPONGIA.

Spongia officinalis L.

STANNUM.

STRAMONIUM. Folia.

Datura Stramonium L.

STYRAX CALAMITA. Resina.

Styrax officinalis L.

STYRAX s. *Ambra Liquida*. Balsamum.

Liquidambar Styraciflua L.

SUCCINUM.

SULPHUR CITRINUM SOLIDUM.

SULPHUR SUBLIMATUM PULVEREUM s.

Flores sulphuris.

SYRUPUS COMMUNIS.

Saccharum Officinarum L.

TAMARINDUS. Fructus.

Tamarindus Indica L.

TANACETUM. Summitates.

Tanacetum vulgare L.

TARAXACUM. Radix.

Leontodon Taraxacum L.

TARTARUS CRUDUS.

Tartras subpotassicus impurus,TARTARI CRYSTALLI s. *Cremor*.*Tartras subpotassicus depuratus*.

TEREBINTHINA COMMUNIS. Balsamum. Ae-

theroleum s. oleum

Terebinthinae.

Pinus sylvestris et *Abies* L.

TEREBINTHINA VENETA. Balsamum.

Pinus Larix L.

TORMENTILLA. Radix.

Tormentilla erecta L.

TRIFOLIUM AQUATICUM. Folia.

Menyanthes trifoliata L.TUTIA s. *Nihilum griseum*.*Oxidum zincicum impurum*.

VALERIANA MINOR Radix.

Valeriana officinalis L.

VANILLA. Capsulae siliquaeformes.

Vanilla aromatica Swartz.

VINUM GALLICUM ALBUM et RUBRUM.

VINUM HISPANICUM.

VINUM RHENANUM.

VIOLA TRICOLOR. Herba cum floribus.

Viola tricolor L.

VITRIOLUM ALBUM s. *Zinci*.

Sulphas zincicus.

VITRIOLUM COERULEUM s. *Cupri*.

Sulphas cupricus.

VITRIOLUM VIRIDE s. *Martis*.

Sulphas ferrosus.

ULMUS. Cortex interior.

Ulmus campestris L.

UVA URSI. Folia.

Arbutus uva ursi L.

ZEDOARIA. Radix.

Curcuma Zerumbet et *Zedoaria* Roscoe.

ZINCUM.

ZINGIBER. Radix.

Zingiber officinale Roscoe.

PRAEPARATA PHARMACEUTICA.

ACETAS AMMONIACAE AQUOSUS.

Alkali Ammoniacum acetatum.

Rc. Carbonatis superammoniacici

Uncias tres.

Acidi acetici Uncias undecim
vel quantum satis sit ad plenam saturationem,
Aquae destillatae Uncias novem
seu quantum sufficiat, ut pondus totius sit Un-
ciarum viginti et quatuor.

NB. Acetatis ammoniacae aquosi et
aquae destillatae partes aequales *spiritum*
olim dictum *Mindereri* efficiunt.

ACETAS PLUMBICUS CRYSTALLINUS.

Saccharum Saturni purificatum.

Sal Saturni depuratum.

Rc. Sacchari Saturni Partem unam,

Aquae destillatae ferventis Partes
quatuor,

Aceti destillati Partem unam

seu quantum sufficiat solutioni. Liquidum fervens per chartam cola, et loco temperato seponere, ut crystallos demittat. Liquor decantatus evaporatione ad dimidium consumatur, ut sub refrigeratione novas porrigat crystallos. Crystalli omnes collectae in charta bibula siccentur, tandemque in vitro clauso servantur.

ACETAS POTASSAE.

Alkali vegetabile acetatum.

Terra foliata tartari.

Rc. Carbonatis superpotassici depurati
quantum placeat.

In vase vitreo capaci admisce

Aceti destillati quantum sufficiat ad potassam saturandam.

Liquor super igne evaporet; intereaque per vices addatur acetum destillatum, ne desit saturatio. Ad dimidium exhalando consumtus per chartam coletur et tandem balnei vaporis calore ad siccitatem redigatur. Servetur in lagena clausa.

ACETAS POTASSAE AQUOSUS.

Mixtura salina (pauperum).

Rc. Carbonatis superpotassici Drachmas
novem,

Aceti sicerae quantum saturationi sufficiat,
Aquae fontanae, quantum satis sit, ut
totius mixti pondus fiat
Libra una et dimidia.

Misce et per chartam cola.

ACETAS SUPERPLUMBICUS AQUOSUS.

Acetum lithargyrii.

Acetum saturni.

Rc. Lithargyrii triti Partem unam,

Aceti sicerae Partes sex.

Mixtum in calore ebullitionis subinde agita, donec chartae lacmusinae color caeruleus ab aceto non mutetur. Liquor, post subsidentiam pulveris non soluti, limpidus evaporet, ut pondus specificum 1,14 obtineat.

ACETUM AROMATICUM.

Acetum prophylacticum.

Rc. Absinthii summitatum,

Millefolii summitatum,

Menthae Piperitidis herbae,

Lavendulae florum,

Caryophyllorum,

Zingiberis radicis, singulorum Drachmas quatuor,

Aceti vini gallici, ad ebullitionem calefacti, Libras septem cum dimidia,

Acidi acetici Libram dimidiam.

Macerentur per quatuor dies. Humor deinde expressus lactis recentis ope clarificetur et per chartam coletur. Tandem addantur

Spiritus rosmarini Unciae quatuor.

ACETUM DESTILLATUM.

Rc. Aceti sicerae Partes octo,

Carbonis lignei praeparati Partem unam. Destillent in vase aeneo, cui adaptatum sit capitellum stanneum cum tubulo refrigeratorio stanneo. Postquam emanaverit quarta circiter liquidi pars aquosa, applicetur vas recipiens, et continuetur destillatio, quamdiu limpidus sine empyreumate prodeat liquor, qui servetur.

ACETUM SCILLAE.

Rc. Scillae bulbi concisi Partem unam,
Aceti vini gallici, antea ad ebullitionem calefacti, Partes undecim.

Acidi acetici Partem unam.

Macerentur per octiduum. Deinde exprimatur humor, defaecetur et coletur.

ACIDUM ACETICUM.

Rc. Carbonatis superpotassici puri Uncias sedecim,

Aceti destillati quantitatem saturationi sufficientem.

Liquor evaporando diminuatur, ut remaneant Unciae quadraginta. His admisce

Acidi vitrioli Libram unam cum

Aquae Libram dilutam.

Fiat, e retorta vitrea, destillatio ad siccitatem, cave vero, ne ex igne ad finem nimis aucto acidum oriatur empyreumaticum.

ACIDUM CITRICUM.

Rc. Citri succi, e muco per quietem deposito purgati, quantum placeat.

Calefacto, in vase stanneo aut vitreo capaci, ut tantum non ebulliat, injice parvas portiones

Carbonatis calcis praeparati, accurate ponderati, (quo ex pondere pulveris residui innotescat, quantum ejus consumtum fuerit), donec omnis effervescentia cesset. Citratem calcis in fundo vasis considentem, defuso liquore claro, aqua calida saepius ablue, donec haec insipida evadat. Pulveri adhuc humido adde

Acidi vitrioli Pondus aequale carbonati
adsumto, cum

Aquae destillatae decuplo dilutum.

Digerentur per nycthemeron. Tum liquor acidus coletur, et modico igne ad remanentiam quartae partis evaporet. Hic deinde, ex sulphate calcis iterum turbidus, coletur, et in loco frigido separatur, ut, sub lentissima evaporatione, crystalli acidae concrevant. Depurentur crystalli per repetitam solutionem in aqua fervida, ex qua per evaporationem secernantur. Deinde in usum servantur.

Obs. Crystalli purae siccitatem in aëre servant:
ex acido sulphurico inquinatae, madesunt.

ACIDUM MURIATICUM.

Acidum salis communis.

Rc. Acidi vitrioli Libram unam,

Aquae Libram dimidiam,

caute in retorta vitrea commixtis adde

Salis communis pulverati Libram unam

et dimidiam; mox applicetur excipulum conve-
nienter tubulatum, in quod prius immissa fuit

Aquae destillatae Libra una.

Modico igne fiat destillatio, qua obtinebitur aci-
dum ponderis specifici 1,15.

ACIDUM NITRICUM DILUTUM.

Rc. Nitratis potassae depurati Partes duas,

Aquae destillatae ferventis Partes quatuor.

Fiat vi ignis solutio in vase vitreo, et instilletur

Nitras argenticus solutus, quamdiu prae-
cipitati quid prodeat. Liquor supernatans limpi-
dus; etiamnum fervens immittatur in retortam vi-
tream, per infundibulum cauda elongata instru-
ctum. Admisceatur

Acidi vitrioli Pars una.

Adaptato excipulo capaci tubulato fiat destillatio.

ACIDUM NITROSO-NITRICUM.

Acidum nitri fumans.

Rc. Nitratis potassae depurati Partes duas,

Acidi vitrioli Partem unam.

Nitratem siccatum immitte in retortam vitream
amplam. Sensim deinde et caute sub camino
affunde acidum vitrioli, ut noxii evitentur vapo-
res. Mox applicetur excipulum amplum tubula-
tum, et igne gradatim aucto fiat destillatio. Aci-
dum ita obtentum servetur in vase vitreo, episto-
mio vitreo clauso, idque loco frigido et um-
broso. Ponderus ejus specificum erit 1,5.

ACIDUM PHOSPHORICUM AQUOSUM.

Rc. Acidi nitrici diluti Partes duodecim,
cui in cucurbita vitrea, super igne, leniter ebulli-
lienti sensim immitte ex

Phosphoro in fragmenta unius circiter gra-
ni conciso Partem unam, sive
quantum absumere valeat liquor, qui dein ad
crassitudinem syrupi evaporet. Hunc

Aqua destillata dilue, ut quantitatem
phosphori consumti decies superet.

ACIDUM SUCCINICUM.

Sal succini.

Rc. Succini contusi quantum placeat.

Immittatur in retortam vitream, cui adapte-
tur vas recipiens tubulatum. Igne primum lento,
deinde paulatim aucto destillet liquor acidus, et
oleum empyreumaticum mox flavum, tum rubrum,
simulac in collo retortae concrecant crystalli. Hae
ab aqua acida excipuli solutae et per chartam aqua
destillata humectatam colatae, lenta evaporatione
ad siccitatem redigantur, tandemque depurentur
per sublimationem lenissimo igne in cucurbita
vitrea peragendam.

ACIDUM SULPHURICUM DEPURATUM.

Rc. Acidi vitrioli Uncias sex,
quas in retortam vitream immissas calore ignis
sensim crescente torque, donec striae cohaerentes
ad latera colli retortae conspiciantur. Tum adap-

tato excipulo caute augeatur ignis, ut purum acidum destillet. Hoc in vase vitreo per epistomium vitreum claudendo servetur.

ACIDUM SULPHURICUM DILUTUM.

Acidum vitrioli tenue.

Rc. Acidi sulphurici depurati Partem unam,
Aquae destillatae Partes octo.
Acidum in aquam instilla et commisce.

ACIDUM TARTARICUM.

Sal essentielle tartari.

Rc. Carbonatis calcis praeparati Libras
duas,
Aquae ferventis Libras viginti et quatuor.
Sub ebullitione in lebetes, stanno intus obducto,
sensim adde

Tartari crystallorum pulveratarum Li-
bras septem et dimidiam, sive donec
cessaverit effervescentia. Vas ab igne remotum
seponé per horam. Deinde liquorem super tar-
tratis calcis pulvere natantem caute defunde. Pul-
verem aqua calida saepius ablue. Eidem in vas
vitreum indito admisce

Acidi vitrioli Libras duas,

Aquae decupla quantitate dilutas.

Mixtum digere per horas viginti quatuor, inter-
aque spatula lignea saepius agita. E pulvere
deinde subsiduo defunde liquorem acidum limpi-
um, pulveremque aqua ablue quamdiu haec

gustatu fiat acida. Commisceantur omnes liquores acidi et evaporatione coarctentur ad tertiam voluminis sui partem. Refrigerati deinde colentur et leni calore evaporent. Cuticulae crystallinae in superficie subortae saepius rumpantur, ut tandem nonnisi siccae remaneant crystalli.

Obs. Explorandum est, utrum ab inquinamento acidi sulphurici immunes sint crystalli. Itaque solvatur harum portiuncula in aqua, et addantur nonnullae guttae acetatis superplumbici liquidi, ex quibus mox album subsidet praecipitatum, ab instillato acido nitrico diluto facile solvendum, si purum erat acidum tartaricum, lacteam vero etiamnum efficiens mixturam, si adsit acidum sulphuricum. Ad hoc vitium amovendum, solvantur crystalli in aqua destillata, admisceatur solutioni pauxillum tartratis calcis, aut, nisi hic praesto sit, carbonatis calcis: digeratur mixtum, coletur et ad crystallos iterum redigatur.

AETHER ACETICUS.

Rc. Sacchari Saturni siccati Partes quadraginta,

Alcoholis Partes viginti,

Acidi vitrioli Partes quindecim.

Saccharo saturni pulverato, in cucurbita vitrea admisceatur alcohol cum acido mixtus. Adaptato capitello et excipulo scite adjuncto fiat destillatio leni calore donec fere omnis secretus sit humor. Liquor in excipulo collectus misceatur cum

Aquae Partibus sex, et

Potassae causticae aquosae Partibus
duabus.

Supernatans aether separatus lenissimo igne e re-
torta rectificetur.

AETHER AMMONICATUS.

Rc. Muriatis ammoniacae depurati,

Aquae destillatae, singulorum Uncias
duas.

In retorta mixtis adde

Calcis vivae Uncias duas, aqua antea ex-
stinctas,

Aetheris sulphurici Uncias duas.

Adaptetur vas recipiens amplum, quod aqua fri-
gida circumdetur. Destillando eliciatur aether;
qui servetur in lagena vitrea epistomio vitreo ex-
acte obturanda.

AETHER FERRATUS.

Aether martialis.

Rc. Muriatis ferrici Unciam unam,

Aquae destillatae Unciam dimidiam.

Mixta agitentur cum

Aetheris sulphurici Unciis tribus.

Post quidem viginti quatuor horarum transfun-
detur solutio limpida in aliud vas bene obturan-
dum et loco obscuro servandum.

AETHER SULPHURICUS.

Aether vitriolatus.

Rc. Alcoholis,

Acidi vitrioli Partes aequales.

Alcholem in cucurbitam vitream vel retortam tubulatam immitte. Eidem per infundibulum tubulo subtili terminatum caute admisce acidum vitrioli, vas interea agitando. Deinde balneo arenae prius calefacto imponatur vas excipulo amplo munitum. Augeatur ignis ut liquor protinus ebulliat: mox vero minuatur ne vehementior sit ebullitio. Excipulum aqua frigida vel nive circumdetur, et finiatur destillatio, quando, loco striarum aetherearum, in collo vasis observantur guttae oleosae parum inter se cohaerentes. Aether destillatus cum quarta parte aquae et parte duodecima potassae causticae solutae mixtis conquassetur, quo ab inhaerentibus acido et alchole depuretur, tandemque lenissimo igne rectificetur. Servetur in lagenis minoribus, quarum orificia epistomiis vitreis et cera circumfusa obturentur.

Massa acida, post destillationem residua, cum dimidia parte Alcoholis mixta, nova destillatione adhuc producit aetherem, qui eodem modo pluries elici potest.

AETHEROLEUM ABSINTHII.

Rc. Absinthii summitatum quantum placeat,

Aquae fontanae, quantum satis sit, ut herba innatet. Modico igne destillent aqua et aetheroleum, quod separatum servetur.

Eodem modo eliciuntur

AETHEROLEUM ANISI,

ex Anisi seminibus;

AETHEROLEUM CARVI,

e Carvi seminibus;

AETHEROLEUM CARYOPHYLLI,

e Caryophyllis, antea per aliquot dies in aqua maceratis, deindeque, in vase humili, destillationi subjectis;

AETHEROLEUM CINNAMOMI,

e Cinnamomi ceylanici cortice, antea per aliquot dies in aqua macerato;

AETHEROLEUM FOENICULI,

e Foeniculi seminibus;

AETHEROLEUM JUNIPERI,

e Juniperi baccis;

AETHEROLEUM MENTHAE PIPERITIDIS,

e Menthae piperitidis herba;

AETHEROLEUM TANACETI,

e Tanacetii summitatibus.

AETHEROLEUM TEREBINTHINAE RECTIFICATUM.

Rc. Terebinthinae communis aetherolei

Partem unam,

Aquae fontanae Partes duas.

Fiat destillatio, quamdiu prodeat aetheroleum.

ALCOHOL.

Spiritus vini rectificatissimus.

Rc. Spiritus frumenti Partes duodecim,
Carbonis lignei praeparati Partem
unam

E vesica, per alembicum stanneum destillent partes sex. Ex his, nova destillatione eliciantur partes duae. Pondus specificum 0,83.

ALCOHOL ABSOLUTUS.

Rc. Alcoholis Partes tres,
Muriatis calcis igne siccati et pulverati
Partem unam.

Per destillationem e retorta vitrea, leni calore elice Partes duas. Pondus specificum 0,79.

ALCOHOL AETHEREUS FERRATUS.

Tinctura Bestuscheffi.

Rc. Aetheris ferrati Partem unam,
Alcoholis Partes duas.

Misceantur.

ALCOHOL AMMONIACATUS.

Alkali ammoniacum spirituosum.

Rc. Ammoniacae causticae aquosae Partem unam,

Alcoholis Partes tres.

Commisceantur.

ALCOHOL AQUOSUS.

Spiritus vini rectificatus.

Rc. Spiritus frumenti Partes duodecim,
Carbonis lignei praeparati Partem
unam.

Destillatione e vesica per alembicum stanneum
educantur Partes sex.

ALCOHOL CAMPHORATUS.

Spiritus vini camphoratus.

Rc. Alcoholis aquosi rectificati Uncias
sedecim,

Camphorae Unciam unam.

Misceantur, ut fiat solutio.

ALCOHOL FERRATUS.

Tinctura martis.

Rc. Muriatis ferrici Partem unam,

Alcoholis Partes sex.

Misceantur, ut fiat solutio.

ALCOHOL MURIATICO-AETHEREUS.

Spiritus salis dulcis.

Rc. Salis communis Uncias sedecim,

Magnesiae nigrae Uncias sex,

In retorta vitrea mixtis adde

Acidi vitrioli Uncias duodecim, cum

Alcoholis Unciis quadraginta et octo prius
conjunctas. Destillando eliciantur Unciae triginta
et sex.

ALCOHOL NITRICO-AETHEREUS.

Spiritus aethereus nitratus.

Rc. Alcoholis Libras duas.

In retorta vitrea capaci paullatim adde

Acidi nitroso-nitrici Libram dimidiam.

Per destillationem balnei vaporis calore eliciatur
Libra una et dimidia, quae iterata destillatione,
super

Calcis ustae Uncia una, depuretur.

ALCOHOL SULPHURICO-AETHEREUS.

Liquor anodynus mineralis Hoffmanni.

Spiritus aethereus vitriolatus.

Rc. Aetheris sulphurici Partem unam,

Alcoholis Partes duas.

Misce.

ALUMEN USTUM.

Alumen in patina ferrea comburatur, donec
spongiosum fiat.

AMMONIACA CAUSTICA AQUOSA.

Alkali ammoniacum causticum.

Rc. Calcis ustae Libram unam,

cui in vase ferreo admisce

Aquae Libram dimidiam.

Refrigeratum pulverem immitte in retortam vi-
tream capacem, atque adjice

Muriatis ammoniacae depurati pul-
verati Libram unam,

Aquae Libras duas.

Mox applicetur excipulum grande,

Aquae destillatae Libram unam continens.

Modico igne fiat destillatio. Pondus specificum liquoris in excipulo collecti erit 0,94.

AQUA ACETATIS SUPERPLUMBICI.

Aqua saturnina.

Rc. Aquae pluvialis Libras duas,

Spiritus frumenti Uncias duas,

Acetatis superplumbici Unciam dimidiam.

Commisceantur.

AQUA ACIDI CARBONICI.

Aqua aërata.

Aqua destillata et ad temperaturam glaciei refrigerata quassando saturetur cum gase acidi carbonici, quod, idoneo apparatu e pulvere spathi calcarei puri, vi acidi sulphurici diluti elicatum, ad aquam intronmittitur. Servetur in lagenis vitreis, quarum orificia subere optime obturata deorsum versus teneantur.

AQUA AURANTII.

Aqua naphae.

Rc. Aurantii florum salitorum Libras tres,

Aquae, quantum satis sit ad evitandum empyreuma. Destillatio eliciantur Librae sex.

AQUA CALCIS.

Rc. Calcis ustae Libram dimidiam,
cui sensim affunde

Aquae Libras octo.

Ebullitione, quae inde oritur, peracta et calce in pulverem divisa, agitetur mixtum et, ne accedat aër, claudatur. Subsidente pulvere non soluto, liquor limpidus transfundatur in lagenas, quae rite occlusae servantur.

AQUA CARBONATIS POTASSAE ACIDULA.

Aqua aërata alkalina.

Rc. Aquae destillatae Cantharum,
Carbonatis superpotassici Drachmas
tres.

Facta solutione saturetur aqua acidi carbonici et servetur, ut de aqua acidi carbonici praescriptum est.

AQUA CARBONATIS SODAE ACIDULA.

Rc. Aquae destillatae Cantharum,
Carbonatis supersodici, fatiscendo in
pulverem redacti, Drachmas tres.
Solutio saturetur acido carbonico et servetur
ut praecedens.

AQUA CERASI.

Rc. Cerasi druparum siccatarum, cum nucleis,
contusarum Libras viginti,
Aquae, quantum satis sit ad evitandum em-
pyreuma. Destillando eliciantur Librae triginta.

AQUA CINNAMOMI ALCOHOLICA.

Rc. Cinnamomi ceylanici corticis contusi
Libram unam,
Spiritus vini gallici Libras duas,
Aquae, quantum satis sit ad evitandum em-
pyreuma. Destillando eliciantur Librae sex.

AQUA DESTILLATA.

Rc. Aquae fontanae Partes quinquaginta,
Carbonis lignei praeparati Partem unam.
Destillando lente eliciantur Partes quadraginta et
quinque.

AQUA FOENICULI.

Rc. Foeniculi seminum Libram dimidiam
Aquae fontanae quantum satis sit, ut,
sine periculo empyreumatis, destillando, elici pos-
sint Librae sex.

AQUA HYDROSULPHURICA ACIDULA.

Liquor probatorius Hahnemanni.

Rc. Sulphureti calcis,
Acidi tartarici, utriusque Drachmas duas,
Aquae destillatae Uncias sedecim.
Mixta agitentur in vase vitreo. Cum deinde sub-
sederit tartras calcis, defundatur liquor limpidus
in aliud vas, et addatur
Acidi tartarici Uncia dimidia.
Servetur in lagenulis probe obturatis.

AQUA MENTHAE CRISPAE.

Rc. Menthae crispae herbae Libras quatuor,
Aquae, quantum satis sit, ut evitetur empy-
reuma. Destillando eliciantur Librae sex.

Eodem modo paratur

AQUA MENTHAE PIPERITIDIS.

e Menthae piperitidis herba.

AQUA MURIATIS HYDRARGYRICI CORRO-
SIVI.

Mixtura mercurialis.

Rc. Muriatis hydrargyrici corrosivi,
Salis ammoniaci, utriusque grana sex.

Terantur in mortario vitreo cum

Aquae destillatae ferventis Uncia una.
Deinde addantur

Aquae destillatae Unciae novem,
Syrupi sacchari Unciae duae.

AQUA OXYMURIATICA.

Acidum muriaticum oxygenatum.

Rc. Salis communis Partes quatuor,
Magnesiae nigrae pulveratae Partem
unam et dimidiam,

Acidi vitrioli Partes tres,

Aquae Partes quatuor.

Misceantur caute in retorta vitrea, et leni calore
extricetur gas, quod idoneo apparatu, ab

Aqua destillata in appositis lagenis ad

saturationem absorbeatur. Lagenae deinde epistomiis vitreis optime obturentur.

AQUA PETROSELINI.

Rc. Petroselini seminum Libram dimidiam,
Aquae fontanae, quantum satis sit, ut
destillando eliciantur Librae sex.

AQUA ROSAE.

Rc. Rosae damascenae petalorum Libras
tres,
Aquae, quantum satis sit, ut evitetur empy-
reuma. Destillando eliciantur Librae sex.

AQUA SULPHATIS MAGNESIAE CUM ACIDO CARBONICO.

Aqua amara.

Rc. Salis anglici Libram unam,
Aquae fontanae Cantharum dimidium.
Fiat solutio: cui colatae admisce
Aquae acidi carbonici Cantharum dimi-
dium.

Serva in lagenis vitreis, Libram circiter capienti-
bus, bene obturatis.

ARGENTUM PURUM.

Rc. Argenti quantum placeat.
Solve in
Acidi nitrici quantitate sufficiente.
Liquori paulatim adde

Sal commune in aqua solutum, ut deijciatur murias argenticus. Hic collectus et siccatus minutim injiciatur in crucibulum argillaceum, in quo liquefactum et ad albedinem ignitum est duplum pondus

Potassae vulgaris.

Ignis augeatur ad plenam argenti liquefactionem.

ARSENIS POTASSAE AQUOSA.

Rc. Arsenici albi,

Carbonatis superpotassici, utriusque
Grana sexaginta et quatuor,

Aquae destillatae Uncias sedecim.

Per coctionem in vase vitreo fiat solutio, cui collatae reddatur aqua sub coctione evaporata, ut habeatur liquor pondere sedecim unciarum.

AXUNGIA CURATA.

Axungia porci, membranulis, vasis et fibrillis exemptis, lavetur aqua, leni igne liquetur et post exhalationem humoris per linteam coletur.

AXUNGIA OXYGENATA.

Unguentum oxygenatum Alyoni.

Rc. Axungiae curatae Partes octo.

In vase fictili, ad modicum ignem liquatis adde

Acidi nitrici diluti Partem unam.

Evaporato, sub continua agitatione, humore, admisceantur

Aquae ferventis Partes octo,

quibus abluta exungia tandem balnei vaporis calore siccetur.

BOLUS PRAEPARATUS.

Bolum armenia cum copiosa aqua in mortario contere. Post tantillam quietem transfunde aquam ex pulvere tenuissimo turbidam in aliud vas Crassiorem pulverem residuum cum nova aqua tritum eodem modo tracta. Pulvis subtilissimus e liquoribus turbidis subsidens siccetur et servetur.

CALAMINA PRAEPARATA.

Lapis calaminaris praeparatus.

Fit e lapide calaminari eodem modo ac bolus praeparatus.

CALX PURA.

Fragmenta e testis ostrearum per aquam abluta, igne valido per horae spatium ad albedinem urantur. Servetur in vasis bene obturatis.

CARBO LIGNEUS PRAEPARATUS.

Carbones ligni cujusdam in crucibulo operto, per horae dimidium ad plenam ignitionem urantur. Refrigerentur in crucibulo adhuc tecto: deinde redigantur in pulverem, qui in vasis perclusis servetur.

CARBONAS CALCIS PRAEPARATUS.

Creta praeparata.

Creta alba, vel testae ostrearum in pulverem subtilissimum redigantur, ut de bolo praeparato praescriptum est.

CARBONAS MAGNESIAE.

Magnesia alba.

Rc. Salis anglici Partem unam et dimidiam,
quam solve in

Aquae calidae Partibus duodecim.

Solutioni per chartam colatae et super ignem
ebullienti admisceatur

Carbonatis superpotassici puri Pars
una, in

Aquae fervidae Partibus sex soluta et colata.
Liquor mixtus ebulliat per horae dimidium et ad-
huc fervidus per linteum coletur. Carbonas ma-
gnesiae in filtro collectus, affusa aqua fervida
eluat, tandemque loco calido servetur.

CARBONAS POTASSAE.

Carbonas superpotassicus purus, in
idoneo apparatu, gase acidi carbonici perfecte
saturetur, ut omnem acritudinem saporis amittat.

CARBONAS SODAE.

Rc. Carbonatis supersodici crystallini
Partem unam,

Ejusdem fatiscendo in pulverem redacti Partes
tres.

Trituratione intime commisceantur et, in appa-
ratu idoneo, acido carbonico perfecte saturantur.
His admisceantur

Aquae destillatae frigidae Partes tres,

quae post duodecim horas defundantur. Carbonas deinde super charta bibula siccetur.

Obs. Carbonas sodae rite paratus sub siccatione in pulverem non fatiscet. Quod si fieret, nova aqua frigida iterum abluatur necesse est.

CARBONAS SUPERAMMONIACICUS:

Alkali ammoniacum.

Rc. Salis ammoniaci Partem unam,

Gretae albae Partem unam et dimidiam.

Terantur in pulverem tenerrimum, siccantur et intime commisceantur. Deinde e retorta vitrea, vel potius ferrea, cui adaptatum est excipulum capax vitreum, igne sensim aucto, fiat sublimatio.

CARBONAS SUPERAMMONIACICUS AQUO- SUS.

Alkali ammoniacum aquosum.

Rc. Salis ammoniaci Libram dimidiam,

Potassae vulgaris Uncias novem.

Separatim pulveratis et in retorta vitrea mixtis adjiciatur

Aquae Libra una.

Modico igne fiat destillatio, ad siccitatem residui.

CARBONAS SUPERAMMONIACICUS PYR- OLEOSUS.

Sal cornu cervi.

Rc. Cornu cervi rasi (vel ossium purgatorum rasorum) quantum placeat.

Immitte in retortam ferream tubulatam, cui adaptatum est vas recipiens amplum tubulatum. Fiat destillatio igne sensim ad incandescentiam fere aucto. Prodibunt liquor alkalinus, pyroleum et sal volatile. Hoc cum carbonis lignei pulverati quarta parte commixtum immittatur in cucurbitam vitream alembico munitam, ibidemque de-nuo sublimetur.

**CARBONAS SUPERAMMONIACICUS PYR-
OLEOSO-AQUOSUS.**

Liquor cornu cervi alkalinus.

Liquor alkalinus sub destillatione cornu cervi rasi prodiens coletur per chartam bibulam humidam, ut ipsi adhaerentia sal et oleum separentur.

CARBONAS SUPERPOTASSICUS AQUOSUS.

Lixivium tartari.

Rc. Carbonatis superpotassici Partem
unam,

Aquae destillatae Partes duas.

Solutio in vase vitreo facta per chartam coletur.

CARBONAS SUPERPOTASSICUS DEPURATUS.

Alkali lignorum depuratum.

Rc. Potassae vulgaris in vase ferreo ignitae
Partem unam

Aquae frigidae Partem unam et dimidiam.

Mixta per triduum macerentur, loco frigido, interea saepius agitata. Subsidentibus deinde par-

tibus non solutis, decantetur liquor limpidus, qui in vase ferreo ad siccitatem evaporet.

CARBONAS SUPERPOTASSICUS PURUS.

Alkali tartari.

Tartari crystalli in vase ferreo urantur donec albescant. Residua massa alkalina in aqua solvatur, coletur et in olla ferrea ad siccitatem evaporet.

CARBONASSUPERSODICUS CRYSTALLINUS.

Alkali minerale fixum.

Rc. Sodae hispanicae contritae, quantum placeat,

Aquae fervidae, quantum satis sit ad solutionem. Lixivium per linteum colatum nonnihil evaporet. Deinde loco frigido seponatur, ut crystallos demittat.

CERATUM CETACEI ALBUM.

Unguentum album.

Rc. Olivarum olei Libram dimidiam,

Spermatis ceti Uncias tres,

Cerae albae Uncias duas et dimidiam.

Mixta liquescant et spathula lignea assidue agitentur, donec refrixerint.

CERATUM CETACEI RUBRUM.

Ceratum labiale.

Ceratum cetacei album tingatur alcannae radice.

CEREOLI.

Rc. Cerae flavae Uncias sex,
 Olivarum olei Unciam unam.

Misceantur et liquecant leni calore, ut evaporet humidum. Deinde ex massa ab igne remota, per telas tenuis immersas, fiant lege artis cerei laevigati forma et diametro variantes.

CITRAS POTASSAE AQUOSUS.

Mixtura salina.

Rc. Carbonatis superpotassici aquosi
 Drachmas novem,
 quibus instilla

Succi citri Libram dimidiam, vel quantum satis sit ad plenam saturationem.

Liquor deinde coletur, eique addatur.

Aquae, quantum opus sit, ut Libram efficiat mixtura.

Huic tandem admisce

Syrupi sacchari Unciam unam.

CONSERVA COCHLEARIAE.

Cochleariae herbae recenti minutim sectae et contusae admisceatur Sacchari albissimi par pondus.

Similiter parantur ex aliis herbis conservae.

DECOCTUM GUAIACI COMPOSITUM.

Decoctum lignorum.

Rc. Guaiaci ligni rasi Uncias tres,
 Juniperi ligni rasi Uncias duas,

Chinae radicis concisae Unciam unam,
 Aquae fontanae Libras duodecim.

Coque donec evaporaverit dimidium. Deinde adde
 Liquiritiae radicis concisae Unciam di-
 midiam.

Tandem cola.

DECOCTUM KINKINAE.

Rc. Kinkinae corticis recens contusi Unciam
 unam,

Aquae fontanae Uncias sedecim.

Coquantur in vase operto, usquequo remaneat
 Libra una, quae adhuc calida per linteum coletur.

ELAEOSACCHARUM CINNAMOMI.

Rc. Sacchari albissimi Unciam unam,

Aetherolei cinnamomi Guttas sedecim.

Terendo commisceantur. Deinde in vase vitreo
 bene clauso servantur.

Similiter parantur elaeosacchara ex aliis aether-
 oleis.

ELECTUARIUM MANNAE.

Rc. Mannae,

Sacchari albissimi,

Aquae foeniculi, singulorum Uncias duas.

Mixta et soluta per linteum exprime. Deinde
 admisce

Iridis florentinae radicis subtiliter pul-
 veratae Drachmiam unam,

Amygdalarum olei recentis Unciam unam.

ELECTUARIUM SENNAE.

Rc. Sennae foliorum pulveratorum Uncias
 quatuor,
 Tamarindi pulpae Libram unam,
 Coriandri seminum pulveratorum Un-
 ciam dimidiam,
 Syrupi sacchari Uncias octo,
 Misceantur.

EMPLASTRUM ADHAESIVUM.

Rc. Olivarum olei Libras duas,
 Lithargyri triti Libram unam,
 Cerussae Uncias quatuor.
 Coque modico igne, sub continua agitatione, et
 subinde instilla aquam ferventem. Cum obtinea-
 tur emplastri spissitudo, immisce
 Cerae flavae Uncias octo,
 Terebinthinae communis Uncias duas.

EMPLASTUM AMMONIACO-GALBANICUM.

Emplastrum gummosum.

Rc. Emplastri oxidi plumbici Libram di-
 midiam,
 Cerae flavae Unciam unam.
 Liquefactis et ab igne remotis insperge et com-
 misce
 Gummi ammoniaci pulverati,
 Galbani pulverati, utriusque Unciam
 unam.

EMPLASTRUM ASAE FOETIDAE COMPOSITUM.

Emplastrum foetidum.

Rc. Cerae flavae Uncias quatuor,
 Olivarum olei Unciam unam,
 Colophonii Unciam dimidiam.

Una liquefactis et ab igne remotis admisce
 Asae foetidae pulveratae,
 Galbani pulverati, utriusque Uncias duas.

EMPLASTRUM CANTHARIDUM.

Rc. Cerae flavae Uncias decem,
 Terebinthinae communis,
 Olivarum olei, utriusque Uncias tres.

Liquefactis, sub agitatione continua, admisce
 Cantharidum contritarum Uncias sex.

Post lenem, per horulam, digestionem ab igne
 removeatur vas, et agitetur emplastrum usque ad
 refrigerationem.

EMPLASTRUM CERAE TEREBINTHINATUM.

Emplastrum citrinum.

Rc. Cerae flavae Libram unam,
 Colophonii Libram dimidiam,
 Sevi curati Uncias quatuor,
 Olivarum olei,
 Terebinthinae communis, utriusque
 Uncias duas,
 Curcumae radiceis pulveratae Drachmas
 duas.

Una liquentur, colentur et in capsulis chartaceis refrigerentur.

EMPLASTRUM DIGITALIS.

Rc. Cerae flavae Libram unam,

Celophonii

Olivarum olei, utriusque Libram dimidiam.

Colliquatis et nonnihil refrigeratis admisce

Digitalis foliorum pulveratorum Libram unam.

EMPLASTRUM HYDRARGYRI.

Emplastrum mercuriale.

Rc. Hydrargyri Unciam unam,

Terebinthinae venetae Drachmas duas.

Terantur in mortario ferreo vel vitreo, donec intime mixta sint. Tum addantur

Emplastri oxidi plumbici Unciis duabus,

Cerae flavae Unciae dimidiaae,
antea liquatis et commixtis.

EMPLASTRUM MELILOTI.

Paratur ex Meliloti herba siccata, ut emplastrum digitalis.

EMPLASTRUM OXIDI PLUMBICI,

Emplastrum commune.

Rc. Olivarum olei Libras sex,

Lithargyrii Libras octo.

Modico igne coque, intereaque continue agita, et aquam ferventem subinde et caute instilla, donec fiat emplastrum.

EMPLASTRUM PICIS.

Rc. Colophonii Libras duas,
 Picis solidae Uncias sedecim,
 Cerae flavae Uncias octo,
 Terebinthinae communis Uncias quatuor.

Mixta et leni igne liquata colentur, et in capsulis chartaceis oleo unctis refrigerentur.

EMPLASTRUM VIRIDE.

Rc. Emplastri cerae terebinthinati Libras duas,
 cui liquefacto admisce
 Aeruginis tritae Drachmas sex.

EMPLASTRUM ZINCICO PLUMBOSUM.

Emplastrum diapompholigos.

Rc. Cerae flavae Libram unam,
 Olivarum olei Libram dimidiam.
 Colliquatis subige
 Oxidi plumbosi Libram dimidiam,
 Cerussae tritae Uncias quatuor,
 Pompholigos Uncias tres,
 Olibani pulverati Unciam unam et dimidiam.

EMULSIO AMYGDALARUM.

Emulsio communis.

Rc. Amygdalarum dulcium excorticatarum
Unciam unam et dimidiam.

In mortario contunde, et insimul sensim adde
Aquae fontanae quantum satis sit, ut
fiat colaturae Libra una. Huic adde
Sacchari albissimi Drachmas tres.

EMULSIO GUAJACI.

Rc. Guajaci resinae Unciam dimidiam,
Gummi arabici Drachmas duas,

Optime contritis sensim adde

Aquae menthae piperitidis Uncias
novem,

Sacchari albissimi Unciam unam et di-
midiam.

EMULSIO AMMONIACI.

Lac ammoniacum.

Rc. Gummi ammoniaci Unciam dimidiam,
Aquaementhae piperitidis Uncias octo.
Terantur in mortario vitreo, donec gummi am-
moniacum perfecte dilutum sit.

EMULSIO GUMMOSA.

Rc. Gummi arabici Unciam dimidiam, cui in
Aquaeferventis quantitate sufficiente solutae
adde

Emulsionis amygdalarum Libram unam.

EXTRACTUM ABSINTHII.

Re. Absinthii summitatum concisarum quantum placeat,

Aquae fontanae sextuplum pondus.

Vasi stanneo ingestae summitates perfundantur aqua fervida et coquantur per horae quadrantem. Deinde exprimetur liquor. Residuum coquetur cum nova aqua, quae itidem exprimendo coletur. Liquores mixti balnei vaporis calore exhalent ad justam crassitiem.

EXTRACTUM ACONITI.

Re. Aconiti folia recentia,

quae concisa, aqua irrorentur et in mortario lapideo contundantur. Succus inde expressus evaporet balnei vaporis calore, donec mellis crassitudinem acquirat. Tum admisceatur

Aconiti foliorum in pulverem subtilem tritorum Pars quarta.

EXTRACTUM CARDUI BENEDICTI.

Paratur e Cardui benedicti herba similiter ac extractum absinthii.

Eodem modo parantur:

EXTRACTUM CASCARILLAE,

e Cascarillae cortice;

EXTRACTUM CHAMOMILLAE,

e Chamomillae floribus.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS.

℞. Colcynthidis fructus e seminibus pur-
gati Uncias duas,
Aquae fontanae Libras duas.

Decoquantur modico igne ad evaporationem di-
midii. Liquor deinde colatus, balnei vaporis ca-
lore exhalet ad crassitudinem mellis.

EXTRACTUM CONII.

Paratur e Conii herba, ut extractum aconiti.

EXTRACTUM GENTIANAE.

Paratur e Gentianae radice, ut extractum ab-
sinthii.

EXTRACTUM HYOSCYAMI.

Paratur ex Hyoscyami foliis, ut extractum
aconiti.

EXTRACTUM JUGLANDIS.

Juglandis putamina cum tantillo aquae con-
tundantur in mortario lapideo. Liquor inde ex-
pressus paullatim et caute, ut evitetur empyreu-
ma, evaporet ad justam crassitiem.

EXTRACTUM KINKINAE.

Paratur e Kinkinae cortice, ut extractum ab-
sinthii.

EXTRACTUM NICOTIANAE.

Paratur e Nicotianae foliis recentibus eodem
modo ac extractum aconiti.

EXTRACTUM STRAMONII.

Paratur eodem modo e Stramonii foliis.

EXTRACTUM TARAXACI.

Paratur e Taraxaci radice siccata, ut extractum absinthii.

Pari modo parantur

EXTRACTUM TRIFOLII AQUATICI,
e Trifolii aquatici foliis;

EXTRACTUM VIOLAE TRICOLORIS,
e Violae tricoloris herba.

HYDRARGYRUM PURUM.

Rc. Hydrargyri Libras tres,
Sulphuris Unciam unam.

Immittantur in retortam vitream, et, applicato recipiente, qua partem, aqua impleto, fiat destillatio.

HYDROSULPHURETUM AMMONIACAE
AQUOSUM.

Spiritus sulphuris Beguini.

Rc. Calcis ustae pulveratae Uncias tres,
Salis ammoniaci Uncias duas,
Sulphuris Unciam unam.

Mixta, igne sensim aucto destillent e retorta vitrea, cui scite adaptatum est vas recipiens amplum, continens

Aquae destillatae Uncias tres.

HYDROSULPHURETUM STIBIOSUM.

Kermes minerale.

℞. Antimonii crudi pulverati Libras duas,
 Carbonatis superpotassici pulverati
 Libram unam.

Mixta liquefiant vi ignis moderati in crucibulo tecto, deindeque effundantur. Massa refrigerata pulveretur et injiciatur in aquam fervidam; quae spathula lignea continuo agitata per horae quadrantem ebulliat. Liquor, fervidus adhuc, coletur, et in vase operto refrigeretur. Praecipitatum inibi natum filtro separetur, et liquor, addita tanta aquae copia, quanta evaporando absumpta fuit, iterum super antimonium non solutum, per horae quadrantem ebulliat, coletur et refrigescat. Eadem operatio bis terve repetatur. Praecipitata in unum collecta, rubro-fusca et tenera abluantur aqua tepida, loco umbroso siccentur et servantur.

HYDROSULPHURETUM STIBIOSUM CUM
SULPHURE.*Sulphur auratum antimonii.*

℞. Antimonii crudi Uncias duas,
 Sulphuris Uncias tres,
 Carbonatis superpotassici Uncias sex.

Pulverata et mixta liquefiant in crucibulo ignito, effundantur et refrigerata pulverentur. Solvantur deinde a sufficiente aquae quantitate, per ebullitionem in vase ferreo. Solutioni colatae addantur

Acidum sulphuricum dilutum, quantum satis sit ad plenam praecipitationem.

Praecipitatum aqua calida abluatur, in filtro colligatur et loco umbroso siccetur.

INFUSUM KINKINAE CALIDUM.

Rc. Kinkinae corticis pulverati Uncias duas,
Aquae fontanae fervidae Libram unam et
dimidiam.

Macerentur per horas tres in vase vitreo, agitentur subinde et tandem coletur liquidum.

INFUSUM KINKINAE FRIGIDUM.

Rc. Kinkinae corticis pulverati Uncias duas,
Conterantur cum

Aquae fontanae frigidae Libra una et
dimidia.

Macerentur per viginti quatuor horas loco temperato in vase vitreo. Colentur.

INFUSUM RHEI.

Rc. Rhabarbari Siberici contusi Uncias duas,
Carbonatis superpotassici depurati
Drachmam unam et dimidiam,

Aquae ferventis Libram unam et dimidiam.

Macerentur per duodecim horas in vase vitreo.
Deinde exprimendo colentur.

INFUSUM SENNAE.

Rc. Sennae foliorum Drachmas sex,
Aquae bullientis Libram dimidiam.

Macerentur per horam in vase vitreo, deindeque colentur.

LINCTUS OLEOSUS.

Rc. Gummi arabici pulverati Drachmas duas,
Aquae cerasi Unciam dimidiam.

In mortario trituras admisce

Amygdalarum olei recentis Drachmas sex,
Syrupi amygdalarum Unciam unam.

LINIMENTUM AMMONIACAE.

Linimentum e sale volatili.

Rc. Ammoniacae causticae aquosae quantum placeat,

Olivarum olei triplum pondus.

Quassando misceantur.

LINIMENTUM SAPONIS CAMPHORLITUM.

Linimentum saponaceum.

Rc. Spiritus millefolii compositi Libram unam,

Saponis albi hispanici rasi Uncias duas.

Digerantur, donec solutus sit sapo. Tum addatur

Camphorae Uncia dimidia.

MAGNESIA PURA.

Carbonas magnesia uratur in crucibulo tecto, ut per horam rubeat. Servetur in vase sollicitate clauso ne facultatem cum acidis effervescendi acquirat.

MEL DESPUMATUM.

Re. Mellis albi Libras sedecim,

Aquae fontanae Libras octo.

Sub coctione auferatur spuma ope cochlearis foraminibus parvis instructi. Solutio deinde per pannum colata inspissetur ad syrupi spissitudinem.

MEL ROSAE.

Re. Rosae rubrae petalorum siccatorum Libram dimidiam,

Aquae ferventis Libras tres.

Macerentur per duodecim horas. Liquori deindecolato admisceantur

Mellis optimi Librae sex.

MORSULI AROMATICI.

Re. Sacchari albissimi Libram dimidiam.
aque cum aquae tantillo, donec gutta aëri exposita mox indurescat. Tum adjice

Amygdalarum dulcium decorticatarum
et minutim concisarum Unciam unam et dimidiam.

Aurantii flavedinis concisae Drachmas
sex,

Cinnamomi ceylanici corticis pulverati Unciam dimidiam,

Zingiberis radice pulveratae Scrupulum
unum.

Sunt morsuli.

MUCILAGO GUMMI ARABICI.

Rc. Gummi arabici pulverati Partem unam,
Aquae fontanae Partes duas.

In mortario vitreo teratur gummi cum aqua paulatim instillata, donec in mucilaginem abeat.

MUCILAGO LICHENIS ISLANDICI.

Gelatina lichenis islandici.

Rc. Lichenis islandici concisi Libram unam
Aquae fontanae Libras viginti.

Coquantur in vase tecto donec solutum fuerit lichen, et liquoris remanserint Librae sex, quae per linteam fortiter exprimendo colatae seponantur loco frigido, ut gelatinae formam acquirant.

MURIAS AMMONIACAE DEPURATUS.

Sal ammoniacum solvatur in sufficiente aqua calidae quantitate. Solutio per chartam coletur in vase vitreo ad siccitatem evaporet.

MURIAS AMMONIACAE FERRICUS.

Sal ammoniacum martiale.

Rc. Muriatis ferri Partem unam,
Salis ammoniaci Partes sex.

Solvantur in

Aquae destillatae sufficiente quantitate.
Solutio sub continua agitatione in vase vitreo ad siccitatem evaporet.

MURIAS AMMONIACAE SUPERHYDRARGY-
RICUS.

Mercurius praecipitatus albus.

Rc. Muriatis hydrargyrici corrosivi,
Salis ammoniaci depurati, utriusque Par-
tem unam.

Solvantur in

Aquae destillatae Partibus octo.

Solutioni addatur

Carbonatis superpotassici aquosi,
quantum praecipitationi sufficiat.

Defuso liquore, praecipitatum aqua calida diligen-
ter abluatur, siccetur et servetur.

MURIAS BARYTAE.

Terra ponderosa salita.

Rc. Spathi ponderosi Partes tres,

Hordei farinae Partem unam.

Ante commixta in crucibulo urantur ut farina
carbonescat. Deinde in crucibulum carbonum
pulvere intus oblitum immittantur, et carbonum
pulvere largiter obtegantur, atque sub tegmine
inoris crucibuli igne valido per horae spatium
urantur. Sulphuretum barytae sic ortum cum

Acido muriatico, decupla aquae quan-
tate diluto, digeratur. Solutio sic producta, per
chartam colata evaporet ad siccitatem. Massa
residua salina in crucibulo per horae quadrantem ad
bedinem uratur, deindeque in aqua fervida sol-
vitur. Solutio adhuc fervida per chartam cole-

tur et loco frigidus crystallos deponat. Liqueor e crystallis decantatus repetita evaporatione novam praebebit salis crystallini copiam.

MURIAS CALCIS.

Calx salita.

Massa, post distillationem ammoniacae causticae aquosae aut carbonatis superammoniacici, residuum misceatur cum duplo pondere aquae fervidae, addita portiuncula acidi muriatici. Solutio indurata acido muriatico plane saturetur, coletur et ad siccitatem evaporet. Servetur in vasis bene obturatis.

MURIAS FERRICUS.

Acidum muriaticum cum sufficiente quantitate oxidi ferrici in phiala vitrea digeratur donec saturatum sit. Solutio rubicunda coletur et ad spissitudinem extracti caute evaporet. Servetur in vase vitreo probe obturato.

MURIAS HYDRARGYRICUS CORROSIVUS.

Hydrargyrus corrosivus albus.

Rc. Hydrargyri puri Libram dimidiam,

Acidi vitrioli Uncias octo.

Coquantur in vase vitreo ad siccitatem. Massa sicca pulveretur et misceatur cum

Salis communis pulverati et siccati Unciis novem

Mixtum immittatur in cucurbitam vitream, cujus nonnisi tertiam partem repleat. Calore gradatim

aucto fiat sublimatio. Sublimatum crystallinum album e superiore cucurbitae parte desumtum ab immunditiis adhaerentibus purgetur et servetur.

MURIAS HYDRARGYROSUS MITIS.

Hydrargyrus dulcis.

Calomel.

℞. Acidi nitrici Uncias duodecim,

Hydrargyri Uncias quindecim.

Digerantur in cucurbita vitrea, calore sensim ad ebullitionem aucto. Cum apparere cessant vapores rubicundi, pergat adhuc, per horulae spatium, ebullitio. Solutio limpida ab hydrargyro intacto caute decantata affundatur

Aquae fervidae Libris viginti,

in quibus antea solutae sint

Salis communis Unciae quatuordecim.

Liquor supernatans defundatur e pulvere praecipitato, qui aqua fervida copiose addita eluatur, donec haec nullum acquirat saporem. Tandem in charta bibula colligatur et siccetur murias hydrargyrosus.

MURIAS STIBIOSUS.

Causticum antimoniale.

Butyrum antimonii.

℞. Salis communis Partes duas,

Oxidi stibiosi pulverati Partem unam.

Commixtis et retortae vitreae inditis adfunde

Acidi vitrioli Partem unam.

Excipulo adaptato fiat destillatio. Liquidum, quod sic obtinetur, limpidum servetur in lagena vitrea epistomio vitreo clausa.

NITRAS ARGENTI CRYSTALLINUS.

Argentum purum in Acido nitrico diluto solvatur. Solutio evaporata loco frigido deponatur crystallos in tenebris servandas.

NITRAS ARGENTI FUSUS.

Causticum lunare.

Nitras argenti crystallinus in crucibulo argenteo liquescat. Effundatur deinde in fistula ferri idoneas antea calefactas et sevi tantillo inunctas. Refrigerati bacilli servantur in vase vitreo clauso.

NITRAS POTASSAE DEPURATUS.

Nitrum purificatum.

Nitrum in vase ferreo leni igne liquetur. Refrigeratum pulveretur. Solvatur deinde vi caloris in triplo aquae pondere. Solutio ad pelliculam evaporata refrigescat sub agitatione. Crystalloae sic natae infundibulum colligantur, ut defluat liquor ipsis adhaerens. Abluantur pauxillum aquae frigidae et siccentur.

NITRAS SUPERBISMUTHICUS.

Magisterium bismuthi.

Rc. Acidi nitroso-nitrici,

Aquae destillatae, Partes aequales.

Commixtis paullatim adde

Bismuthi contusi quantum solvatur.;

Solutio colata instilletur

Aquae destillatae Partibus sexaginta
interea agitis. Praecipitatum desidens aqua ab-
luatur et siccetur.

OLEUM AMYGDALARUM.

Rc. Amygdalarum dulcium (non rancidarum)
quantum placeat.

In mortario contusas sacco linteo include, pre-
loque aqua fervente calefacto exprime oleum.

OLEUM CACAO.

Butyrum cacao.

Cacao nuclei, leni igne torrefacti corticibus
priventur. Deinde comminuti et sacco linteo
inclusi vaporibus aquae bullientis exponantur, ut per-
calescant. Tum prelo aqua fervente calefacto ex-
primatur oleum, quod, admixta aqua calida, ite-
rum leni calore liquatum per linteum trajiciatur
et refrigeratum servetur.

OLEUM LINI.

Exprimatur e Lini seminibus ut oleum amy-
gdalarum.

OLEUM LINI CAMPHORATUM.

Rc. Olei lini Unciam unam,

Camphorae Unciam dimidiam.

Misceantur ut fiat solutio.

OSSA USTA PRAEPARATA.

Cornu cervi ustum praeparatum.

Ossium, aut cornuum cervi frusta in furno urantur, donec penitus albescant. Deinde in pulverem subtilissimum redigantur eodem modo ac bolus praeparatus.

OXIDUM FERRICUM.

Ferrum in acido nitrico solvatur. Solutio ad siccitatem evaporet. Pulvis residuus aqua elotus sicceatur.

OXIDUM FERROSUM.

Aethiops martialis.

Rc. Oxidi ferrici quantum placeat,

Olivarum olei, quantum satis sit ad pulverem humectandum. Mixtum in retorta vitrea, igne ad candescentiam paullatim aucto, redigatur in massam nigram, quae subtilissime trita in vase clauso servetur.

OXIDUM HYDRARGYRICUM.

Hydrargyrus corrosivus ruber.

Hydrargyrus purus in acido nitrico, vi caloris ad saturationem solvatur. Solutionis, per evaporationem, ad siccitatem redactae Partes tres conterantur cum duabus Partibus hydrargyri puri, usque ad plenam hujus extinctionem. Massa mixta in crucibulum terreum immittatur, et, sub agitatione cum bacillo terreo, igne uratur, donec vaporem nitrosū emittere cesset et rubro colore niteat.

OXIDUM HYDRARGYROSUM.

Rc. Muriatis hydrargyrosi mitis pulverati

Partem unam,

immitte in lagenam vitream cum

Potassae causticae aquosae Partibus
tribus.

Mixtum in loco frigido maceretur et interdum
conquassetur, donec penitus niger sit pulvis, qui
deinde aqua frigida perfecte ablutus, loco tene-
broso super charta bibula siccetur.

OXIDUM PLUMBOSUM.

E superficie plumbi in patina aperta liquefacti
auferatur nascens inibi pellicula cinerea, quae
deinde cum aqua contrita elutrietur ab immixtis
plumbi granis, et siccetur.

OXIDUM STIBIOSUM.

Crocus antimonii elotus.

Rc. Antimonii crudi pulverati,

Nitri pulverati, Partes aequales.

Commixta in mortario ferreo detonent. Massa
refrigerata et contrita abluatur fervida aqua, do-
nec haec insipida fiat.

OXIDUM ZINCICUM.

Flores zinci.

Zinci frustula in crucibulum capax, inter pru-
nas candens et nonnihil inclinatum per vices in-
jiciantur, ut inflammentur. Oxidum sublimatum

album saepius eximatur, cum aqua misceatur et e partibus metallicis elutrietur. Siccetur.

OXYMEL.

Rc. Mellis optimi Libras duas,

Aceti vini gallici Libram unam.

Misceantur, vi caloris leniter ebulliant et per linteum colentur.

OXYMEL AERUGINIS.

Rc. Aeruginis tritae Uncias quinque,

Aceti vini gallici Uncias septem,

Mellis Uncias quatuordecim.

Coquantur super igne et spathula diligenter agitentur, donec unguenti crassitudinem habeant.

OXYMEL SCILLAE.

Rc. Mellis optimi Libras duas,

Aceti scillae Libram unam.

Mixta ebulliant et colentur.

PASTA ALTHAEAE.

Rc. Althaeae radice decorticatae et concisae
Libram dimidiam,

Aquae fervidae Libras octo.

Post digestionem viginti quatuor horarum coletur liquidum: cui deinde addantur

Gummi arabici,

Sacchari albissimi, utriusque Librae duae.

Mixtum sub agitatione decoquatur ad spissitudinem mellis. Tum ab igne remotum vehementius agitetur ut albescat: posteaque admisceantur

Albumina ovorum recentium viginti, in
spumam antea conquassata, et

Aquae aurantii Uncia una.

Massa in leni calore agitetur donec manibus non
adhaereat. Deinde formentur pastae pulvere
amyli conspergendae et loco calido exsiccandae.

PASTA AMYGDALARUM.

Pasta regia.

Rc. Amygdalarum dulcium decorticatarum
Libram unam,

Amygdalarum amararum decorticata-
rum Unciam dimidiam.

Mixta contunde in mortario lapideo, simulque
adsperge

Aquae aurantii quantitatem justam, ne
ex subacta

Sacchari albissimi Libra una, manibus
adhaereat massa.

PASTA LIQUIRITIAE.

Pasta glycyrrhizae.

Rc. Liquiritiae radice decorticatae Libram
unam.

Macerentur per duodecim horas. Infuso per lin-
teum colato admisceantur

Gummi arabici Librae tres,

Sacchari albissimi Librae duae et dimidia.

Liquor balnei vaporis calore evaporet, donec gutta
in superficie vitri frigidi gelatinae instar con-

crescat. Tum, remota pellicula, transfundatur massa in patellas, pauxillo olei amygdalarum illitas, et leni calore siccetur.

PHOSPHAS SODAE.

Soda phosphorata.

Rc. Ossium ustorum pulveratorum Partes tres,
Acidi vitrioli Partes duas,
Aquae fontanae Partes viginti.

Leniter ebulliant per bihorium in vase vitreo. Tum liquor acidus per linteum exprimatur et sulphas calcis residuus aqua abluatur. Liquoribus commixtis, evaporando ad volumen partium decem redactis iterumque colatis addatur

Carbonatis supersodici quantitas sufficiens ut nonnihil praevaleat basis alkalina.

Solutio per chartam colata evaporet, ut formentur crystalli, quae inter chartas bibulas celeriter siccatae, vase clauso servantur.

PILULAE CASTOREI COMPOSITAE.

Pilulae foetidae.

Rc. Asae foetidae pulveratae,
Castorei pulverati, utriusque Drachmam
unam et dimidiam.
Acidi succinici Drachmam dimidiam,
Pyrolei ossium rectificati Scrupulum
dimidium,
Tincturae myrrhae, quantum satis sit,
ut in massam cogi queant.
Formentur pilulae aequales centum et decem.

PILULAE COLOCYNTHIDIS COMPOSITAE.

Pilulae catharticae.

Re. Extracti colocynthidis Drachmas duas
et dimidiam,
Muriatis hydrargyrosi mitis Drach-
mam unam,
Resinae jalappae Scrupulos duos,
Caryophyllorum Scrupulum unum.

Pulverata commisceantur cum

Syrupo sacchari, quantum satis sit, ut
in massam cogantur. Formentur pilulae aequales
Centum triginta et quinque.

PILULAE MURIATIS HYDRARGYRICI.

Pilulae e mercurio corrossivo. albo.

Re. Muriatis hydrargyrici corrossivi,
Muriatis ammoniacae, utriusque scru-
pulum unum.

Solvantur in

Aquae destillatae quantitate sufficiente,
et adde

Sacchari albissimi pulverati Scrupulum
unum,

Panis tritici pulverati Drachmas duas.

Ex massa exactissime mixta fiant pilulae aequales
Centum et sexaginta, quae leni calore siccentur.

PILULAE SCAMMONII COMPOSITAE.

Re. Scammonii,

Muriatis hydrargyrosi mitis, utrius-
que Grana duodecim,

Gummi guttae Grana quinque,
 Syrupi communis, quantum sufficiat
 massae. Formentur pilulae aequales numero sex.

POTASSA CAUSTICA AQUOSA.

Lixivium saponariorum.

Rc. Carbonatis superpotassici depurati
 Libras duas,

Aquae fontanae Libras viginti,
 Quibus, facta in vase ferreo solutione, paulatim
 addantur

Calcis ustae pulveratae Librae tres.

Coquantur per horae quadrantem, intereaue spa-
 thula ferrea agitentur. Liquor deinde per lin-
 teum duplicatum coletur, et in vase ferreo tecto
 evaporet, ut obtineat pondus specificum 1,33.
 Servetur in lagenâ vitrea epistomio vitreo ob-
 turata.

POTASSA CAUSTICA FUSA.

Causticum salinum.

Potassa caustica aquosa, in olla ferrea ni-
 tida linteo cooperta, evaporando supra ignem
 minuatur, usque quo guttula refrigerata mox so-
 lidescat. Tum in crucibulum ferreum transfun-
 datur, ibique, vi caloris, privetur aqua superflua
 adhaerente, et liquata in fistulas ferreas injicia-
 tur. Post refrigerationem eximatur et servetur in
 vase vitreo obturato.

PULPA TAMARINDI.

Tamarindi fructus in aqua calida maceretur,

ut medulla deliquescat: quae deinde percolata balnei vaporis calore evaporet ad justam crassitudinem. Tum singulis ejus libris admisceatur.

Mellis optimi Uncia dimidia.

PULVIS AROMATICUS.

Rc. Cinnamomi ceylanici Partes duas,
Cardamomi minoris,
Zingiberis radicis, utriusque Partem
unam.
Seorsim pulveratae commisceantur.

PULVIS JALAPPAE COMPOSITUS.

Rc. Jalappae radicis,
Gentianae rubrae radicis utriusque
Unciam unam,
Zingiberis radicis Drachmas duas,
Salis anglici Uncias duas.
Seorsim pulverata misceantur.

PULVIS IPECACUANHAE OPIATUS.

Pulvis alexiterius.

Pulvis Doweri.

Rc. Ipecacuanhae radicis pulveratae,
Opii pulverati, utriusque Drachmam unam,
Sulphatis potassae pulverati Unciam
unam.

Misceantur.

PULVIS NITRI TARTARICUS.

Pulvis nitrosus.

Rc. Nitratis potassae depurati,

Tartari crystallorum, utriusque Unciam unam,

Sacchari albissimi Uncias tres.

Seorsim pulverata misceantur.

PULVIS SCILLAE COMPOSITUS.

Rc. Scillae bulbi siccati concisi Partem unam,

Tartari crystallorum Partes quatuor,

Nitratis potassae depurati Partes tres.

Pulveratis admisceantur

Pulveris aromatici Partes duae.

PULVIS SENNAE COMPOSITUS.

Rc. Sennae foliorum Uncias duas,

Scammonii Unciam unam

Tartari crystallorum Uncias quatuor.

Seorsim pulverata commisceantur.

PULVIS SODAE TARTARICUS.

Pulvis aërophorus.

Rc. Tartari crystallorum Unciam unam et
dimidiam,

Carbonatis sodae Drachmas quatuor,

Sacchari albissimi Unciam unam.

Seorsim subtiliter pulverata misceantur.

Cuique hujus pulveris unciae, ex ordinatione medici distribuendae, addantur

Aetherolei Menthae piperitidis Gut-
tae tres.

PULVIS TARTARI COMPOSITUS.

Pulvis dentifricius.

Rc. Tartari crudi pulverati Partes viginti quatuor,

Iridis florentinae radice pulveratae,

Myrrhae,

Kino, singulorum Partes octo,

Coccionellae, cum guttis aliquot succi citri tritae Partem unam.

Terendo commisceantur, ut fiat pulvis tenerimus, Cum ex praescripto medici distribuendus est, admisceantur cuique pulveris unciae

Aetherolei caryophylli Guttae quatuor.

PYROLEUM OSSIUM RECTIFICATUM.

Oleum animale Dippelii.

Rc. Pyrolei, quod sub destillatione carbonatis superammoniacici pyroleosi obtinetur,

Carbonis lignei praeparati, Partes aequales.

Commisceantur in retorta vitrea tubulata, ex qua enissimò igne destilletur oleum, perfecte limpidum. Si hoc flavidum habet colorem, repetenda est destillatio cum addito novo carbonum pulvere. Servandum est in lagenis perparvis bene obturatis et in aqua frigida loco tenebroso subversis.

PYROLEUM SUCCINI RECTIFICATUM.

Oleum succini rectificatum.

Pyroleum, sub destillatione acidi succinici obtentum, depuretur eodem modo ac pyroleum ossium.

RESINA JALAPPAE.

Rc. Jalappae, radicis quantum placeat, cui pulveratae affunde

Alcoholis aquosi rectificati, quantum satis sit, ut pulverem contegat.

Digerantur leni calore per horas quadraginta et octo. Expresso liquore, pulvis cum novo alcoholis digeratur. Tincturae commixtae filtrentur, atque ex iisdem, addita

Aquae quarta parte destillando eliciatur alcohol. Resina interea subsidens aqua fervida abluatur et modico calore siccetur.

ROB JUNIPERI.

Juniperi baccae maturae contusae aqua macerentur per unum alterumve diem. Deinde ex foramine ad fundum vasis sito defluat liquor, qui baccis iterum superfundatur, similiterque transcoletur, donec fere insipidae fiant baccae. Liquor colatus ad mellis spissitudinem decoquatur.

SAPO AMYGDALINUS.

Rc. Sodae hispanicae,

Calcis ustae, singularum Libram unam,

Aquae fluvialis Libras octo.

Ebulliant. Subsidae pulvis per quietem in vase operto. Liquor colatus evaporet, ut pondus specificum 1,33 obtineat. Refrigerato deinde admisceatur

Amygdalarum olei duplum pondus.

Liquor mixtus spathula agitetur loco temperato, donec spissescat. Tum effundatur in cistulas ligneas; ibique induratus scindatur in taleolas, calore modico siccandas.

SERICUM ADHAESIVUM.

Emplastrum anglicanum.

Ichthyocolla rasa solvatur in tanta aquae calidae copia, ut ad punctum congelationis refrigerata solutio vix in gelatinam concreseat. Hac illinatur sericum rigide extensum, quod deinde calore temperato siccetur. Repetatur illitus duodecies.

Tandem Tinctura benzoës linetur pagina serici aversa.

SEVUM CURATUM.

Paratur e Sevo bubulo eodem modo ac axungia curata.

SPIRITUS LAVENDULAE.

℞. Lavendulae florum Libram unam et dimidiam,

Alcoholis aquosi rectificati Libras quatuor,

Aquae Libras tres.

Destillando eliciantur Librae tres cum dimidia, sit pondus specificum 0,9.

SPIRITUS MILLEFOLII ACETATUS.

Spiritus aromaticus acetatus.

℞. Spiritus millefolii compositi Libras duas,

Aceti vini gallici Libram unam.
Misceantur.

SPIRITUS MILLEFOLII COMPOSITUS.

Spiritus aromaticus.

Rc. Millefolii summitatum Libram unam
et dimidiam,
Rosmarini foliorum,
Thymi herbae, utriusque Libram dimidiam,
Alcoholis aquosi rectificati,
Aquae, utriusque Libras octo.
Macerentur per triduum. Tum destillando eliciantur Librae octo.

SPIRITUS ROSMARINI.

Rc. Rosmarini foliorum Libras duas,
Alcoholis aquosi rectificati,
Aquae, utriusque Libras quatuor.
Destillando eliciantur Librae quatuor.

SPONGIA CERATA.

Spongia tenuis siccata et ab arenulis purgata
immergatur in cera flava liquefacta. Deinde fortiter expressa et refrigerata servetur.

STYRAX DEPURATA.

Styrax in alcohole aquoso rectificato soluta per chartam coletur. Ex solutione vi caloris lenis evaporet alcohol.

SUCCINAS AMMONIACAE PYROLEOSO-
AQUOSUS.

Liquor cornu cervi succinatus.

Rc. Carbonatis superammoniacici pyro-
leoso-aquosi Libram dimidiam,
Acidi succinici, quantum satis sit ad sa-
turationem.

Misce et per chartam cola.

SULPHAS FERROSUS CRYSTALLINUS.

Vitriolum Martis.

Rc. Acidi vitrioli quantum placeat.

Caute infunde in

Aquae fontanae Sextuplum pondus.

Deinde adjice

Ferri limati plus quam quod per dige-
stionem duodecim horarum solvatur.

Solutio per chartam colata evaporet ad pellicu-
lam, et loco frigido demittat crystallos. Resi-
duus liquor denuo evaporet, ut crystallos depo-
nat. Crystalli collectae super charta siccentur et
vase clauso servantur.

SULPHAS POTASSAE.

Tartarus vitriolatus.

Massa post destillationem acidi nitroso-nitrici
residua, vi ignis ab acido abundante liberetur.
Deinde in aqua fervida solvatur, coletur, et eva-
poratione ad crystallinam formam redigatur.

SULPHAS SUPERAMMONIACICO - CUPRICUS.

Cuprum ammoniacum.

Rc. Vitrioli caerulei pulverati quantum placeat,

Ammoniacae causticae aquosae quantum satis sit, ut vitriolum sub digestionem solvat.

Solutioni colatae et refrigeratae adde

Alcoholis quantitatem praecipitationi sufficientem.

Sal praecipitatum charta bibula siccetur et in vase vitreo obturato servetur.

SULPHAS ZINCICUS.

Vitriolum album purum.

Paratur ex Zinci fragmentis et Acido vitrioli pari modo ac sulphas ferrosus.

SULPHURETUM CALCIS.

Rc. Cretae albae pulveratae,

Sulphuris, utriusque Partes aequales.

Mixta in crucibulo operto incandescant per horae quadrantem. Massa refrigerata servetur in vase vitreo clauso.

SULPHURETUM FERRI.

Ferri puri bacillus ad albedinem ignitus, sulphuris contactu liquatus guttatim in aquam defluet. Sulphuretum ex aqua demtum citissime siccetur et in vase clauso servetur.

SULPHURETUM HYDRARGYRI
STIBIATUM.

Aethiops antimonialis.

Rc. Sulphureti stibii praeparati Uncias tres,
Hydrargyri Uncias quatuor,
Sulphuris Uncias duas.

Terantur in mortario vitreo, donec perfecte commixta sint.

SULPHURETUM POTASSAE.

Hepar sulphuris.

Rc. Carbonatis superpotassici depurati
Partes duas,
Sulphuris pulverati Partem unam.

Misceantur et liquescant modico igne, in crucibulo operto. Massa effundatur et refrigeretur. Servetur in vase vitreo obturato.

SULPHURETUM STIBII PRAEPARATUM.

Antimonium praeparatum.

Paratur ex Antimonio crudo eodem modo ac bolus praeparatus.

SULPHUR PRAECIPITATUM.

Lac sulphuris.

Rc. Sulphureti potassae Partem unam,
Aquae fontanae Partes duodecim.
Solutioni per chartam colatae instilletur
Acidi sulphurici diluti, quantum satis

sit, ut omne dejiciatur sulphur, quod aqua ablutum siccetur.

SYRUPUS ALLII.

Rc. Alii recentis concisi Libram unam,

Aquae ferventis Libras duas.

Macerentur per horam in vase clauso. Liquori deinde colato admisceantur

Sacchari albissimi Librae duae.

SYRUPUS ALTHAEAE.

Rc. Althaeae radiceis decorticatae Libram dimidiam,

Aquae fontanae Libras sex.

Coquantur donec evaporaverit tertia pars liquidi. Liquori deinde per expressionem colato admisceantur

Sacchari albissimi Librae sex.

Mixto ad spissitudinem Syrupi cocto et refrigerato addantur

Aquae aurantii Unciae duae.

SYRUPUS AMYGDALARUM.

Rc. Amygdalarum dulcium Libram unam,

Amygdalarum amararum Drachmas duas.

Decorticatis et in mortario lapideo contusis sensim adjiciantur

Aquae fontanae Librae duae.

Aquae aurantii Unciae duae.

Liquor exprimendo coletur, ipsique deinde admisceatur

Sacchari albissimi pulverati, quantum satis sit, ut obtineatur syrupi spissitudo.

SYRUPUS AURANTII.

Rc. Aurantii flavedinis Libram dimidiam,

Aquae fervidae Libras tres.

Digerantur per biduum in vase clauso. Liquori deinde colato adjiciatur

Sacchari albissimi pulverati, quantum satis sit, ad spissitudinem syrupi.

SYRUPUS CERASI.

Rc. Succı e Cerasi fructibus, cum nucleis
contusis, recens expressi et
defaecati Libram unam,

Sacchari albissimi Libras duas.

Commisceantur in vase vitreo, et leni calore redigantur in syrupum.

SYRUPUS CITRI SUCCI.

Rc. Citri succi recens expressi et defaecati Libram unam,

Sacchari albissimi Libras duas.

Commixta in vase vitreo leni calore redigantur in syrupum.

SYRUPUS RHEI.

Rc. Infusi rhei Partem unam,
 Sacchari albissimi pulverati Partes duas.
 Misceantur, ut fiat syrupus.

SYRUPUS RIBIS NIGRI.

Paratur e succo baccarum eodem modo quo
 syrupus citri succi. Similiterque

SYRUPUS RUBI IDAEI,

e succo baccarum Rubi idaei.

SYRUPUS SACCHARI.

Rc. Sacchari albissimi Partes duas,
 Aquae Partem unam,
 Coquantur paullulum ut fiat syrupus.

SYRUPUS SCILLITICUS.

Rc. Scillae bulbi siccati Unciam unam,
 Zingiberis radicis Unciam dimidiam,
 Hyssopi herbae Uncias duas,
 Aquae menthae piperitidis Libras duas.
 Concisis et contusis radicibus et herba, omnia
 mascerentur in vase vitreo clauso per viginti qua-
 tuor horas. Liquori per expressionem colato et
 defaecato addantur

 Sacchari albissimi Librae tres.
 Denique paullulum coquendo fiat syrupus.

SYRUPUS SENEGAE.

Rc. Senegae radice concisae Unciam unam,
 Aquae fervidae Libram unam et dimidiam.
 Coquantur ad colaturam Unciarum decem. Tum
 addantur

Sacchari albissimi Libra una et dimidia.

SYRUPUS ZINGIBERIS.

Rc. Zingiberis radice concisae Unciam unam,
 Aquae fervidae Libram unam.
 Digerantur in vitro per horas sex. Liquori tum
 colato adjiciatur

Sacchari albissimi, quod sufficiat spissitudini syripi.

TARTRAS AMMONIACAE PYROLEOSO-
 AQUOSUS.

Rc. Carbonatis superammoniacici pyroleoso-aquosi Libram dimidiam;
 Acidi tartarici quantum saturationi sufficiat,
 Pyrolei succini rectificati Drachmam unam.

Misceantur conquassando, et post quietem viginti quatuor horarum colentur.

TARTRAS POTASSAE.

Tartarus tartarisatus.

Rc. Carbonatis superpotassici depurati quantum placeat,

Aquae quadruplum pondus.

Solutioni ferventi adjice paullatim

Tartari crystallos pulveratas, quae saturationi sufficiant.

Liquor calidus per chartam coletur et leni igne ad siccitatem evaporet.

TARTRAS POTASSAE FERROSUS.

Tartarus martialis.

Rc. Tartari pulverati Libras quatuor,

Ferri purissimi limati Libram unam et dimidiam,

Aquae Libras quadraginta et octo.

Coquantur in vase ferreo, donec evanescat sapor acidus. Liquor decantatus modico calore ad siccitatem evaporet sollicite cavendo ne aduratur.

TARTRAS POTASSAE SODICUS.

Sal Seignetti.

Rc. Carbonatis supersodici crystallini Libram unam,

Aquae Libras tres.

Solutioni fervidae sensim adjice

Tartari crystallorum pulveratarum quantum satis sit ad saturationem.

Liquor per chartam colatus evaporet ad pelliculam. Tum loco frigido seponatur, ut formentur crystalli.

TARTRAS POTASSAE STIBIOSUS.

Tartarus antimonialis.

Rc. Oxidi stibiosi pulverati,

Tartari crystallorum pulveratarum, utriusque Uncias tres,

Aquae destillatae Libras quatuor.

Coquendo digerantur in vase vitreo, usque quo solutus sit tartarus. Tum liquidum fervens coletur et loco frigido seponatur, ut crystallos demittat. Solutio residua post iteratam evaporationem novas porriget crystallos. Si interea in liquore compareant aciculae tartratis calcis, quae liquorem agitatum turbidum faciant, hic denuo per chartam coletur, antequam ulterius evaporet.

TINCTURA ABSINTHII.

Rc. Absinthii summitatum Uncias quatuor,
Spiritus frumenti Libras duas.

Digerantur per triduum et colentur.

TINCTURA ABSINTHII COMPOSITA.

Tinctura amara.

Rc. Absinthii summitatum Uncias duas,
Cardui benedicti herbae,
Aurantii fructus immaturi,
Galangae radices, singulorum concisorum Unciam dimidiam,
Alcoholis aquosi rectificati Libras duas.

Digerantur per triduum, deinde per chartam colentur.

TINCTURA AROMATICA.

Rc. Canellae albae corticis,

Cinnamomi ceylanici,
 Galangae radice, singulorum Unciam
 dimidiam,
 Cardamomi minoris seminum Drach-
 mas duas,
 Alcoholis aquosi rectificati Libram
 unam.
 Digerantur per triduum et per chartam colentur.

TINCTURA AROMATICA ACIDA.

Tinctura aromatica vitriolata.

Rc. Tincturae aromaticae Libram unam,
 Acidi sulphurici Uncias duas.
 Caute commisceantur. Post quietem aliquot die-
 rum deliquetur tinctura in lagenam bene obtu-
 randam.

TINCTURA ASAE FOETIDAE.

Rc. Asae foetidae Uncias duas,
 Alcoholis Libram unam.
 Digerantur per triduum, ut fiat solutio, quam filtra.

TINCTURA AURANTII.

Rc. Aurantii flavedinis Libram dimidiam,
 Alcoholis aquosi rectificati Libras
 tres.
 Macerentur per triduum et per chartam colentur.

TINCTURA CANTHARIDUM.

Rc. Cantharidum contritarum Unciam dimidiam,
 Alcoholis aquosi rectificati Libram
 unam.
 Frigide macerentur per octo dies, deinde per
 chartam colentur.

TINCTURA CASCARILLAE.

Rc. Cascarillae corticis contusi Uncias duas,
Alcoholis aquosi rectificati Libram
unam.

Digerantur per triduum et per chartam colentur.

TINCTURA CINNAMOMI.

Rc. Cinnamomi ceylanici Uncias duas,
Alcoholis aquosi rectificati Libram
unam.

Digerantur per triduum et per chartam colentur.

TINCTURA COLOCYNTHIDIS.

Rc. Colocynthidis fructus minutim concisi et
seminibus privati Unciam unam,
Anisi stellati contusi Drachmam unam,
Alcoholis aquosi rectificati Uncias
quatuordecim.

Digerantur per triduum et per chartam colentur.

TINCTURA DIGITALIS.

Rc. Digitalis foliorum siccatorum Uncias duas,
Alcoholis aquosi rectificati Uncias
octo,

Aquae destillatae Uncias quatuor.

Leni calore digerantur in vase clauso per dies
tres. Deinde coletur tinctura.

TINCTURA GUAIACI AMMONIACATA.

Rc. Guaiaci resinae Unciam unam,
Alcoholis ammoniacati Libram dimi-
diam.

Frigide per quatrimum macerata colentur.

TINCTURA KINKINAE AMARA.

Rc. Kinkinae corticis contusi Uncias quatuor,
 Centianae rubrae radice concisae et
 contusae,
 Aurantii flavedinis, utriusque Unciam
 unam et dimidiam,
 Alcoholis aquosi rectificati Libras
 quatuor.
 Modico calore per triduum digesti per chartam
 colentur.

TINCTURA LAVENDULAE AROMATICA,

Spiritus lavendulae compositus.

Rc. Spiritus lavendulae Libras tres,
 Spiritus rosmarini Libram unam,
 Cinnamomi ceylanici contusi,
 Nucis moschatae contusae, utriusque Un-
 ciam dimidiam,
 Coccionellae contusae Drachmam dimi-
 diam.
 Digerantur modico igne per triduum et colentur.

TINCTURA MYRRHAE.

Rc. Myrrhae pulveratae Uncias duas,
 Alcoholis aquosi rectificati Libram
 unam.
 Digerantur per triduum et per chartam colentur.

TINCTURA OPII.

Tinctura thebaica.

Rc. Opii pulverati Uncias duas,
 Alcoholis aquosi rectificati,
 Aquae cinnamomi, utriusque Uncias decem.

Opium cum alcohole in mortario calefacto teratur. Deinde addatur aqua cinnamomi. Digerantur per triduum et per chartam colentur.

TINCTURA SCILLAE.

Rc. Scillae bulbi laminarum siccatarum Unciam unam,
Cinnamomi ceylanici Drachmas duas,
Potassae causticae aquosae Drachmam unam,
Alcoholis aquosi rectificati Libram dimidiam.

Digerantur per triduum et per chartam colentur.

TINCTURA VALERIANAE AETHEREA.

Rc. Valerianae radiceis pulveratae Unciam unam,
Alcoholis sulphurico-aetherei Uncias octo.

Frigide digerantur in vase clauso et per chartam colentur.

VINUM FERRATUM.

Vinum chalybeatum.

Rc. Ferri subtilissime limati Unciam unam,
Cinnamomi ceylanici pulverati Unciam dimidiam,
Vini rhenani Libram unam.

Digerantur per quadriduum; tum transfundatur liquor.

VINUM GENTIANAE COMPOSITUM.

Rc. Aurantii flavedinis Drachmas sex,
Gentianae rubrae radiceis Unciam unam,

Piperis nigri Drachmam dimidiam,
Zingiberis radicis Drachmam unam,
Vini hispanici Libram unam.

Concisis et contusis radicibus et seminibus, fiat
per quatrimum digestio. Deinde coletur vinum.

VINUM IPECACUANHAE.

Rc. Ipecacuanhae radicis contusae Drach-
mas sex,

Vini hispanici Libram dimidiam.

Macerata per quatrimum colentur.

VINUM OPII CROCATUM.

Elixir papaveris.

Rc. Liquiritiae succi Unciam dimidiam,
Crocī stigmatum,

Opii pulverati, utriusque Scrupulos
quinque,

Vini hispanici Uncias decem.

Digerantur per quatrimum et colentur.

VINUM RHEI.

Elixir rhei dulce.

Rc. Rhabarbari pulverati Uncias duas,

Cardamomi pulverati Drachmas duas,

Vini hispanici Libram unam.

Digerantur per quatrimum. Tum exprimendo
colentur.

VINUM RHEI AMARUM.

Elixir rhei amarum.

Rc. Rhabarbari Unciam unam,

Gentianae rubrae radices Drachmas
duas,

Canellae albae Drachmam unam.

Contusa digerantur per triduum cum

Vini hispanici Libra una.

Exprimendo deinde coletur vinum.

VINUM STIBIATUM.

Vinum antimonii.

Rc. Tartratis potassae stibiosi Grana duo-
decim,

Vini hispanici tepidi Uncias sex

Triturentur, ut fiat solutio, quae per chartam co-
letur.

UNGUENTUM ACETATIS SUPERPLUMBICI.

Unguentum Saturni.

Rc. Cerae albae Uncias octo.

Quibus liquefactis adde

Olivarum olei Libram unam et dimidiam,

Acetatis superplumbici aquosi Un-
cias octo.

Ab igne remota subige bacillo ligneo donec per-
fecta sit unio.

UNGUENTUM AROMATICUM.

Balsamum aromaticum.

Rc. Nucis moschatae olei Unciam unam,

Cerae flavae Drachmas duas.

Modico igne liquatis et deinde a calore remotis
admisce

Aetherolei caryophylli,

Lavendulae aetherolei, utriusque Drach-
 mas duas,
 Pyrolei succini rectificati Scrupulum
 dimidium.

UNGUENTUM CALAMINAE COMPOSITUM.

Unguentum exsiccans rubrum Acrelii.

Rc. Calaminae praeparatae,
 Lithargyrii pulverati,
 Cerussae pulveratae, singulorum Libram
 dimidiam,
 Minii,
 Acetatis plumbici pulverati, utriusque
 Uncias tres,
 Sevi curati Libram unam,
 Lini olei Uncias octo.

Sevo super igne calefacto admisceatur oléum.
 Deinde addantur pulveres. Mixto nonnihil re-
 frigerato immisceantur

Camphorae pulveratae Drachmae tres,
 ut fiat unguentum.

UNGUENTUM CANTHARIDUM.

Rc. Cantharidum pulveratarum Libram unam,
 Unguenti terebinthinae resinosi Li-
 bras quatuor.
 Coquantur leni calore, per horam, in vase clauso.

UNGUENTUM CANTHARIDUM COLATUM.

Unguentum ad fonticulos Bergii.

Unguentum cantharidum adhuc calidum
 coletur per linteum. Librae ejus uni addantur

Aeruginis pulveratae Drachmae tres, cum
aequali quantitate

Olivarum olei

subtilissime contritae.

UNGUENTUM CERAЕ.

Rc. Olivarum olei Uncias decem,

Cerae albae Uncias quatuor.

Colliquata deindeque ab igne remota agitentur
donec refrixerint.

UNGUENTUM CERUSSAE.

Rc. Cerussae subtilissime tritae Uncias octo,

Axungiae curatae Libram unam.

Miscēantur triturando.

UNGUENTUM HYDRARGYRI.

Rc. Axungiae curatae,

Sevi curati, utriusque Libram unam.

Una liquefactis deindeque ab igne remotis, cum
spissescere incipiunt, admisceantur.

Hydrargyri Librae duae.

Massa diligenter condepsatur, donec coerulescen-
tem acquisiverit colorem, et evanuerint e con-
spectu hydrargyri globuli.

UNGUENTUM NITRATIS HYDRARGYRI.

Unguentum hydrargyri compositum.

Rc. Hydrargyri Unciam unam,

Acidi nitroso-nitrici Uncias duas.

Digerantur in balneo arenae ut fiat solutio, quae
adhuc fervida misceatur cum

Axungiae curatae liquefactae et sub refrigeratione concrenentis Libra una, ut fiat unguentum.

UNGUENTUM ROSATUM.

Rc. Axungiae curatae Libras octo.
Quibus paullatim instilla et pistillo ligneo subige
Aquae rosae Libram unam.

UNGUENTUM SULPHURIS COMPOSITUM.

Rc. Sulphuris,
Saponis Rossici, utriusque Libram dimidiam,
Axungiae curatae Libras duas et dimidiam.
Vi caloris liquefactis immisce
Hellebori nigri radices pulveratae Uncias duas.

UNGUENTUM TEREBINTHINAE RESINOSUM.

Unguentum basilicum.

Rc. Colophonii flavi,
Sevi ovilli curati,
Terebinthinae communis,
Cerae flavae, singulorum Uncias tres,
Olivarum olei Libram unam.
Liquata spathula lignea commisceantur, donec refrigerint.

UNGUENTUM ZINCICUM.

Rc. Axungiae curatae Uncias sex,
quibus immisce
Oxidi Zincici pulverati Unciam unam.

I N D E X.

A.

	pag.
Absinthii summitates	265
Acetas ammoniacae aquosus	282
plumbicus crystallinus	282
potassae	283
potassae aquosus	283
superplumbicus aquosus	284
Acetum aromaticum	284
destillatum	284
lithargyrii	284
prophylacticum	284
saturninum	284
scillae	285
siceræ	265
vini Gallicum	265
Acidum aceticum	285
citricum	285
muriaticum	286
muriaticum oxygenatum	300
nitricum dilutum	287
nitri fumans	287
nitroso - nitricum	287
phosphoricum aquosum	288
salis	286
succinicum	288
sulphuricum depuratum	288
sulphuricum dilutum	289
tartaricum	289
vitrioli	265
vitrioli tenue	288
Aconiti folia	265
Adeps suilla	267
Aerugo	265

	pag.
Aether aceticus	290
ammoniacatus	291
ferratus	291
martialis	291
Aetheroleum absinthii	292
anisi	293
caryophylli	293
carvi	293
cinnamomi	293
foeniculi	293
juniperi	293
menthae piperitidis	293
tanacetii	293
terebinthinae	280
rectificatum	293
Aether sulphuricus	292
vitriolatus	292
Aethiops antimonialis	345
martialis	328
Alcannae radix	265
Alcohol	294
absolutus	294
aethereus ferratus	294
ammoniacatus	294
aquosus	295
camphoratus	295
ferratus	295
muriatico - aethereus	295
nitrico - aethereus	296
sulphurico - aethereus	296
Alkali ammoniacum	305
ammoniacum acetatum	282
ammoniacum aquosum	305
ammoniacum causticum	296
ammoniacum spirituosum	294
lignorum depuratum	306
minerale fixum	307
tartari	307
vegetabile acetatum	283
Allii bulbosus	265
Aloë Capensis	265
Soccotrina	265
Althaeae radix	265

	pag.
Alumen crudum	265
ustum	296
Ambra liquida	279
Ammoniaca caustica aquosa	296
Ammoniacum	266
Amygdalae amarae	266
dulces	266
Amylum	266
Angelicae radix	266
Angusturae cortex	266
Anisi semina	266
Anthos folia	277
Antimonium crudum	266
praeparatum	343
Aqua acetatis superplumbici	297
acidi carbonici	297
aërata	297
aërata alkalina	298
amara	301
aurantii	297
calcis	298
carbonatis potassae acidula	298
carbonatis sodae acidula	298
cerasi	298
cinnamomi alcoholica	299
destillata	299
foeniculi	299
fortis	266
hydrosulphurica acidula	299
menthae crispae	300
menthae piperitidis	300
muriatis hydrargyrici corrosivi	300
naphae	297
oxymuriatica	300
petrosclini	301
rosae	301
saturnina	297
sulphatis magnesia cum acido carbonico	301
Argentum foliatum	266
purum	301
Armoraciae radix	266
Arnicae flores	266
radix	266

	pag.
Arsenicum album	266
Arsenis potassae aquosa	302
Asafoetida	266
Aurantii aetheroleum	266
cortex	266
flavido	267
flores saliti	267
fructus immaturus	267
Aurum foliatum	267
Axungia curata	302
oxygenata	302
porci	267
B.	
Balsamum aromaticum	355
copaivae	267
peruvianum	267
Bardanae radix	267
Belladonnae folia	267
radix	267
Benzoë	267
Berberis baccae	267
succus baccarum	267
Bismuthum	267
Bistortae radix	267
Bolus armenia	267
praeparatus	303
Borax	267
Butyrum antimonii	325
cacao	326
C.	
Cacao nuclei	267
Cajeput aetheroleum	267
Calamina praeparata	303
Calami aromatici radix	268
Calomel	325
Calx pura	303
salita	324
usta (s. viva)	268
Cambogia	272
Camphora depurata	268
Canellae albae cortex	268

	pag.
<i>Cannabis semina</i>	268
<i>Cantharides</i>	268
<i>Carbo ligneus praeparatus</i>	303
<i>Carbonas calcis praeparatus</i>	303
<i>magnesiae</i>	304
<i>potassae</i>	304
<i>sodae</i>	304
<i>superammoniacicus</i>	305
<i>superammoniacicus aquosus</i>	305
<i>superammoniacicus pyroleosus</i>	305
<i>superammoniacicus pyroleoso - aquosus</i>	306
<i>superpotassicus aquosus</i>	306
<i>superpotassicus depuratus</i>	306
<i>superpotassicus purus</i>	307
<i>supersodicus crystallinus</i>	307
<i>Cardamomum minus</i>	268
<i>Cardui benedicti herba</i>	268
<i>Caricis arenariae radix</i>	268
<i>Carvi semina</i>	268
<i>Caryophyllatae radix</i>	268
<i>Caryophylli</i>	268
<i>Cascarillae cortex</i>	268
<i>Castoreum</i>	268
<i>Catechu</i>	269
<i>Causticum antimoniale</i>	325
<i>lunare</i>	326
<i>salinum</i>	334
<i>Cepae bulbus</i>	269
<i>Cera alba</i>	269
<i>flava</i>	269
<i>Cerasi drupae</i>	269
<i>Ceratum cetacei album</i>	307
<i>cetacei rubrum</i>	307
<i>labiale</i>	307
<i>Cereoli</i>	308
<i>Cerussa</i>	269
<i>Cetaceum</i>	279
<i>Chamomillae vulgaris flores</i>	269
<i>Chinae radix</i>	269
<i>Cinae semina</i>	269
<i>Cineres clavellati</i>	276
<i>Cinnabaris</i>	269
<i>Cinnamomi Ceylanici cortex</i>	269

	pag.
Citras potassae aquosus	308
Citri aetheroleum	269
cortex fructus	269
flavedo	269
succus	269
Coccionella	269
Cochleariae herba	269
Colocynthis fructus	269
Colophonium	270
Columbo radix	270
Conii folia	270
Conserva cochleariae	308
Cornu cervi	270
cervi ustum praeparatum	327
Cremor tartari	280
Creta alba	270
praeparata	303
Croci stigmata	270
Crocus antimonii elotus	329
Cubebae	270
Cumini semina	270
Cuprum	270
ammoniacum	342
Curcumae radix	270
Cydoniae semina	270
Cymini semina	270

D.

Decoctum guajaci compositum	308
kinkinae	309
lignorum	308
Digitalis folia	270
Dulcamarae stipites	270

E.

Elaeosaccharum cinnamomi	309
Electuarium mannae	309
sennae	310
Elixir papaveris	354
rhei amarum	354
rhei dulce	354
Emplastrum adhaesivum	310
ammoniaco - galbanicum	310

	pag.
Emplastrum anglicanum	339
asae foetidae compositum	311
cantharidum	311
cerae terebinthinatum	311
citrinum	311
commune	312
diapompholigos	313
digitalis	312
foetidum	311
gummosum	310
hydrargyri	312
meliloti	312
mercuriale	312
oxidi plumbici	312
picis	313
viride	313
zincico - plumbosum	313
Emulsio ammoniaci	314
amygdalarum	314
communis	314
guajaci	314
gummosa	314
Enulae radix	270
Euphorbium	270
Extractum absinthii	315
aconiti	315
cardui benedicti	315
cascarillae	315
chamomillae	315
colocynthis	316
conii	316
gentianae	316
hyoscyami	316
juglandis	316
kinkinae	316
nicotianae	316
stramonii	317
taraxaci	317
trifolii aquatici	317
violae tricoloris	317
F.	
Faba pichurim	271
Fel taurinum	271

	pag.
Ferri limatura	271
Ficus passae s. caricae	271
Filicis maris radix	271
Flores zinci	330
Foeniculi semina	271
Foeni graeci semina	271
Fraxini cortex	271
Fumariae herba	271

G.

Galangae radix	271
Galbanum	271
Gallae	271
Gelatina lichenis islandici	322
Gentianae rubrae radix	271
Graminis radix	271
Gratiolae herba	271
Guaiaci lignum	272
resina	272
Gummi arabicum	272
gutta	272
tragacantha	272

H.

Hellebori nigri radix	272
Hepar sulphuris	343
Hirudines	272
Hydrargyrum	272
purum	317
Hydrargyrum corrosivus albus	322
corrosivus ruber	328
dulcis	325
Hydrosulphuretum ammoniacae aquosum	317
stibiosum	318
stibiosum cum sulphure	318
Hyoscyami folia	272
Hyssopi herba	272

I.

Jalappae radix	272
Ichthyocolla	272
Infusum kinkinae calidum	319
kinkinae frigidum	319

	pag.
Infusum rhei	319
sennae	319
Ipecacuanhae radix	272
Iridis florentinae radix	272
Juglandis oleum	272
putamen	272
Juniperi baccae	272
lignum	272

K.

Kermes minerale	318
Kinkinae cortex flavus	273
fuscus	273
Kino	273

L.

Lac ammoniacum	314
sulphuris	343
Lapis calaminaris	273
calaminaris praeparatus	303
Lavendulae aetheroleum	273
flores	273
Lauri baccae	273
folia	273
oleum	273
Ledi summitates	273
Lichen islandicus	273
Lignum campechianum	273
Linctus olcosus	320
Linimentum ammoniacae	320
e sale volatili	320
saponaceum	320
saponis camphoratum	320
Lini oleum	273
semina	273
Liquiritiae radix	273
succus	273
Liquor anodynus mineralis Hoffmanni	296
cornu cervi alkalinus	306
cornu cervi succinatus	341
probatorius	299
Lithargyrium	273
Lixivium saponariorum	334

Lixivium tartari	pag. 306
Lupuli strobili	273
Lycopodii farina s. pollen	273

M.

Macis	275
Magisterium bismuthi	326
Magnesia alba	304
nigra	273
pura	320
Malvae folia	274
Manna	274
Marcasita	267
Mastix	274
Mel	274
despumatum	321
Meliloti herba	274
Melissae citrinae herba	274
Mel rosae	321
Menthae crispae herba	274
piperitidis herba	274
Mercurius praecipitatus albus	323
Mezerei cortex	274
Millefolii summitates	274
Minium	274
Mixtura mercurialis	300
salina	308
salina pauperum	283
Morsuli aromatici	321
Moschus	274
Mucilago gummi arabici	322
lichenis islandici	322
Murias ammoniacae depuratus	322
ammoniacae ferricus	322
ammoniacae superhydrargyricus	323
baiytae	323
calcis	324
ferricus	324
hydrargyricus corrosivus	324
hydrargyrosus mitis	325
stibiosus	325
Musculus islandicus	273

	pag.
Myrrha	274
Myrtilli baccae	274

N.

Naphae flores	267
Nicotianae folia	274
Nihilum album	276
griseum	280
Nitras argenti crystallinus	326
argenti fusus	326
potassae depuratus	326
superbismuthicus	326
Nitrum crudum	274
purificatum	326
Nucis moschatae aetheroleum	275
involucrum nuclei	275
nucleus	275
oleum	275
Nux vomica	275

O.

Oleum amygdalarum	327
animale Dippelii	337
cacao	327
lini	327
lini camphoratum	327
olivarum	275
succini rectificatum	337
vitrioli	265
Olivarum oleum	275
Opium	275
Origani cretici aetheroleum	275
flores	275
Ossa usta praeparata	328
Ostreae testae	275
Ovum gallinaceum	275
Oxydum ferricum	328
ferrosum	328
hydrargyricum	328
hydrargyrosum	329
plumbosum	329
stibiosum	329
zincicum	329

	pag.
Oxycocci succus	275
Oxymcl	330
aeruginis	330
scillae	330
P.	
Padi cortex	275
Papaveris capsulae	275
Passulae majores	275
Pasta althaeae	330
amygdalarum	331
glycyrrhizae	331
liquiritiae	331
regia	331
Petroleum	275
Petroselinii semina	275
Phellandrii semina	276
Phosphas sodae	331
Phosphorus	276
Pilulae castorei compositae	332
catharticae	332
colocynthis compositae	332
e mercurio corrosivo albo	333
foetidae	332
muriatis hydrargyrici	333
scammonii compositae	333
Pimpinellae radix	276
Pini turiones	276
Piper album	276
hispanicum s. indicum	276
jamaicense	276
nigrum	276
Pix liquida	276
solida	276
Plumbago	276
Plumbum	276
Pompholyx	276
Potassa caustica aquosa	333
caustica fusa	334
vulgaris	276
Psyllii semina	276
Pulpa tamarindi	334
Pulvis aërophorus	336

INDEX.

371

	pag.
Pulvis alexiterius	335
aromaticus	335
dentifricius	337
Doweri	335
jalappae compositus	335
ipecacuanhae opiatuſ	335
nitri tartaricus	335
nitrosus	335
scillae compositus	336
sennae compositus	336
sodae tartaricus	336
tartari compositus	337
Pyroleum ossium rectificatum	337
succini rectificatum	337

Q.

Quassiae lignum	276
Quercū cortex	276
glandes	276

R.

Resina guajaci	272
jalappae	338
Rhabarbarum Sibericum	277
Rhei radix	277
Ribis nigri baccae	277
folia et ramuli	277
Ricini oleum	277
semina	277
Rob juniperi	338
sambuci	278
Rosae damascenae petala	277
rubrae petala	277
Rosmarini aetheroleum	277
folia	277
sylvestris summitates	273
Rubi idaci baccae	277

S.

Sabadillae semina	277
Sabinae ramuli	277
Saccharum album	277
lactis	277

	pag.
Saccharum saturni	277
saturni purificatum	282
Sal acetosellae	277
ammoniacum	277
ammoniacum martiale	322
anglicum	277
catharticum	277
commune	278
cornu cervi	305
Salcb radix	278
Sal essentielle tartari	289
Glauberi	278
Salicis cortex	278
Sal saturni depuratum	282
Seignetti	348
succini	288
Salviae folia	278
Sambuci flores	278
rob	278
Santonici semina	269
Sapo alicantinus	278
amygdalinus	338
hispanicus	278
Saponariae radix	278
Sapo rossicus	278
venetus	278
Sassaparillae radix	278
Sassafras radix lignosa	278
Scammonium aleppense	278
Scillae bulbus	278
Scordii herba	278
Senegae radix	278
Sennae folia	278
Sericum adhaesivum	339
Serpentariae virginianae radix	279
Sevum bubulum	279
curatum	338
Simarubae cortex radiceis	279
Sinapis semina	279
Soda hispanica	279
phosphorata	332
Spathum ponderosum	279
Sperma ceti	279

	pag.
Spiritus aethereus nitratus	296
aethereus vitriolatus	296
aromaticus	340
aromaticus acetatus	339
frumenti	279
lavendulae	339
lavendulae compositus	352
millefolii acetatus	339
millefolii compositus	340
Mindereri	282
rosmarini	340
salis dulcis	295
sulphuris Beguini	317
vini camphoratus	295
vini gallicus	279
vini rectificatissimus	294
vini rectificatus	295
Spongia	279
cerata	340
Stannum	279
Stramonii folia	279
Styrax calamita	279
depurata	340
liquida	279
Succinas ammoniacae pyroleoso-aquosus	341
Succinum	279
Sulphas ferrosus crystallinus	341
potassae	341
superammoniacico - cupricus	342
zincicus	342
Sulphur citrinum solidum	279
sublimatum pulvereum	279
auratum antimonii	318
Sulphuretum calcis	342
ferri	342
hydrargyri stibiatum	343
potassae	343
stibii praeparatum	343
Sulphur praecipitatum	343
Syrupus allii	344
althaeae	344
amygdalarum	344
Syrupus aurantii	345


Syrupus	cerasi	pag. 345
	citri succi	345
	rhei	346
	ribis nigri	346
	rubi idaei	346
	sacchari	346
	scilliticus	346
	senegae	347
	zingiberis	347
T.		
Tamarindi	fructus	280
Tanaceti	summitates	280
Taraxaci	radix	280
Tartari	crystalli	280
Tartarus	antimonialis	348
	crudus	280
	martialis	348
	tartarisatus	347
	vitriolatus	341
Tartras	ammoniacae pyroleoso - aquosus	347
	potassae	347
	potassae ferrosus	348
	potassae sodicus	348
	potassae stibiosus	348
Terebinthina	communis	280
Terebinthinae	aetheroleum	280
Terebinthina	veneta	280
Terra	foliata tartari	283
	japonica	269
	ponderosa salita	323
Tinctura	absinthii	349
	absinthii composita	349
	aromatica	349
	aromatica acida	350
	aromatica vitriolata	350
	asae foetidae	350
	aurantii	351
	Bestuscheffi	294
	cantharidum	351
	cascarillae	351
	cinnamomi	351
	colocynthis	351

	pag.
Tinctura digitalis	351
guajaci ammoniacata	351
kinkinae amara	352
kinkinae Whyttii	352
lavendulae aromatica	352
martis	295
myrrhae	352
opii	353
scillae	352
thebaica	353
valerianae aetherea	353
Tormentillae radix	280
Trifolii, aquatici folia	280
Tutia	280

V.

Valerianae minoris radix	280
Vanilla	280
Vinum antimonii	355
chalybeatum	353
ferratum	353
gallicum album	280
gallicum rubrum	280
gentianae compositum	353
hispanicum	280
ipecacuanhae	354
opii crocatum	354
rhei	354
rhei amarum	280
rhenanum	280
stibiatum	355
Violae tricoloris herba	281
Viride aeris	281
Vitriolum album	281
album purum	342
caeruleum	281
cupri	281
martis	281
viride	281
zinci	281
Ulmi cortex	281
Unguentum acetatis superplumbici	355
ad fongiculos Bergii	356

	pag.
Unguentum album	307
aromaticum	355
basilicum	358
calaminae compositum	356
cantharidum	356
cantharidum colatum	356
cerae	357
cerussae	357
exsiccans Acrelii	356
hydrargyri	357
hydrargyri compositum	357
nitratiss hydrargyri	357
oxygnatum Alyoni	302
rosatum	358
saturni	355
sulphuris compositum	358
terebinthinae resinosum	358
zincicum	358
Uvae passae	275
ursi folia	281
Z.	
Zedoariae radix	281
Zincum	281
Zingiberis radix	281



CODEX
MEDICAMENTARIUS
EUROPAEUS

SECTIO QUINTA

PHARMACOPOEAM
ROSSICAM, FENNICAM ET POLONICAM
CONTINENS

TOMUS II.

PHARMACOPOEA POLONICA.

LIPSIAE ET SORAVIAE,
APUD FRIDERICUM FLEISCHER.
1821.

PHARMACOPOEIA REGNI POLONIAE

A U C T O R I T A T E

MINISTERII ADMINISTRATIONIS RERUM
INTERNARUM ET DISCIPLINAE
PUBLICAE.

E D I T A.

A

CONSILIO SUPREMO SANITATIS.

LIPSIAE ET SORAVIAE,
APUD FRIDERICUM FLEISCHER.

1821.

P R A E F A T I O.

Qua olim Patrium Regnum carebat Pharmacopoeia propria, ea ne diutius regenerato desit, sub Auspiciis Clementissimi MONARCHAE, Patriae Restitutoris, Summique Literarum et Artium Protectoris, jussu et auctoritate Ministerii Administrationis rerum internarum et disciplinae publicae, opere hocce curavimus. Urgebat nimirum necessitas hujus eo major, quo arctius Provinciae, antea diversis legibus obediētes, rursum unius regiminis vinculo cingebantur, et quo gravius nunc et pharmacopoeiae et pondera et nummorum significatio, hisque accommodatum medicamentorum pretium, differebant. Injuncto igitur nobis a Summis Magistratibus munerè codicis comparandi pharmaceutici, qui et scopo, et doctrinae rerum naturalium ad diem usque hodiernum incremento, ar-

tisque medicae dignitati respondeat, qui simplicitate conspicuus efficaciora nequaquam omittat, quin imo inveterato usu quaedam concedat, satisfacere studuimus.

Pharmacopoeiam Borussicam pro basi habere, tam operis istius praestantia, quam familiaris jam usus in maxima Regni parte imperabant; neque tamen Clarissimorum Auctorum Pharmacopoeiarum recentiorum, imprimis Ruthenae, Batavae, Londinensis, Edinburgensis, nec minus Trommsdorffii, aliorumque derepharmaceutica bene meritorum Virorum studia vilipendimus, nonnulla proprio repetitoque scrutinio emendantes, et ambiguis substituentes certiora.

Alphabeticum ordinem in materia pharmaceutica, nec non in serie praeparatorum et compositorum, ut commodissimum omnium, servandum censuimus.

Terminologiam, qualem Pharmacopoeia Borussica adoptavit, ut majori numero pharmacopolarum et medicorum nostratum jam familiarem, in prima posuimus serie, addendo simul terminos recentiorum Chemiae cultorum sanctionem jam nactos; nomen succinctum, etiamsi ejus compositioni minus accommodatum, verbo-

*siori vel barbare sonanti, hinc inde praeferentes. Nomina medicamentorum omnino obsoleta, in opere ipso rejecta, in-
dici rerum interseruimus, in usum puta
illorum, qui iis carere nolunt.*

*Pondus specificum apposuimus, modo
quam simplicissimo, iis tantum substan-
tiis, quae id constanter servant, quarum
qualitas ab eo pendet, quaeque ad usum
earum requiritur ulteriorem, ratione ha-
bita eruditionis antiquorum Pharmacopo-
larum, ne praebeamus iis obscura.*

Varsoviae die 15. Junii 1817.

PONDERA ET MENSURAE.

Pondera in officinis nostris usitata, desumta sunt a Libra Norica, medicinali sic dicta, quarum XXX. aequant XLVI. Marcas Colonienses.

Libra continet Uncias XII.

Uncia — Drachmas VIII.

Drachma — Scrupulos III.

Scrupulus — Grana XX.

Mensura polonica respondet

Aquae Unciis XXX.

MATERIA
PHARMACEUTICA.

STATE

LEGISLATURE

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

Acetum. Ocet.

Acidum aceticum fermentatione acida cuiusvis liquoris vinosi paratum. Sit sincerum, gustu et odore gratum, et tantae aciditatis, ut unciae duae saturent Kali carbonici drachmam. Liquor hac saturatione paratus acrem saporem non habeat. Praecipitatum ab instillatione aceti saturnini in aceto ortum, sit in acido nitrico solubile.

Adeps suilla. Tłuszcz wieprzowy,
Szmałec.

Sus Scrofa *).

Oleum pingue tela cellulosa omentorum clausum, recens, odoris plane expers.

Aerugo crystallisata. Viride aeris crystallisatum. Grynszpan
krystalizowany.

Cuprum acetum crystallisatum, ex atro viridescens, solutione aeruginis in aceto paratum.

) Nomina animalium et vegetabilium, auctoris nomine non consignata, in Systemate Linneano iam recepta sunt,

Aloë lucida. *Aloes.*

Aloë spicata et *Aloë Socotrina*
Frutices Africae australis. Colligitur etiam
ex Aloë vulgari in India occidentali et
orientali.

Succus foliorum inspissatus e croceo fuscus, tenuioribus frustulis diaphanus, splens dens, friabilis, saporis peramari, nauseos odoris submyrrhini, guttur vellicantis, in Spiritu Vini ex toto, in Aqua quoad maximam partem solubilis.

Alumen crudum. *Hatun.*

Sal octaedrum, acido-stypticum, conflatum ex Alumina, Kali, interdum Ammonia acido sulphurico praedominante, et aqua crystallisationis dimidium totius ponderis superante. Album sit atque subpellucidum metallis non inquinatum.

Ambra grisea. *Ambra szara.*

Materies solida, ex nigro cinerea, maculis et striis variegata, opaca, levis, odori pergrati, leni calore instar cerae liquescens ac deflagrans, in Aethere et Spiritu Vini maxima ex parte solubilis. Oceano ad littora Indiae orientalis, Aethiopiae et Americae meridionalis in globis variae magnitudinis innatat, plerumque rostris *Sepiae octopodia* referta; unde conjicitur, esse massam, in intestinis *Physeteris macrocephali* secretam.

Ammoniacum, vulgo *Gummi ammoniacum*. *Guma Amniacka*.

Heraclium gummiferum? Willdenowii. *Planta biennis Africae*.

Succus gummeo-resinosus, in grana intus albida, plerumque inter se conglutinata condensatus, tenax, digitis agitatus mollescens, odoris gravis et saporis amaro-nauseosi subacris. Advehitur ex Abyssinia, Libya, Aegypto meridionali, et plurimum e deserto Barca.

mygdalae. *Migdaty*.

Amygdalus communis. *Arbor Africae borealis in Europa meridionali culta*.

Amygdalae dulces. *Migdaty stodkie*.

Nuclei varietatis Amygdali communis fructu majore, putaminum orbi, saporis grati et dulcis.

Amygdalae amarae. *Migdaty gorzkie*. Nuclei amari acido chyazico, animalibus nōxio, nec non oleo pingui referti, provenientes ex varietate Amygdali communis fructu minore.

Rejiciantur fractae, rancidae, maculisque flavis notatae.

mylum. *Krochmal*.

Triticum hybernium et *Triticum turgidum*. *Plantae cereales biennes cultae*.

Pulvis subtilissimus, albus, insipidus, e farina seminum, relicto principio glutinoso et saccharino, aqua frigida elotus, vel praevis seminum fermentatione, eorum conquassatione, atque edulcoratione pulveris praeparatus, qui aqua coctus in muciginem vertitur, sed a frigida neutiquam solvitur, neque colorem tincturae Heliotropii in rubrum mutat.

Antimonium crudum s. Stibium sulphuratum nigrum *Szpisglanc, Siarczyk antymonu.*

Minera Stibii sulphurati, per eliquationem in vasis clausis a matrice purgata, crystallis acicularibus nitentibus conspicua.

Argentum. *Srebro.*

Metallum album, ductile, via sicca oxygenium respuens, oxydatum cum acido muriatico connubium indissolubile contrahens. In acido nitrico solutum sit limpidum, ne viridescens, nec Liquore ammonii causti supersaturatum, saphireum colorem induens.

Arsenicum album. *Arszenik biały.*

Arsenicum oxydatum, e mineris Arsenici Cobalti et alijs sublimando paratum, massam refert siconformem, compactam, albam recens subpellucidam, tempore opacam, in aqua solubilem.

Efficacissimum venenum.

In igne fumi albi instar avolat, nidorem alliaceum spargens.

Asa foetida vulgo **Gummi Asa foetida**. *Czarcie łayno, Asafeta*.

Ferula Asa foetida. Planta perennis Persiae.

Succus gummeo - resinosus, lactis instar e radice sauciata effluens, contactu aëris in grumos vel flavescentes, vel e fusco roseos, subdiaphanos, tenaces, lentescens; saporis ex acri amaricantis, odoris alliacei nauseosi.

Baccae Berberidis. *Berberys*.

Berberis vulgaris. Frutex Poloniae.

Baccae oblongae, rubrae, peracidae.

Baccae Juniperi. *Jałowiec*.

Juniperus communis. Arbor aut frutex Europae borealis.

Baccae spuriae, nigrae, pulpa subamaro-dulci, oleo aethereo graveolente sociata, repletæ.

Baccae Lauri. *Bobki laurowe*.

Laurus nobilis. Arbor Asiae et Europae meridionalis.

Fructus rotundati, nigricantes, odoris aromatici subingrati, ob oleum quidem aethereum unguinoso nuptum.

Balsamum Copaivae. *Balsam
Kopachu.*

Copaifera officinalis. Arbor Americae meridionalis, in Brasilia frequens.

Liquor oleoso resinosus ex vulnerata arbore stillans, pellucidus, flavescent, odoris fragrantis, saporis amaricantis subacris. Spiritui vini vel aquae instillatus non lactescat, nec ferro candenti inspersus Terebinthinam redoleat.

Balsamum Indicum s. Peruvianum nigrum. *Balsam Indyski.*

Myroxylon perui ferum. Arbor Americae meridionalis, maxime regni Granadensis novi.

Liquor oleosus propriae indolis, spissiusculus, ex nigro rubens, saporis acris aromatici, odoris suavis, Acidum proprium, benzoico compar, continens. Fit e ramulis, fortassis ope destillationis per descensum. Bullienti aquae instillatum separatur in partem leviolem, quae aquae pelliculam superinducit, et in partem graviolem, quae fundum vasculi petit. In Spiritu vini fere rectificatissimi partibus tribus limpide solvitur, relictis grumis, lateribus vasis adhaerentibus; connubium olei adeo respuit, ut admixtione ejus spissius reddatur.

Benzoë s. **Asa dulcis.** *Benzoës.*

Styrax Benzoë Dryanderi. Arbor Indiae orientalis, prae caeteris in Sumatra frequens.

Balsamum e cortice trunci et ramorum exsudans, Acidum proprium volatile continens, subfuscum, frustulis albis immixtis variegatum, friabile, nitens, saporis subacris et odoris pergrati, praesertim dum liquatur.

Bismuthum, vulgo **Marcasita.**
Bizmut.

Metallum perquam fragile, ex albo subrubicundum, lamellis compositum, leni igne admoto liquescens, Acido nitrico solutum ab aqua sub forma oxydi albi praecipitatur.

Boletus igniarius. *Hubka.*

Boletus igniarius. Per totam Poloniam frequentissimus.

Fungus tenuissime porosus, superne cinereus, margine albescens, inferne albidus. Quercubus, Betulis et Fagis adhaeret.

Boletus Laricis s. **Agaricum.**
Gębka modrzewowa.

Boletus Laricis Jacquini. In truncis senescentibus Pini Laricis Europae australioris obuius.

Fungus suberosus, tubulis subtilissimis instructus, demto cortice subaurantiaco sicca-

tus, extus cinereus, intus albus, levis, fragilis, saporis subdulcis, amaricantis, acris.

Borax. *Borax.*

Tincal, Asiae mediae sal nativum, ex Acido boracico Natro supersaturato, et dimidia circiter parte aquae crystallisationis constans, peracta depuratione et crystallisatione nomine Boracis insignitur. Albus sit, crystallinus, leni igne tumescens, auctiore facile vitescens, cum acidis non effervescens, et in aqua solutus ab adfuso Liquore Kali carbonici nullum praecipitatum demittens.

Cacao. *Kakao.*

Theobroma Cacao. Arbor in Americae regionibus calidioribus sponte crescens et culta.

Semina ovato-oblonga, plana, e fusco nigricantia, Oleo unguinoso miti turgida, saporis subamari grati.

Calcaria, Calx. *Wapno.*

Terra propria seu oxydum calcii, quae in spatho calcareo, creta, marmore albo, et in variis animalium testis, v. g. in Testis Ostrearum, aliisque, acido carbonico juncta invenitur, et connubio cum acidis salia genuina sistit. Sit alba et maculis rubiginosis expers.

Calcaria usta vocatur per ustionem acido carbonico et aqua orbata; adfusa aqua ca-

lescens cum strepitu fatiscat. *Cracoviensis*
aliis venalibus longe praeferenda.

C a m p h o r a. *Kamfora.*

Laurus Camphora. Arbor in Japonia
frequens.

Substantia peculiaris, nitida, glaciei instar
pellucida, levis, pinguiuscula, tota volatilis,
odoris proprii fragrantissimi, saporis acris
aromatici, in Spiritu Vini ex toto solubilis.
Leni igne liquata instar olei fluit, et accensa
deflagrat omnis. Colligitur destillatione ra-
dicum, ligni et ramulorum cum aqua. Cruda
in granulis globosis, diaphanis ex India al-
lata, nova sublimatione in frusta semiorbi-
culata, subtus concava concrevit.

C a n e l l a a l b a. *Biały Cynamon.*

Canella alba Murrayi. Frutex Jamai-
censis.

Cortex interior rigidus, durus, convolu-
tus, tam foris quam intus albicans, saporis
aromatici acris, odoris debilioris.

C a n t h a r i d e s. *Muchy Hiszpańskie.*

Meloë vesicatorius s. *Lytta vesi-*
catoria Fabricii.

Insecta coleoptera oblonga, colore ex vi-
ridi-aureo splendentia, antennis nigris fili-
formibus, odoris ingrati, principio caustico
erodente praedita, mense Junio et Julio, dum
Fraxinum, Syringam et Ligustrum gregarie
depascunt, colligenda et leniter siccanda.

Cardamomum minus. *Kardamon
mnieyszy.*

Elettaria Cardamomum. Maton.
Planta perennis palustris Indiae orientalis.

Semina parva subnigra, angulosa, sapore intense aromatico, odore fragrante camphoraceo, pericarpio triquetro fragili, utrinque acuminato, e luteo subfusco, longitudine semipollicari, inclusa.

Caricae, s. Ficus passae. *Figi.*
Ficus Carica. *Arbor Europae meridionalis et Orientis.*

Receptacula succulenta, pulposa, principio saccharino et mucilaginosa imbuta, semina includentia.

Caryophylli. *Gwoździki kramne.*

Caryophyllus aromaticus s. *Eugenia caryophyllata* Thunbergii.
Arbor Indiae orientalis, in insulis Moluccis frequens.

Fructus immaturi germina cum rudimento florum, e fusco nigricantia, claviculis forma similia, oleo aethereo turgentia, saporis acris quam maxime aromatici, odoris fragrantissimi.

Castoreum. *Stróy bobrowy.*

Castor Fiber.

Substantia animalis subfusca, recens molliuscula, exsiccata friabilis, membranulis te-

nuioribus intertexta, odoris proprii nauseosi, saporis amaricantis subacris, propriis in folliculis coriaceis abdomini adnatis secreta.

Castoreum Sibiricum s. Russicum, cui etiam Polonicum, Borussiae et Germanicum adnumerantur, in folliculis magnitudine ovi gallinacei et supra, *Castoreo Canadensi*, aut *Anglico* sic dicto longe antecellit.

Catechu, vulgo **Terra Japonica**.
Sok katechowy.

Acacia Catechu. Arbor Bengalensis.

Extractum aquosum, ligni arboris interioris, vel, prout alii malunt, nucleorum, induratum, fragile, e nigro et luteo fuscum, in fractura nitens, odoris nullius, saporis adstringentis, deinde subdulcis, in Spiritu Vini et in Aqua calida aequè solubile.

Cera flava. *Wosk żółty.*

Apis mellifica. Insectum hymenopterum.

Substantia vegetabilis propriae indolis, oleosa, indurata, flava, tenax, e favis liquata, saporis mitis, odoris haud ingrati, spiritu vini fere indissolubilis.

Cera alba. *Wosk biały.*

Cera per aplicationem, sub frequente aquae adpersione, albata.

Cerasa acida. *Wiśnie kwasne.*

Prunus Cerasus; varietas, quae vernacula, czarne kwasne wiśnie audit. Arbor in pomariis frequentissima.

Drupae nigrae, grata aciditate praeditae.

Cerussa alba. *Bleywas.*

Plumbum carbonicum corrosione plumbi metallici vapore aceti paratum. Sit album, ponderosum, nec creta aut aliis heterogeneis vitiatum.

Cetaceum, vulgo Sperma Ceti. *Olbroc.*

Physeter macrocephalus. Oceani incola, mammale.

Substantia sebacea ventriculorum cerebri, quae ab adipe oleosa separata, in massam induratur candidam, subpellucidam, lamellosam, tactu pinguem, sapore mitem, in Spiritu Vini calido et in Aethere solubilem.

Cinnabaris. *Cynober.*

Oxydum Hydrargyri sulphure mineralisatum, nativum, rubrum, circiter septimam partem sulphuris complectens. Ex adfuso acido nitrico fuscum colorem ne induat.

Cinnamomum verum. *Cynamon prawdziwy.*

Laurus Cinnamomum. Arbor Ceylonica.

Cortices convoluti, flexiles, tenues, ex

variis laminis regali charta non crassioribus conflati, glaberrimi, odore proprio fragrantissimo, sapore aromatico linguam feriente, quadantenus dulci instructi.

Cineres clavellati, Potassa cruda. *Potaż.*

Massa salina e cineribus maxime lignorum duriorum elixata, Kali carbonico dives, praeterea salia alcalina, terrea, itemque terram siliceam cum Kali caustico intime junctam, continens. Quo facilius in aqua solvitur, et quo minus terrae siliceae ab adfuso acido quocunque praecipitatur, eo melior habenda.

Colocynthis. *Kolokwintyda.*

Cucumis Colocynthis. *Planta annua orientalis.*

Fructus a cortice exteriori mundatus, pomi magnitudinis et figurae, semina albicantia, in substantia alba, levi, spongiosa, amarissima includens.

Colophonium. *Kalafonia.*

Pinus sylvestris. *Arbor, qua Europa borealis abundat.*

Resina diaphana, super ignem liquata consistentiam friabilem et colorem ex succineo aurantiacum nacta.

Conchae. *Skorupy ostrzygowe.*

Ostrea edulis. *Maris Germanici incola.*
Testae, ab omni sorde depuratae.

Cornu Cervi. *Róg ieleni.*

Cervus Elaphus.

Cortex Angusturae, Cortex
Cuspariae. *Kora Angustury.*

Cusparia febrifuga Bonplandi. *Ar-*
bor Terrae firmæ Americae.

Cortex externe e fusco ochroleucus, sub-
rugosus, interne ex luteo subfuscus, sapo-
ris subaromatici, subacris, et amari. Caven-
dum est, ne substituatür Cortex spurius ex
India orientali allatus, summe deleterius, ex-
terne maculis rubiginosis notatus, interne
subniger, saporis intense amari, nauseosi,
solutionem Ferri sulphurici nigrificans.

Cortices Aurantiorum. *Skórki*
pomarańczowe.

Citrus Aurantium. *Arbor Orientis*
et Europae meridionalis, item Indiae occi-
dentalis et Americae meridionalis, apud nos
in hybernaculis culta.

Cortex fructus maturi, amaritie non in-
grata, odore suavi.

Cortex Cascarillae. *Szakaryla.*

Croton Eluteria. *Frutex amaicae*
aliarumque regionum Americae calidioris.

Cortex extus cinereus, subtus ex fusco fer-
rugineus, fragilis et in fractura nitens, sa-
poris acris amari, prunis injectus gratum,
quasi moschatum spargens odorem.

Cortex Chinae regius s. flavus. *China Królewska.*

Cinchona cordifolia Mutis. *Arbor Americae australis.*

Cortex ex eadem regione ac sequens allatus, cinnamomeo flavus, crassior, magis lignosus, fractura fibrosus, interdum epidermide fusca transversim fissa, licheneque albo obsita, inductus, principio amaro subaromatico aliis Cinchonae corticibus antecellens.

Frustula longitudinaliter rugosa, exhibitaeque maculas farinosas, albas, interdum nigris punctis obsitas, sunt rejicienda.

Cortex Chinae fuscus s. officinalis; Cortex Peruvianus, olim Cortex Kina Kinae. *China brunatna.*

Cinchona Condaminea Humboldt. *Praestat cortex in provincia Loxa collectus. Cortices vulgaris Chinae e variis speciebus Cinchonae in jugis Alpibus Americae australis colliguntur.*

Cortex convolutus, ponderosus, ex fusco griseus, plerumque lichene albido vestitus, odoris submucidi, saporis ex amaro subaromatici, subadstringentis.

Corticis bonae notae decoctum, dum calet, rubicundum apparet, refrigeratum autem pallidum fit et sedimentum dejicit.

Cortex Chinae ruber. *Czerwona China.*

Cinchona oblongifolia Mutis?

Cortex e fusco ruber, cujus frustula ponderosiora, plerumque etiam crassiora, occurrunt. Principio resinoso et adstringente praeter caeteris Cinchonae corticibus eminet.

Cortex Geoffreae Surinamensis. *Kora Surynamska.*

Geoffrea inermis Swartzii. *Arbor in sylvis Surinamiae frequens.*

Cortex crassus, fibrosus, externe, ubi lichenibus cinereis tegitur, ex fusco nigricans, interne subfuscus, odoris, si recens est, nauseoso-ingrati, saporis amaricantis austeri.

Cortex Granatorum, Malicorium. *Kora Granatowa.*

Punica Granatum. *Arbor, quae in utraque India, in Europa meridionali, et imprimis in Hispania nascitur.*

Cortex fructus e fusco rubens, coriaceus, durus, inodorus, saporis amaricantis, valde adstringentis.

Cortex Guajaci. *Kora Gwaiakowa.*
Guajacum officinale. *Arbor Indiae occidentalis.*

Cortex lignosus, durus, ponderosus, lamellis cinereis aut fuscis compositus, super-

ficie externa e cinereo nigricans, saporis subacris, amaricantis, odoris nullius.

Cortex Hippocastani. *Kora ka-sztanów dzikich.*

Aesculus Hippocastanum. *Arbor Persiae borealis, nunc in Polonia vulgaris.*

Cortex biennium trienniumque ramorum, amarus, adstringens, subluteus, epidermide superinductus ex rubro fusca.

Cortex Mezerei. *Wilcze tyko.*

Daphne Mezereum et *Daphne Laureola.* *Frutices Poloniae, Galliae, Hispaniae, et Germaniae.*

Cortex tenuis, striatus, subluteus, epidermide ex viridi fusca superinjectus, peracris, externe applicatus cutim erodens.

Cortex Pruni Padi. *Kora czeremchowa.*

Prunus Padus. *Arbor silvatica indigena.*

Cortex ramorum biennium recens, amaro-aromaticus, principio chyzico - narcotico abundans, ante foliorum eruptionem colligendus.

Cortex Quassiae. *Kora kwasyi.*

Quassia excelsa? *Arbor Americae meridionalis, Jamaicae potissimum et Guianae.*

Cortex tenuis, fragilis, peramarus, ex albo cinereus.

Cortex Quercus. *Kora dębowa.**Quercus Robur. Arbor indigena.*

Cortex biennium trienniumque ramorum,
amarus, adstringens.

Cortex Salicis laureae. *Kora wiérzbowa.**Salix pentandra. Arbor in Polonia haud infrequens.*

Cortex tenuis, flexilis, extrorsum fuscus,
sapore adstringente, amaro haud ingrato. —
Non multum ab hoc distat Cortex Salicis
fragilis, ubivis obviae.

Cortex Simarubae. *Kora symaruby.**Quassia Simaruba. Arbor Americana,
in Guiana perfrequens.*

Cortex radicis coriaceus, fibrosus, ex albo
lutescens, peramarus, odoris nullius.

Cortex Ulmi interior. *Kora więzowa.**Ulmus campestris et effusa. Arbores
Poloniae.*

Cortex medius subfuscus, subacris, lamel-
lis tenuibus compositus.

Crocus. *Szafran.**Crocus sativus officinalis. Planta per-
ennis Europae australis et Orientis, in iis-
dem regionibus culta.*

Stigmata e floribus resecta, e luteo rufe-

scentia, tripartita, basi gilva, sapore amari-
sculo aromatico, odore fragranti narcotico,
et principio extractivo ditissima.

Cubebae. *Kubeba.*

Piper Cubeba s *Piper caudatum* Bergii.
Frutex Indiae orientalis.

Fructus pedunculati, globosi, coloris ci-
neriei, magnitudine et forma piperis, odoris
fragrantis, saporis acris, aromatici.

Cuprum. *Miedi.*

Metallum ductile, rufum, Acido carbonico
nuptum colorem viridem, et a Liquore Am-
monii caustico saphireum induens.

Elemi. *Elemi.*

Amyris Ceylanica. *Arbor Indiae orien-
talis;* item *Amyris Elemifera*, *Arbor
Americae meridionalis.*

Resina e trunco arboris vulnerato liquide
stillans, mox indurescens, ex albo lutea,
pinguis, subpellucida, digitis agitata tenax,
odorem foeniculi quodammodo spirans. Ex
Oriente allata Americanae antecellit.

Euphorbium vulgo Gummi Eu-
phorbium. *Euforb.*

Euphorbia officinarum, et forsan non-
nullae aliae *Euphorbiae* species. *Frutices
Africae meridionalis.*

Succus lactescens, e planta vulnerata stil-

lans, in aprico in frustulis multiformibus condensatus, squalide flavescens, friabilis, saporis acerrimi urentis, nauseosi; prunis injectus odorem haud ingratum spargens.

Fel Tauri. *Zółt wołowa.*

Bos Taurus domesticus.

Liquor genuinus vesiculae felleae e luteo viridescens; putredinis sit expers, et ex sano animali sumtus.

Ferrum. *Żelazo.*

Metallum e cinereo nigrescens, magneti obediens, quod acidis solutum, ab infuso Gallium colore nigro, a Kali ferro-chyazico colore saturate coeruleo, praecipitatur.

Flores Arnicae. *Kwiat pomórnikowy, Tranku górniego.*

Arnica montana. *Planta perennis Germaniae.*

Flores compositi radiati lutei, saporis ex acri emericantis, digitis confricati sternutationem moventes, squamulis calycinis brevioribus lanceolatis, apice purpureis.

Flores Aurantii s. Naphae.
Kwiat pomarańczowy.

Citrus Aurantium.

Florum recentium corollae albae, succulentae, odore fragrantissimo suavi, sapore

subamaro aromatico. Lenissimo calore siccatae, vitro probe clauso servantur.

Flores Chamomillae romanae.

Rumian włoski.

Anthemis nobilis. Planta perennis Europae meridionalis.

Flores compositi radiati, receptaculo fere plano paleaceo, flosculis disci flavis, saporis aromatici, odoris gravis, flosculis radii albis numerosis, brevibus, fere insipidis.

Flores Chamomillae vulgaris.

Rumian pospolity.

Matricaria Chamomilla. Planta annua in Polonia frequens.

Flores compositi radiati, receptaculo conico nudo, intus cavo, flosculis disci flavis, amaris et fragrantibus, flosculis radii albis, reflexis, insipidis.

Flores Convallariae majalis

s Flores Liliorum convallium. *Kwiaty konwaliowe, lanuszkowe.*

Convallaria majalis. Planta perennis silvatica Poloniae.

Corollae campanulatae, albae, dum vigent suaveolentes, siccatae sternutationem moventes.

Flores Granati s. Balaustia.
Kwiat granatowy.

Punica Granatum.

Flores petalis coccineis et calycibus coriaceis rubris, principio adstringente praediti.

Flores Lavendulae. *Kwiat lawendowy.*

Lavendula Spica. Fruticulus Europae australis, apud nos in hortis cultus.

Corollae cylindricae coeruleae, odoris aromatici gratissimi.

Flores Malvae arboreae. *Czarna róża.*

Althaea rosea Cavanilles. Planta biennis orientalis, in hortis Poloniae frequenter culta.

Corollae mucilaginosae, atrofuscae.

Flores Malvae vulgaris. *Kwiat szlazowy.*

Malva rotundifolia, et Malva silvestris. Plantae perennes, in ruderalis frequentissimae.

Flores mucilaginei, corollis vel albis, vel coerulescentibus, vel rubicundis, venis aut rubris aut coeruleis pictis.

Flores Meliloti citrini. *Kwiat nostrzykowy.*

Melilotus officinalis. *Planta annua per totam Poloniam frequens.*

Rami florentes, floribus luteis, odorem proprium subdulcem gravem spirantibus.

Flores Millefolii. *Kwiat krwawnikowy.*

Achillea Millefolium. *Planta perennis frequentissima, floribus albis et rubicundis.*

Flores compositi exigui, saporis amari subacris, odoris subaromatici.

Flores Rhoeados. *Kwiat maku zaięczego.*

Papaver Rhoeas. *Planta annua, inter segetes frequentissima.*

Petala rubra, mucilaginoso, odoris subnarcotici.

Flores Rosarum incarnatarum. *Róże centyfoliie.*

Rosa centifolia. *Frutex in hortis frequens.*

Petala pallide rubentia, odoris gratissimi et saporis subadstringentis.

Flores Rosarum rubrarum. *Róże damasceńskie.*

Rosa gallica s. damascena. *Frutex Gallicae meridionalis, apud nos hortensis.*

Flos nondum evolutus a calyce et antheris mundatus, e fusco rubens, sapore adstringente.

Flores Sambuci. *Kwiat bzowy.*

Sambucus nigra. Arbor per totam Poloniam frequentissima.

Cymae florentes, floribus albis, odorem proprium non ingratum exhalantes.

Flores Tanaceti. *Kwiat wrotyczowy.*

Tanacetum vulgare. Planta perennis, ad vias et inter segetes frequens.

Flores flosculis tubulosis flavis compositi, sapore amaro et odore aromatico, subnauseoso.

Flores Tiliae. *Kwiat lipowy.*

Tilia Europaea. Arbor Europae frequens.

Flores sine bracteis, albi, fragrantis, quinquepetali, calyce quinquefido, aestivationis tempore collecti.

Flores Verbasci. *Dzięwanna.*

Verbascum Thapsus. Planta biennis, in locis incultis frequens.

Corollae mucilaginosae luteae, odoris rosacei debilis.

Flores Violarum. *Fiołki.*

Viola odorata. Planta perennis silvatica,
in hortis frequenter culta.

Petala intense coerulea odore grato.

Folia Aurantii. *Liście pomarań-
czowe*

Citrus Aurantium.

Folia ovato-acuminata, glabra, appendice
cordata, ad basin aucta, saporis amaricantis,
odoris fragrantis.

Folia Lauro-Cerasi. *Liście lauru
lub wawrzynu wiśniowego.*

Prunus Lauro-Cerasus. Arbor Orientis
sempervirens, in hortis culta.

Folia oblongo-ovata, nitida, coriacea, prin-
cipio chyzico-narcotico, summe deleterio,
dotata.

**Folia Rhododendri Chrysan-
thi.** *Liście róży syberyjskiej.*

Rhododendron Chrysanthum. Frutex
Siberiae orientalis.

Folia oblonga, venosa, rigida, narcotica,
saporis amaro-adstringentis. Folia Rho-
dodendri ferruginei, subtus ferruginea,
tomentosa, hisce saepius intermixta, sedulo
segreganda.

Folia Sennae. *Liście senesowe.*

Cassia Senna. Suffrutex in Aegypto superiori, Nubia, regno Tripolitano frequens.

Folia ovato-acuta, inaequalia, e flavo viridia, longitudine semipollicari, sapore sub. acri, amaricante, subnauseoso. Eligenda, quae ex Alexandria advehuntur.

Folia Uvae ursi. *Liście niedźwie-
dziego grona, borówkowe.*

Arbutus Uva ursi. Fruticulus Poloniae sempervirens.

Folia obovata, duriuscula, superficie inferiore non punctata sed reticulata, saporis adstringentis.

Formicae. *Mrówki.*

Formica rufa.

Insectum hymenopterum, Acido volatili proprio praeditum.

**Fructus Capsici annui s. Pi-
per Hispanicum.** *Pieprz tu-
recki.*

Capsicum annuum. Planta annua Americae australis, apud nos in hortis culta.

Bacca carnosio-membranacea, oblonga, conica, nitida, coloris rubri, seminibus albidis compressis repleta, saporis piperei fervidi.

Fructus Mororum. *Morwy.*

Morus nigra. Arbor originis Sinicae, in Europa culta.

Baccae compositae nigrescentes, succo acidulo grato turgidae.

Fructus Prunorum. *Śliwki.*

Prunus domestica. Arbor Europae australis, in Poloniae pomariis frequens.

Drupae oblongae nigrescentes, pruina coerulescente adpersae, pulpa subdulci repletae.

Fructus Ribium rubrorum.

Porzeczki.

Ribes rubrum. Frutex Poloniae, in hortis cultus.

Baccae globosae, rubrae, subdiaphanae, succo acido grato turgentes.

Fructus Rubi Idaei. *Maliny.*

Rubus Idaeus. Frutex Poloniae silvaticus in hortis cultus.

Baccae compositae, subrotundae, rubentes, succo subacidulo grato, et odore proprio suavissimo.

Gallae. *Galas.*

Quercus infectoria. Arbuscula orientalis.

Nidi Cynipis foliorum Quercus, globosi, tuberculati, principio scytodephico, acido proprio nupto, repleti. Praeferuntur e ni-

gro coerulescentes, ex Aleppo et Smyrna allatae.

Glandes Quercus. *Zotqdz.*

Quercus Robur.

Fructus maturi sine cupulis. Recenter carpi statim siccentur clibano non nimis calefacto.

Galbanum s. Gummi Galbanum. *Galban.*

Bubon Galbanum Frutex in Arabia, Syria et India orientali sponte crescens.

Gummi-resina, trunco transversim secto effluens, in grumos luteo-albidos et fuscos indurescens, subtenax, saporis amaro-acris, odoris gravis subnauseosi, oleo aethereo dives.

Gummi Mimosae s. Gummi Arabicum. *Guma arabska.*

Acacia vera, Senegal et gummifera; aliaeque hujus generis species Mimosae Linnaei, in variis Africae regionibus sponte crescentes.

Gummi pellucidum, albicans aut flavesceus, diffractum nitens, saporis viscidifacui, odoris nullius, in aqua ex toto solubile.

Gummi Tragacanthae. *Guma Dragant.*

Astragalus creticus Lamarck, et Astra-

galus gummifer Labillardiere. *Frutices*, quorum alter in monte Ida insulae Cretae crescens, gummi optimum album, alter in Libano occurrens, gummi vilioris notae profert.

Gummi e fruticulis exsudans, in frustulis elongatis, multifarie contortis, condensatum, album, tenax, leve, inodorum, cum aqua mucilaginem spissam saporis fatui formans.

Gutti s. Gummi Guttae. *Gumigut.*

Stalagmitis Cambogioides Murrayi s. Guttifera vera Koenigii. Arbor regni Siamesis, nec non Cambogia Gutta Indiae orientalis.

Succus arboreus gummeo-resinosus, vel e ramulis resectis, vel e cortice trunci vulnerato flavescens emanans, et leni calore inspissatus in massam ex aureo-flavam, fragilem, fractura nitentem, odoris nullius, saporis ex acri subdulcis.

Helminthorton. *Mech korsykański.*

Conserva in mari mediterraneo ad littus frequens, e variis cryptogamis pollicaribus invicem intricatis constituta, tertiam solummodo partem *Ceramii Helminthortos* continet, est ramosa, tenax, saporis subsalsi, nauseosi, et odoris ingrati.

Herba Abrotani. *Boże drzewko.*

Artemisia Abrotanum. Planta perennis

Europae meridionalis et Orientis, nobis hortensis.

Herba amaro-aromatica, foliis multipartitis, e viridi albescentibus.

Herba Absinthii. *Piotun.*

Artemisia Absinthium. Planta perennis frequentissima.

Herba florens, floribus compositis exiguis, subglobosis, pendulis, foliolis lobatis, tomento albo obsitis, sapore peramaro, odore aromatico gravi.

Herba Aconiti. *Turecka bylica, Toiad.*

Aconitum neomontanum Koelle. Planta perennis, in montosis Silesiae, Austriae et Helvetiae frequens.

Folia intense viridia, glabra, palmata, quinquepartita, lobis dissectis, principio narcotico acri praedita. Colligenda sunt e planta sponte nascente, nec in hortis culta.

Herba Althaeae. *Szlaz włoski.*

Althaea officinalis. Planta perennis Germaniae.

Folia triangularia, tomento cinereo molissimo tecta, multa mucilagine repleta.

Herba Arnicae. *Ziele pomórnikowe, Tranku górnego.*

Arnica montana.

Folia ovata, superficie utraque hirta, margine integerrimo, saporis subacris subamari.

Herba Basilici. *Bazylika.*

Ocimum Basilicum. *Planta annua Persiae et Indiae orientalis, nobis hortensis.*

Herba ramosa, interdum purpurascens, foliis ovato-acutis, integris, glabris, punctatis, gratissimum odorem spargens.

Herba Belladonnae. *Wilcza winia, Tesak, Psinki ogrodne wysokie.*

Atropa Belladonna. *Planta perennis Europae meridionalis, in hortis medicis culta.*

Planta narcotica summe virulenta, foliis magnis, petiolatis, integris, ovato-acutis, intense viridibus.

Herba Cardui benedicti. *Ziele bernadyńskie, Turecki czubek.*

Centaurea Benedicta. *Planta annua ex insulis Archipelagi, in hortis medicis culta.*

Herba florens peramara, foliis oblongis, sinuatis, hirsutis, floribus compositis tubulosis luteis, calyce cum foliis adjacentibus ope texturae arachnoideae cohaerente.

Herba Centaurii minoris. *Tysiącznik.*

Erythraea Centaurium. *Planta annua pratensis Poloniae.*

Herba florens, floribus rubentibus, foliis ovatis, saporis amari acris.

Herba Chelidonii majoris. *Jaśkótcze ziele większe, Cendalia.*

Chelidonium majus. *Planta perennis in ruderatis et umbrosis frequens.*

Folia magna, tenuia, sinuata, glabra, odoris ingrati, succo luteo acri repleta.

Herba Chenopodii ambrosiaci s. Botryos Mexicanae. *Stoziarn, Kapucyńska herbata.*

Chenopodium ambrosioides. *Planta annua Mexicana, nobis hortensis.*

Herba florens odoris ambrosiacei, saporis aromatici, racemis foliatis simplicibus, foliis lanceolatis dentatis. *Chenopodium Botrys* foliis obtusis profunde et irregulariter sinuatis, laciniis alternis dentatis distinguitur.

Herba Cicutae aquaticae. *Wodna cykuta.*

Cicuta virosa.

Herba cum radice ante aestivationem collecta. Radix magna, crassa, flavescens vel virescens, geniculis, quibus intus prominentes circuli respondent, distincta, odoris et saporis Apio propinqui. Folia magna bipinnata, pinnis linearibus serratis, glabris; radice minus intensioris odoris, atque saporis.

Herba Cochleariae. *Warzęchwa.*

Cochlearia officinalis. *Planta biennis, ad litora Europae borealis frequens, apud nos in hortis culta.*

Herba florens succulenta, principio acri volatili praedita, foliis radicalibus cordatis, caulinis oblongis sinuatis.

Herba Conii maculati s. Cicuta maculatae. *Swinia wesz.*

Conium maculatum. Planta biennis in Polonia frequens.

Herba obscure viridis, foliis compositis triplicato-pinnatis, foliolis lanceolatis incis glabris, caule et ramis majoribus maculis purpureis aspersis, nidorem nauseosum lotio murino similem exhalans.

Herba Digitalis. *Naparsztnica.*

Digitalis purpurea. Planta montana Helvetiae et Germaniae.

Herba virulenta, foliis ellipticis, rugosis, hirsutis, margine serratis, saporis amari acerrimi. Colligenda planta in montosis sponte crescens, nec in horto culta.

Herba Erysimi. *Gorzycznik.*

Erysimum officinale. Planta annua ad vias creberrima.

Folia longa, laciniato-pinnata, lacinia terminali majore trifida, dentata, scabra, sapore nasturtino non acri praedita.

Herba Farfarae. *Podbiat.*

Tussilago Farfara. Planta perennis Poloniae.

Folia subcordato-angulata, denticulata,

subtomentosa, saporis subadstringentis subamari.

Herba Fumariae. *Ptasia rutka.*

Fumaria officinalis. Planta annua, inter olera et segetes frequens.

Herba subamara, foliis compositis, foliolis trilobatis.

Herba Gratiolae. *Konitrud.*

Gratiola officinalis. Planta perennis in pratis et ad ripas Poloniae.

Herba florens, amaro-acris, foliis lanceolatis serratis, glabris, floribus subalbidis, didyandris, caule rigidiusculo.

Herba Hederae terrestris.

Bluszyk ziemny, Kurdwan.

Glecoma hederacea. Planta perennis frequentissima.

Folia reniformia, crenata, saporis amaricantis, subaromatici.

Herba Hyoscyami. *Bieluń, Szaléy, Lulek.*

Hyoscyamus niger. Planta biennis, in ruderalis et ad vias frequens.

Herba virosa foliis semiamplexicaulibus, sinuatis, hirsutis, odore nauseoso, narcotico.

Herba Hyssopi. *Izopek.*

Hyssopus officinalis. Fruticulus Europae meridionalis, nobis hortensis.

Herba aromatica, foliis lanceolatis glabris.

Herba Lactucae virosae. *Sa-
tata jadowita, Łocyga dzika.*

Lactuca virosa. Planta vulgaris Europae australioris.

Herba caule inferne aculeato, foliis basi sagittatis, apice obtusis, oblongo-lanceolatis duriusculis, glaucis, margine et inprimis carina aculeatis, odore ingrato, sapore acri amaroque ac succo lacteo albo praedita.

**Herba Ledi palustris s. Ro-
rismarini silvestris.** *Dziki
rozmarnyn, Bagno.*

Ledum palustre. Fruticulus in cespitosis et uliginosis Poloniae frequens.

Folia lineari-lanceolata, superficie superiori glabra, saturate viridia, inferiori hirsuta, fusca, sapore amaro adstringente, odore gravi.

Herba Majoranae. *Majeran.*

Origanum Majorana. Planta annua Europae meridionalis, in hortis culta.

Herba aromatica, foliis ovatis obtusis, e viridi albicantibus.

Herba Malvae. Szlaz.*Malva rotundifolia.*

Folia cordato-orbiculata, subquineloba, mucilaginea.

Herba Mari veri. Ambrowe ziele.*Teucrium Marum.* Fruticulus Europae meridionalis et Orientis, prae ceteris in Hispania et Syria frequens.

Herba aromatica, fragrans, foliis ovatis petiolatis, superficie inferiore, una cum petiolis et ramulis tomento albo superinductis, floribus racemosis purpureis.

Herba Marrubi. Szanta.*Marrubium vulgare.* Planta perennis, in ruderatis frequens.

Herba amara, hirsuta, e viridi albicans, foliis ovatis, crenatis, rugosis.

Herba Matricariae. Maruna.*Pyræthrum Parthenium,* Smith. Planta perennis Poloniae.

Rami florentes amaro-aromatici, floribus compositis radiatis, disco flavo, radio albo brevi, foliis compositis planis, foliolis ovatis incisis.

Herba Melissaë s. Melissaë citratae. *Melisa cytrynowa.**Melissa officinalis.* Planta perennis nobis in hortis culta.

Herba aromatica odoris citrei, foliis ovato-cordatis, serratis, subvillosis.

Herba Menthae crispae. *Mienta kędzierzawa.*

Mentha crispa. Planta perennis originis Sibiricae, in hortis culta.

Herba aromatico - amaricans, suaveolens, foliis cordatis, dentatis, rugosis, angulatis.

Herba Menthae piperitae. *Mienta pieprzna.*

Mentha piperita. Planta perennis Angliae, in hortis medicis culta.

Herba foliis petiolatis, ovato-acutis, saporis aromatico - camphoracei, palatum quasi refrigerantis.

Herba Millefolii. *Krwawnik.*

Achillea Millefolium.

Herba amaro-aromatica, foliis bipinnatis, laciniis linearibus dentatis.

Herba Nicotianae. *Liście tabakowe.*

Nicotiana Tabacum. Planta annua Americae meridionalis, apud nos culta.

Folia oblonga, magna, odoris narcotici, saporis acris. Exsiccata fuscum induunt colorem.

Herba Oreoselini. *Opich górny, Pietruszka górna.*

Athamantia Oreoselinum. *Planta perennis, in apricis silvaticis frequens.*

Herba umbellifera, ramosa, foliis decompositis, foliolis ovatis, incisis, glabris, odore suavi subaurantiaco, sapore subaromatico grato.

Herba Origani vulgaris. *Lebiotka.*

Origanum vulgare. *Planta perennis Poloniae.*

Herba aromatica, ramis quadrangulis rubentibus, foliis oppositis ovatis, bracteis ovatis, calyce longioribus.

Herba Roris marini. *Rozmaryn.*
Rosmarinus officinalis. *Frutex Europae meridionalis.*

Folia lineari-lanceolata, pagina superiori intense viridia, inferiori non rubiginosa, odoris et saporis aromatici.

Herba Rubi Chamaemori. *Moruszka.*

Rubus Chamaemorus. *Planta in Sibiriae, Sueciae, Daniae paludibus frequens.*

Herba caule bifolio unifloro, foliis simplicibus lobatis.

Herba Rutae. Ruta.

Ruta graveolens Fruticulus hortensis, Europae meridionalis indigena.

Herba amaro-acris, graveolens, e viridi subcoerulescens, foliis decompositis, foliolis cruciformibus, aestivatione peracta colligenda.

Herba Sabinae. Sawind.

Juniperus Sabina. Frutex Asiae borealis et Europae australis sempervirens, nobis hortensis.

Summitates ramorum foliis oppositis, erectis, decurrentibus, saporis amaro-acris, odoris gravissimi.

Herba Salviae. Szatwia.

Salvia officinalis. Fruticulus hortensis in Europa meridionali sponte crescens.

Herba amaro-aromatica, subadstringens, foliis lanceolato-subovatis, integris, rugosis, crenulatis.

Herba Scordii. Ziele czosnkowe.

Teucrium Scordium. Planta perennis Poloniae.

Herba amara, odoris suballiacei, foliis oblongis sessilibus, dentato-serratis.

Herba Serpylli. Macierzanka.

Thymus Serpyllum. Fruticulus Europaeus, in apricis frequentissimus.

Herba amaro-aromatica, fragrans, caule repente, foliis planis, ovatis, obtusis, basi ciliatis, floribus capitatis purpurascens.

Herba Stramonii. *Tondera.*

Datura Stramonium. *Planta annua, ex America oriunda, nunc ad sepes et ubique in ruderatis frequens.*

Plantae virosae folia ovata, acuminata, dentato-sinuata, venosa, odoris nauseosi, narcotici.

Herba Tanacetii. *Wrótycz.*

Tanacetum vulgare.

Herba amaro-aromatica, foliis bipinnatis, incisis, serratis.

Herba Taraxaci. *Wółowe oczy, Swini mlecz.*

Leontodon Taraxacum. *Planta perennis in pascuis frequentissima.*

Herba amaricans, floribus compositis lingulatis, flavis, foliis runcinatis, denticulatis, laevibus, lactescentibus.

Herba Thymii. *Tymian, Szmer włoski.*

Thymus vulgaris. *Fruticulus hortensis, in Europa meridionali sponte crescens.*

Herba aromatica, caule erecto ramoso, foliis ovatis, revolutis, floribus verticillato-spicatis, albis.

Herba trifolii aquatici s. fibrini. *Tróylist.*

Menyanthes trifoliata. *Planta perennis palustris Poloniae.*

Herba amara, foliis ovatis, ternis.

Herba Veronicæ. *Przetacznik.*

Veronica officinalis. *Planta perennis Poloniae.*

Herba amaricans, caule procumbente, spicis lateralibus pedunculatis, floribus coerulescentibus, foliis oppositis, ovatis, crenatis.

Herba Violæ tricoloris s. Jaceæ. *Fiołek potróyny, Wdówki, Brat z Siostrą.*

Viola tricolor. *Planta annua in arenosis frequens.*

Herba subacris, foliis ovatis, dentatis, floribus calyce glabro duplo majoribus, bina varietate obvia.

Hydrargyrum s. Mercurius vivus. *Żywe srebro.*

Metallum album, ponderosum, volatile, sub nostro coelo liquidum. Reperitur nativum maxima vero parte destillando e mineris cinnabarinis colligitur.

Ichthyocolla s. Colla piscium.
Karuk.

Acipenser Sturio, A. stellatus, A. Huso.
Maris Caspici incolae.

Colla ex intestinis, maxime e vesica natatoria coctione extracta, refrigerio in pelluculas condensata, et dein convoluta. Sit albidula, ponderosa, tenax, in Aqua solubilis.

Kino s. Gummi Gambiense.
Guma Kino.

Arbor Africae interioris nondum satis cognita.

Massa friabilis, opaca, e rubro nigricans, splendens, in Aqua et Spiritu Vini solubilis saporis peradstringentis.

Lacca in ramulis. *Guma Laka.*

Croton lacciferum, Ficus religiosa,
F. indica. Arbores Indiae orientalis.

Massa resinosa, fragilis, succo Cocci Ficus infectorio amoene rubro imbuta, larvas insecti includens, et ramulis etiam, super quibus efformata est, adhaerens.

Lapides Cancrorum. *Kamienie racze.*

Cancer Astacus, Astacus fluviatilis
Fabricii. Insectum apterum.

Concrementa calcarea, alba, orbiculata, una parte convexa, altera sinuata, in Acido nitrico, relictis gelatina, solubilia, texturae la-

mellosae, superficie, qua ventriculo cancri adhaerent, umbilicata. In aquam demersi ne dehiscant.

Lichen Islandicus. *Mech Islandzki.*

Cetraria Islandica. In montibus Silesiae, Thuringiae, Hercyniae, aliisque montosis frigidis Europae borealis frequens.

Lichen amaricans, valde mucilaginosus, coriaceus, sinuatus, lacunosus, superiori pagina cinereus, inferiori fuscus.

Lignum campechianum. *Niebieskie drzewo.*

Haematoxylon campechianum. Arbor Americae calidioris.

Lignum durum, ponderosum, tinctorium, e flavo rubrum, saporis subadstringentis, subdulcis.

Lignum Guajaci. *Swięte, Francuzkie drzewo.*

Guajacum officinale. Arbor Indiae occidentalis.

Lignum ponderosum, compactum, resinoseum, e viridi cinereum, saporis subamari acris, odoris balsamici, haud ingrati.

Lignum Juniperi. *Drzewo iłowcowe.*

Juniperus communis.

Lignum albidum, resinosum, suffitu odorum.

Lignum Quassiae. *Drzewo kwasya.*

Quassia excelsa? *Arbor Indiae occidentalis.*

Lignum albicans, leve, inodorum, saporis amarissimi; a Ligno Rhois Metopii, fraudulenter substituto, cujus decoctum ex adfuso ferro sulphurico nigrescit, bene distinguendum.

Lignum Sassafras. *Drzewo Sassafras.*

Laurus Sassafras. *Frutex Pennsylvaniae, Carolinae, Virginiae et Floridae.*

Radix lignosa, levis, coloris subrubicundi, aut cinerei, saporis subdulcis, odoris foeniculacei, cortice e fusco ferrugineo, spongioso cincta.

Lithargyrum. *Gleyta.*

Plumbum oxydatum semifusum, quod in cupellatione argenti forma squamularum e rubello flavicantium acquiritur. Liquorem ammonii caustici subcoerulescens rejiciatur.

Macis. *Kwiat muszkatowy.*

Myristica moschata. *Arbor aromatica insulae Bandae, celebris inter Moluccas.*

Arillus laciniatus, nucem moschatam in-

star reticuli circumdans, pinguis, coloris e cinnamomeo fusci, odoris et saporis valde aromatici, fragrantis, grati, Spiritui Vini luteum colorem concilians.

M a l t h u m H o r d e i. *Stód ięczmienny.*

Hordeum vulgare et Hordeum hexastychon. Gramina annua cerealia.

Semina hordei, post primam germinationem siccata, ultra annum non servanda.

M a n g a n u m o x y d a t u m n a t i - v u m. *Niedokwas manganu rodzimy.*

Oxydum nigrum, inquinans, ponderosum, in vase clauso ignitum, gas oxygenium largiens. Pulveratum utpote alienis interdum adulteratum rejiciatur.

M a n n a c a n e l l a t a. *Manna.*

Fraxinus rotundifolia Aitoni. Arbor in Calabria et Sicilia frequens.

Succus, tam sponte, quam ex arbore vulnerata stillans, solis calore in massam grumosam, levem, ex albo lutescentem, saporis dulcis subacris, odoris melligeni, condensatus.

M a s t i c h e. *Mastyx.*

Pistacia Lentiscus. Arbor insularum Archipelagi.

Resina in guttis rotundis stillata, pellu-

cida, splendens, coloris ex albedo citrini, prunis injecta suaveolens, sub masticatione tenax, ob principium proprium visco non absinile, quod Spiritu Vini non solvitur.

Mel. *Miód.*

Apis mellifica.

Substantia saccharina, spissiuscula, e nectariis florum ab apibus collecta, et in earum corpore quodammodo modificata.

Mel album s. virgineum. *Lipiec.*
Mel, sponte e favis juniorum apium elic-
tum.

Millepedae. *Stonogi.*

Oniscus Asellus. Insectum apterum, in locis humidis subterraneis frequens.

Insecta oblonga, humore acri repleta, annulis cartilagineis squamosis cincta, dorso cinerei, abdomine albi coloris, quatuordecim pedibus et caudâ acuminata bifida, instructa.

Minium. *Minia.*

Plumbum ustione in oxydum rubrum conversum.

Moschus. *Pizmo.*

Moschus moschiferus. Animal ex ordine pecorum, Asiae mediae locos montosos inhabitans.

Massa unctuosa, saporis amaricantis, odoris peculiaris fragrantissimi diu persistentis,

secreta in folliculo rotundo, extus pilis ob-
sito, abdomini pone umbilicum inhaerenti,
quae una cum folliculo siccata, granula re-
fert e rufo nigricantia, in textu celluloso
deposita.

Eligendus est Moschus Tunquinen-
sis e regno Thibetano et Sinico allatus,
cujus folliculi, magnitudine ovi et ultra, ex-
tus pilis brevibus, rigidis, subfuscis obsiti,
intus membranula fusca tenera vestiti sunt.

Myrrha. *Mirra.*

Amyris Kataf? Forskohl. *Arbor Arabiae
felicis et Aethiopiae.*

Succus resinoso-gummeus, friabilis, levis,
subpellucidus, e flavo rufescens, striis albis
immixtis, saporis amaro-aromatici, odoris
aromatici non ingrati.

Nitrum crudum. *Saletra.*

Sal ex Kali et Acido nitrico a potiori con-
stans, cum Kali muriatico, Calcaria et Ma-
gnesia nitrica inquinatus, qui potissimum
in nitrariis nostris elixando colligitur, rarius
ex India orientali affertur.

Nuces Juglandes immaturae, *Orzechy włoskie niedoyrzate.*

Juglans regia. *Arbor apud nos culta.*

Nuces moschatae, Nuclei mo- schati. *Ga ki muszkato we.*

Myristica moschata.

Nuclei oleosi, subrotundi, ponderosi, extus cinerei, intus e fusco rubentes, saporis aromatici suavis, odoris fragrantissimi.

Nuces vomicae. *Wronie oczy, Kulczyba. Strychnos Nux vomica. Arbor Ceylanica, et Malabarica.*

Semina orbiculata, compressa, tenacia, villis e cinereo argenteis splendentibus obsita, virulentia, saporis summe amari.

Oleum Cajoputi. *Kaiuput. Melaleuca Cajuputi. Arbor Indiae orientalis.*

Oleum aethereum, tenue, in Malabarica et Insula Banda e foliis destillatum, origine flavescens, limpidum, odoris fragrantis camphoracei, saporis aromatici cardamomei, plerumque colore viridi conspueum.

Oleum de Cedro. *Oley cytrynowy. Citri medicae Varietas.*

Oleum aethereum fragrans, subflavescens, e sacculis oleosis corticis fructus maturi expressione collectum.

Oleum laurinum. *Oléy bobkowy. Laurus nobilis.*

Oleum aethereo-unguinosum, e Lauri bacis recentibus exprimendo vel coquendo in Aqua collectum, e flavo viride, spissum quasi granulatum, odoris laurini, in Aethere solubile.

Oleum Olivarum. *Oliwa.*

Olea europaea. *Arbor Europae meridionalis.*

Oleum subviride, e fructibus fere maturis expressum, odoris, dum recens est, p'ne expers. Album nec non odoris rancidi rejiciendum est.

Oleum Ricini. *Oléy kleszczowiny, rycynusowy.*

Ricinus undulatus. *Planta annua Indiae occidentalis, in hortis culta.*

Oleum unguinosum subflavum, e seminibus expressum, in Spiritu Vini rectificatissimo solubile.

Oleum Vitrioli. *Oléy koperwasowy.*

Acidum sulphuricum concentratum, impurum, venale, combustionem sulphuris cum nitro mixti acquisitum, aut e Ferro sulphurico destillatione sicca elicatum. Acido arsenico ne sit conspurcatum.

Olibanum s. Thus. *Kadzidto biate.*

Boswallia serrata. *Arbor in montibus Indiae orientalis crescens.*

Resina granulosa, subdiaphana, ex albidolutescens, fragilis, saporis subamaricantis, odoris, dum accenditur, fragrantis.

O p i u m. *Opium.*

Papaver somniferum. *Planta annua, in Oriente et Aegypto culta.*

Succus lacteus, e pericarpis submaturis vulneratis stillans, condensatus, tenax, coloris e flavido fusci, principio summe narcotico perdives, saporis acris amari, odoris fortis nauseosi.

E viridi nigricans rejiciendum est.

O p o p a n a x. *Panakowy sok.*

Pastinaca Opopanax. *Planta biennis Europae meridionalis et orientalis.*

Gummi-resina subfusca, granulosa, tactu subpinguis, fragilis, saporis amaricantis, acris, subnauseosi, odoris gravis, ad odorem Radicis Levistici accedentis.

O v a g a l l i n a c e a. *Kurze iaia.*

Phasianus Gallus domesticus.

P e t r o l e u m s. O l e u m P e t r a e.
Olèy skalny.

Bitumen liquidum, oleum aethereum referens, flavum aut rubescens, plerumque e rupium fissuris stillans. In oleis, nequaquam in spiritu vini, cui innatat, solubile. Ex Italia et Gallia advehitur.

P i p e r a l b u m. *Pieprz biały.*

Piper nigrum. *Frutex Indiae orientalis.*

Semina fructus maturi, albida, rotunda,

epidermide rubra acriore privata, saporis
ferventis acris.

Poma Aurantiorum. *Pomarańczy.*

Citrus Aurantium.

Fructus immaturi siccati, e viridi nigrescentes, aromatici, amari.

Poma Citri. *Cytryny.*

Citrus medica.

Poma acidula. *Jabłka.*

*Pyrus Malus. Arbor Europae, in hortis
cultae.*

Radix Althaeae. *Korzeń Szlazu
włoskiego.*

Althaea officinalis.

Radix decorticata perennis, teres, intus
alba, multa mucilagine repleta.

Radix Angelicae. *Dzięgiel.*

*Angelica Archangelica. Planta biennis
Norvegiae et Lapponiae, in hortis culta.*

Radix fragrans, fibrosa, capite oblongo,
crasso, extus e flavo rubens, in superficie
segmentorum transversorum alba, maculis
numerosis flavis, oleo aethereo repletis, punctata.

Radix Ari. *Korzeń aronowéy brody
tub obrazkowy.*

Arum maculatum. *Planta perennis Ger-
maniae.*

Radix tuberosa subrotunda, alba, crassi-
tie partis dimidia pollicis; recens sapore
acerrimo, siccata autem, acredine fere or-
bata, farinosa.

**Radix Armoraciae s. Raphani
rusticani.** *Chrzan.*

Cochlearia Armoracia. *Planta perennis
pratensis Poloniae, frequenter culta.*

Radix cylindrica, albida, succulenta, oleo
aethereo summe volatili peracri turgida.

Radix Arnicae. *Korzeń pomórni-
kowy.*

Arnica montana.

Radix horizontalis, infra fibrosa, fusca,
subamara, subacris.

Radix Asari. *Korzeń kopytnikowy.*

Asarum europaeum. *Planta perennis sil-
vestris Poloniae.*

Radix fibrosa, e cinereo fusca, saporis
amaro acris nauseosi, odoris subaromatici.

Radix Bardanae. *Korzeń topia-
nowy.*

Arctium Lappa. *Planta biennis, ubique
obvia.*

Radix ramosa, levis, spongiosa, extus nigricans, intus albida, saporis ex acri subdulcis.

Radix Belladonnae. *Korzeń wilczey wiśni.*

Atropa Belladonna.

Radix sublignosa, ramosa, extus sordide lutea, summe venenosa.

Radix Bryoniae. *Korzeń przestępowy.*

Bryonia alba et Bryonia dioica Jacquin. *Plantae perennes Poloniae.*

Radix fusiformis, praegrandis, alba, in taleolas transversas dissecta, annulis sibi invicem incumbentibus et radiis conspicua, sapore amaro-acri nauseoso.

Radix Calami. *Korzeń tatarakowy.*

Acorus Calamus. *Planta perennis palustris Poloniae.*

Radix amaro-aromatica, fragrans, articulata, spongiosa, crassitie pollicari, junctim cum epidermide rutila viridi siccanda, hac vero destituta, ut minus efficax rejiciatur.

Radix Caricis arenariae. *Czar-ny pierz, Korzeń turzycy.*

Carex arenaria. *Gramen perenne in arenosis Poloniae frequens.*

Radix praelonga, repens, articulata, no-

dosa, extus rubens, alba, saporis subdulcis
farinacei, odoris aliquantulum terebinthinei.

**Radix Carlinae s. Cardopati-
ae.** *Korzeń Dziewięcisiu.*

*Carolina acaulis. Planta perennis mon-
tana Germaniae et Helvetiae.*

Radix ramosa, crassitie pollicis, extus
fusca, intus pallida, saporis peramari, acris,
odoris subaromatici.

Radix Caryophyllatae. *Korzeń
gwoździkowy lub kuklikowy.*

Geum urbanum. Planta perennis frequens.

Radix fibrosa, fusca, intus rubens, odore
et sapore aromatico caryophyllaceo praedita.

Radix Cichorei. *Korzeń podró-
znikowy.*

*Cichoreum Intybus. Planta biennis Po-
loniae, frequenter culta.*

Radix ramosa, subflava, crassitie pollicis,
lactescens, saporis amaricantis.

Radix Colombo. *Kolumbia.*

*Menispermum hirsutum Brotero. Planta
ex Africae littoribus orientalibus oriunda.*

Radix lignosa, extus subfusca, rugosa, in-
tus e viridi lutea, in taleolas transversim
seta, saporis amaro-mucilaginei. Adfertur
ex Insula Ceylan.

Radix Contrajervae. *Korzeń bezoarowy.*

Dorstenia Contrajerva. Planta perennis Americae calidioris.

Radix nodosa et fibrosa, capitulo oblongo tenui, extus rufa, intus alba, saporis aromatici, odoris fragrantis.

Radix Curcumae. *Kurkumel.*

Amomum Curcuma Jacquinii. Planta perennis Indiae orientalis.

Radix oblonga, rugosa, ponderosa, extus lutea, intus intense flava, saporis amaro-aromatici.

Radix Dauci. *Marchew.*

Daucus Carota, var. sativa. Planta biennis Poloniae, in hortis culta.

Radix fusiformis, e flavo rubens, esculenta, succo dulci repleta

Radix Dictamni albi s. Fraxinellae. *Korzeń maciczny; dyptamowy.*

Dictamnus albus. Planta perennis in montosis Germaniae, praesertim meridionalis.

Cortex radiceis albicans, sapore amaricante subacri, odore, si recens est, gravi.

Radix Filicis maris. *Korzeń święto-
Jański czyli paprociowy.*

*Aspidium Filix mas. Swartzii. In silvis
Poloniae frequens.*

Radix oblonga digitum circiter crassa,
undique bulbis oblongo ovatis, incurvatis,
approximatis, nigricantibus, et squamis emar-
cidis ferrugineis obsessa, omne bulbosum et
squamosum ante siccationem radice rescin-
dendum. Radix recens siccata coloris pal-
lide viridis nec non odoris nauseosi vitro
probe clauso servanda.

Radix Foeniculi. *Korzeń kopru-
włoskiego.*

*Anethum Foeniculum. Planta biennis
Galliae meridionalis et Helvetiae, in Polo-
nia culta.*

Radice ramosae rami biennes, crassitie
digiti, saporis subdulcis et odoris grati.

Radix Galangae. *Korzeń gałga-
nowy.*

*Alpinia Galanga Swartzii. Planta peren-
nis Indiae orientalis et Chinae.*

Radix nodosa, teres, dura, crassitie digiti,
extus e fusco rufa, intus rubicunda, saporis
acris amaricantis, odoris aromatici.

Radix Gentianae rubrae. *Ko-
rzeń goryczki.*

Gentiana lutea. Planta perennis alpina.

Radix crassitie pollicis et quod excurrit,
extus e rubro fusca, intus aurantiaca, sa-
poris intense amari.

Radix Graminis s. Graminis
albi. *Korzeń perzu białego.*

*Triticum repens. Gramen perenne, agros
obsidens.*

Radix tenuis, repens, articulata, alba, succo
dulci repleta.

Radix Helenii s. Enulae. *Ko-
rzeń omanowy.*

*Inula Helenium. Planta perennis mon-
tana Poloniae, Germaniae et Helvetiae.*

Radix carnosa, mucilaginea, extus fusca,
intus alba, saporis ex acri amaricantis sub-
nauseosi, odoris subaromatici.

Radix Hellebori albi. *Biata cie-
mierzyca.*

*Veratrum album. Planta perennis mon-
tana Germaniae meridionalis.*

Radix conico - cylindrica, extus cinerea,
intus albida, saporis acerrimi urentis, trita
sternutationem vehementer excitans.

Radix Hellebori nigri. *Czarna
ciemierzyca.*

Helleborus niger. Planta perennis alpina.

Radix fibrosa, capite subrotundo inerte,

fibrillis crassioribus extus subnigris, intus albidis, saporis acris, subamari et nauseosi.

Radix Jalappae. *Korzeń ialapy.*

Convolvulus Jalappa. *Planta perennis mexicana.*

Radices e fusco griseae, ponderosae, compactae, rugosae, pyriformes, vel integrae vel in taleolas dissectae, compositae e virgis concentricis, resinosis, nigricantibus, textu celluloso subfusco distinctis, sapore et odore acri nauseoso.

Radix Ipecacuanhae. *Korzeń ipekakuany.*

Cephaëlis Ipecacuanha. *Planta perennis Brasiliae.*

Radix flexuosa, tenuis, annulis eminentibus inaequalibus numerosis. Constat ex epidermide cinerea, et cortice albicante, fragili, amaro-acri et nauseoso, atque ex parte interiori lignea, subflavescente, insipida.

Radix Iridis florentinae. *Korzeń fiołkowy.*

Iris florentina. *Planta perennis Italiae.*

Radix nodosa, ponderosa, compacta, crassitie pollicis, post resectum corticem alba, punctis subfuscis notata, odore violaceo, sapore amaricante subacri.

Radix Lapathi acuti. *Korzeń ko-*
bylakowy.

Rumex acutus. *Planta perennis Poloniae,*
ad fossas magno numero.

Radix ramosa, superne crassitie pollicari,
extus fusca, intus flavescens, saporis amaro-
acris et subadstringentis.

Radix Levistici. *Korzeń lubczy-*
kowy, łakotnego ziela.

Ligusticum Levisticum. *Planta peren-*
nis alpina, in hortis medicis culta.

Radix fibrosa, carnosa, extus lutescens,
intus albida, saporis atque odoris acris, aro-
matici, subnauseosi.

Radix Liquiritiae. *Korzeń lu-*
krencyowy czyli słodki.

Glycyrrhiza glabra. *Planta perennis Eu-*
ropae meridionalis.

Glycyrrhiza echinata. *Planta perennis*
Russiae meridionalis.

Radix praelonga, cylindrica, lignosa, cras-
sitie pollicis, sapore dulci. Decorticata fla-
vescens, alteri a Glycyrrhiza glabra oriun-
dae, cortice cinereo rugoso instructae, longe
praeferenda.

Radix Ononidis. *Korzeń lisiego*
ogona, wilżyny.

Ononis spinosa. *Planta perennis, in arvis*
et ad vias frequens.

Radix longa, crassitie calami, sapore subacri.

Radix Paeoniae. *Korzeń piwonii-owy.*

Paeonia officinalis. Planta perennis alpina.

Radix tuberosa, tuberibus subrotundis, crassitie pollicis, extus e rubro fusca, intus albida, sapore subamaro, subdulci mixto.

Radix Pimpinellae albae. *Korzeń biedrzeńcowy.*

Pimpinella Saxifraga. Planta perennis in locis arenosis Poloniae.

Radix fibrosa, capite oblongo, crassitie digiti, extus subfusca, intus albida, saporis acris pungentis.

Radix Polygalae amarae. *Korzeń indyczki, koniczy wyczki.*

Polygala amara. Planta perennis montana Hungariae et Galliae meridionalis.

Radix lignea, fibrillis tenuibus subluteis, intus albidis, saporis e subamaro subdulcis. Perperam radix Polygalae vulgaris, fere insipida, passim substituitur.

Radix Polypodii. *Korzeń paprotki.*

Polypodium vulgare. Filix in silvis umbrosis Poloniae frequens.

Radix dentato-articulata, tenax, e rufo fusca, intus e luteo viridescens, saporis dulcis nauseosi, subadstringentis.

Radix Ptarmicae. Korzeń kicha-
wcowy.

Achillea Ptarmica. Planta perennis.

Radix cylindrica, rugosa, gracilis, extus subfusca, intus albida, fibrillis rarioribus obsita, saporis peracris urentis, odoris plane expers.

Substituatur plerumque Radici Anthemidis Pyrethri Linn. in officinis nostris raro occurrenti.

Radix Rhei. Korzeń rąbarbarowy.

Species Rhei, nondum certo cognita. Planta perennis Chinensis.

Radix ex Bucharia Chinae Provincia allata, extus, resecto cortice, ex luteo aut croceo rubens, intus iisdem coloribus, albedo variegata, salivam flavedine tingens, saporis et odoris specifici, nauseosi.

Radix Rubiae. Korzeń marzany,
rety.

Rubia tinctorum. Planta perennis Europae mediae, frequenter culta.

Radix tenuis, repens, e fusco rubra, tinctoria, saporis adstringentis, subamari.

Radix Salep. *Korzeń Salep.*

Orchides variae, imprimis *Orchis Morio*, *O. militaris*, et *O. mascula*. *Plantae perennes pratenses.*

Radices ovato-oblongae, tuberosae, post praeparationem subdiaphanae, ponderosae, e subfusco cinereae, e toto mucilagineae. Praestant e China, Syria et Persia allatae.

Radix Saponariae. *Korzeń mydelniku.*

Saponaria officinalis. *Planta perennis Poloniae.*

Radix fibrosa, submucilaginea, extus rubens, intus flavescens, lignea, saporis subdulcis, deinde amaricantis, subacris. Cum insipida *Lichnitis dioicae* radice, ne eam confundas.

Radix Sarsaparillae. *Sasaparyla.*

Smilax syphilitica Humboldt. *Frutex in regionibus Orinoco fluvio vicinis Americes meridionalis frequens.*

Radix repens, flexuosa, fragilis, farinacea, crassitie calami scriptorii, subrugosa, extus fusca, intus albida, saporis submucilaginei.

Radix Scillae. *Korzeń cebuli morskiej.*

Scilla maritima. *Planta perennis, cujus copia est in oris mediterranei maris.*

Bulbus praegrandis, ponderosus, epidermide e fusco rubente tunicatus. Squamae albiae recentes succo mucilagineo peracri turgent, leni calore exsiccatae saporem peramarum edunt.

Radix Senegae. *Korzeń indyczki wirginiąńskiéy.*

Polygala Senega. Planta perennis Virginiae et Pennsylvaniae.

Radix superne nodosa, inferne in ramos incurvatos desinens, extus e cinereo lutescens, intus alba, saporis guttur vellicantis,

Radix Serpentariae virginianae. *Korzeń wężowniku wirginiąńskiego.*

Aristolochia Serpentaria. Planta perennis Virginiae et Carolinae.

Radix fibrosa, e viridi lutescens, fibris tenuissimis inter se tricatis, saporis aromatici, odoris fragrantis camphoracei.

Radix Taraxaci. *Korzeń młéczu szwiniego.*

Leontodon Taraxacum.

Radix fibrosa, extus fusca, intus alba, saporis e dulci amaricantis.

Radix Tormentillae. *Korzeń kuzego ziela, pępowy.*

Tormentilla erecta. Planta perennis Poloniae.

Radix nodosa, dura, fibrillis numerosis obsessa, extus e rubro fusca, intus dilute rosea, inodora, saporis peradstringentis.

Radix Valerianae minoris. *Korzeń koziołkowy, kozłkowy.*

Valeriana officinalis. Planta perennis Poloniae.

Radix fibrosa, capitulo oblongo quodammodo truncato, fibris subfuscis, tenuibus, hirtis, tenacibus, saporis amaro-acris, odoris gravis, subnauseosi.

Radix Zedoariae. *Korzeń cytwarowy.*

Amomum Zedoaria Bergii. Planta perennis Indiae orientalis.

Radix tuberosa, ponderosa, extus cinerea, intus subfusca, saporis amaro-aromatici, odoris fragrantis subcamphoracei.

Radix Zingiberis albi. *Imbiér.*

Amomum Zingiber. Planta perennis Indiae orientalis.

Radix tuberosa, nodosa, articulata, compressa, rugosa, ponderosa, extus ex albo

cinerea, intus alba, saporis peracris, odoris aromatici.

Resina Guajacina *nativa*. *Żywica gwaiakowa*.

Guajacum officinale.

Resina e fusco viridescens, subdiaphana, friabilis, saporis dulcamari acris, prunis injecta odorem spargens haud ingratum. Genuina cum Gummi Mimosae et aqua trita, caesio colore tingitur.

Resina Pini *s. communis*. *Żywica sosnowa*.

Pinus silvestris et *Pinus Abies*.

Resina aurantiaca, e truncis incisis exsudans, dein indurata et purificata.

Saccharum album. *Cukier*.

Saccharum officinarum. *Planta arundinacea palustris Indiae orientalis, nunc ubique inter tropicos culta*.

Succus principio proprio dulcissimo dives, a mucoso depuratione separatus et in formam concretam redactus.

Saccharum Lactis. *Cukier młeczny*.

Bos Taurus.

Sal essentielle Seri Lactis dulcis, aegre solubile, prae ceteris in Helvetia paratum.

Saccharum Saturni. *Cukier łożwiany, Przyocian łożwiu nieczysty.*

Sal impurum venale, ex oxydo plumbi et acido acetico praedominante constans.

Sal amarum. *Sól gorzka.*

Sal maxima parte e Magnesia sulphurica constans, purissimum largitur aqua Salis schützensis, vilius ex ultimo salis marini lixivio paratur. Ex solutione aquosa adfusus Liquor Kali carbonici insignem copiam Magnesia carbonicae praecipitet.

Sal Acetosellae s. Oxalium. *Sól szczawikowa.*

Oxalis Acetosella, O. corniculata, O. Acetosa.

Kali oxalicum acidulum e succo expresso ope crystallisationis collectum. Aëri expressum in pulverem ne dehiscat, a Bary muriatica praecipitatum in acido nitrico solubile sit.

Sal ammoniacum. *Salmiak.*

Sal ex Ammonia et Acido muriatico constans. In Aegypto e fuligine stercoreum animalium exustorum sublimatur; in variis Europae regionibus connubio artificiali partium constituentium diverse paratur. Bonae naturae sal nec aëre humescat, nec solutum

Baryta muriatica turbidum reddatur, ignique expositum in integrum avolet.

Sal culinare s. Natrum muriaticum. *Sól kuchenna.*

Sal e Natro et Acido muriatico constans, e fodinis salinariis Wieliciae et Bochniae depromptum, apud nos excellit.

Sagapenum. *Sagapen.*

Ferula Persica? Planta perennis Persiae.

Gummi-resina tenax, pinguis, fusca, granulis albis nitentibus subpellucidis mixta, saporis amaro-acris, odoris suballiacei.

Sanguis Draconis. *Smocza krew.*

E variis arboribus Indiae orientalis, praecipue e Calamo Dracone Willdenowii.

Massa resinosa, obscuro-rubra, friabilis, saporis adstringentis, e fructibus exsudans, iisque superinducta indurescens, quae dein calore emollitur, et in globulos formatur. Aliae species Sanguinis Draconis e sauciatis truncis *Pterocarpi Santalini*, *Dra-caenae Draconis* e. s. p. colliguntur.

Species vero Sanguinis Draconis, in Spiritu Vini ex toto non solubiles, variisque quisquiliis et rudimentis fructuum inquinatae, rejiciendae sunt.

Sapo Hispanicus albus. Mydło hiszpańskie.

Sapo domesticus nostras. Mydło domowe.

Sapo hispanicus paratur coquendo oleum Olivarum cum Lixivio Natri caustici; Sapo domesticus paratur, coquendo sebum cum Lixivio Kali caustici, et addendo sub finem Natrum muriaticum. Unus et alter externo solum usui inserviunt, dum ab opificibus non satis puri parari soleant.

Scammonium Halepense. Skammonia, Sok socznicowy.

Convolvulus Scammonia. Planta perennis orientalis. In Syria potissimum ejus frequentia est.

Succus gummeo-resinosus, concretus, cinereus, levis, friabilis, in fractura nitens, madefactus lactescens, odoris nauseosi, saporis acris urentis.

Semen Amomi. Angielskie ziele.

Myrtus Pimenta. Arbor in India occidentali frequens.

Baccae immaturae, globosae, aromaticae, odoris et saporis caryophyllacei, post exsiccationem fuscae, pericarpis rugosis cinctae.

Semen Anisi stellati. *Badyan,*
Anyż gwiazdkowy.

*Illicii species, Illicio anisato perquam
similis, in insulis Philippinis crescens.*

Pericarpia stellata, coriacea, fusca, semi-
nibus ovatis nitidis repleta, odoris aromatici
grati, saporis subdulcis.

Semen Anisi vulgaris. *Anyż.*

*Pimpinella Anisum. Planta annua orien-
talis, in Europa culta.*

Semina rotunda, striata, subviridula, sa-
poris subdulcis aromatici.

Semen Cannabis. *Siemie konopne.*

*Cannabis sativa. Planta annua Europae
borealis.*

Semina rotunda, glabra, oleoso-mucila-
ginea.

Semen Carvi. *Karolek.*

*Carum Carvi. Planta perennis pratensis
Poloniae.*

Semina aromatica, parva, oblonga, striata,
e fusco subincana, odoris fragrantis.

Semen Cinae s. Santonici.

Cytwarowe nasienie.

*Artemisia judaica. Fruticulus in Syria
et Palaestina frequens.*

Semina exigua, oblonga, e flavo viridia,

saporis amaro-acris, odoris aromatici subnauseosi.

S e m e n C o r i a n d r i. *Kolender,*
Koryandr.

Coriandrum sativum. *Planta annua Europae meridionalis, apud nos culta.*

Semina globosa, sublutea, saporis et odoris aromatici non ingrati.

S e m e n C u m i n i. *Kminek.*

Cuminum Cyminum. *Planta annua orientalis, in Europa culta.*

Semina oblonga, striata, e flavo spadicea, saporis et odoris aromatici subnauseosi.

S e m e n C y d o n i o r u m. *Pigwowe*
ziarnka.

Cydonia vulgaris. *Arbor cretensis, in hortis et vinetis culta.*

Semina oblongo-acuta, nitida, fusca, multa mucilagine cincta.

S e m e n F o e n i c u l i. *Nasienie kopru*
włoskiego.

Anethum Foeniculum.

Semina oblonga, striata, e cinereo pallida, odoris subaromatici grati, saporis subdulcis.

Semen Foeni Graeci. Ziarna
fengreku.

Trigonella Foenum Graecum. Planta
annua Europae meridionalis.

Semina subquadrangularia, lutea, dura,
mucilaginea, odoris nauseosi.

Semen Hordei excorticatum.
Kasza pertowa.

Hordeum vulgare et *Hordeum hexa-*
stichon.

Semen Lini. Nasienie lub siemig
lniane.

Linum usitatissimum. Planta annua sa-
tiva Europae borealis.

Semina ovata, compressa, glaberrima, ni-
tentia, fusca, oleoso-mucilaginea.

Semen Lycopodii. Proszek kottu-
nowy.

Lycopodium clavatum. Muscus in silvis
Poloniae frequens.

Pulvis natus subtilissimus, aquam re-
spuens, flammae injectus fulgurans, loco
siccio adservandus.

Semen Papaveris albi. Mak
biały.

Papaver somniferum, Var. *seminibus albis.*

Semina globosa, minima, alba, saporis
oleosi dulcis.

Semen Petroselini. *Nasienie pietruszki.*

Apium Petroselinum. Herba biennis Sardiniae, nobis hortensis.

Semina viridia, oblonga, striata, parva, odoris et saporis ex acri aromatici.

Semen Phellandrii s. Foeniculi aquatici. *Koper wodny.*

Phellandrium aquaticum. Planta perennis palustris Poloniae.

Semina ovato-oblonga, striata, e viridi subfusca, graveolentia, subnauseosa.

Semen Sabadilli. *Nasienie Saba-tyli.*

Veratrum Sabadilla Retzii. Planta perennis Chinensis.

Semina oblongo-acuta, nigra, pericarpio membranaceo fusco tecta, saporis acerrimi nauseam moventis, odoris nullius.

Semen Sinapeos. *Gorczyca czarna.*

Sinapis nigra. Planta annua sativa Poloniae.

Semina exigua, nigricantia, peracria.

Semen Erucae. *Gorczyca biała.*

Sinapis alba.

Priore minorem acredinem possidet.

Semen Stramonii. Ziarna Tondery.

Datura Stramonium.

Semina nigra, reniformia, subrugosa, virosa, summe narcotica.

Sevum ovillum s. vervecinum. Łóy barani.

Ovis Aries.

Pinguedo in capsulis adipalibus renum et in omentis contenta.

Siliqua dulcis. Święto-Jański chleb.

Ceratonia Siliqua. Arbor in Oriente et Europa meridionali frequens.

Siliqua coriacea, compressa, spadicea, longitudine quatuor vel quinque pollicum, pulpa dulci seminibus interiacente, repleta.

Soda s. Natrum carbonicum crudum. Soda.

Soda nativa, in Aegypto, Sibiria, Hungaria, in lacubus sponte exsiccatis, copiose efflorescit. Soda hispanica concrementum refert e coeruleo cinereum, durum, porosum, e combustis plantis maritimis collectum. Hodie Soda venalis plerumque e Natro sulphurico, in officinis salinariis collecto, ope ustionis cum Carbone et Calcaria ab acido sulphurico liberato, parari solt. Depuratione Natrum carbonicum largitur.

Spathum ponderosum. *Spat
cieżki.*

Baryta sulphurica in metallifodinis Hercyniae, Saxoniae aliisque obvia, saepius Ferro et Cupro, rarius Plumbo et Arsenico, nec non Argilla Strontianaque quadantenus inquinata. Sit alba et lamellosa.

Spiritus. *Wyskok.*

Liquor fermentatione vinosa cerealium et destillatione subsequa collectus. *Spiritus frumenti*; e succo uvarum, *Spiritus vini gallicus*; e succo Arundinis sacchariferae, *Rum s. Taffia* vocatur.

Spongia marina. *Gąbka.*

Spongia officinalis. *Zoophyton maris mediterranei et maris rubri.*

Spongia sublutescens, levis, mollis, foraminibus exiguis pervia.

Stannum. *Cyna.*

Metallum album, molle, ductile, cum acido nitrico oxydum album valde refractarium constituens.

Stipites s. Caules Dulcamarae.

Glistnik, wodne psinki.

Solanum Dulcamara. *Frutex in silvaticis paludosis Poloniae frequens.*

Rami biennes vel triennes, cortice tecti

e cinereo subfusco, saporis e dulci amaro-acris, odoris subnarcotici.

S t r o b u l i L u p u l i. *Chmiel.*

Humulus Lupulus. *Planta dioica perennis Poloniae.*

Amenta plantae foemineae matura, saporis amari non ingrati, odoris aromatici, subnarcotici.

S t y r a x l i q u i d u s. *Storax rzadki.*

Altingia excelsa Noronnae. *Arbor Cochinchinae et Javae.*

Balsamum nativum, spissum, e glauco viridescens, acre, aromaticum.

S u c c i n u m. *Bursztyn.*

Bitumen solidum, pellucidum, fragile, citrinum aut flavum, carbonibus impositum, gratum odorem specificum spargens, in destillatione acidum concretum proprium exhibens. Colligitur maxima ex parte in oris Baltici maris, imprimis ubi Borussiae littora et Pomeraniae adluit.

S u c c u s L i q u i r i t i a e. *Sok lukrecyowy.*

Glycyrrhiza glabra et *G. echinata.*

Extractum e fusco nigrum, e radicibus recentibus coctione in aqua paratum et ad siccum fere condensatum; saporis dulcis subacris, in aqua solubile. Ex Hispania et

Sicilia, in massis foliis Lauri obvolutis, ad nos venit. Rejiciatur cupro inquinatum.

Sulphur. *Siarka.*

Corpus solidum, friabile, colore citrino, quod, comburendo Oxygenio nuptum, acidum sistit sulphuricum. Occurrit nativum, maxima autem parte e mineris ferri sulphurati intenso igne expulsum acquiritur, ejusque sublimatum, nomine *Florum Sulphuris* insignitur.

Tamarindi s. Fructus Tamarindorum. *Kwaśne daktyle.*

Tamarindus indica. Arbor Arabiae et Indiae orientalis.

Pulpa e fusco nigra, seminibus siliquarum mixta, filamentis lignosis pertexta, saporis acidi grati. Cupro vel ferro inquinata, rejicienda est.

Tartarus. *Kamień winny.*

Sal nativum succi baccarum Vitis viniferae, instar crustae crystallinae parietibus doliorum vinariorum adhaerens, in officinis Galliae depuratus sub nomine *Crystallorum Tartari* in usum venit. Constat acido proprio, Kali ex parte saturato.

Terebinthina laricina, s. veneta. *Terpentina modrzewowa.*

Pinus Larix. Arbor Europae meridionalis nec non hinc inde in Polonia obvia.

Resina e trunco sauciato effluens, subliquida, tenax, pellucida, flavescens, odoris fragrantis haud ingrati, saporis amaro-acris, oleo aethereo abundans.

Terebinthinam communem vilioris notae Pinus silvestris et P. picea, arbores Europae borealis, frequentissime largiuntur.

Turiones Pini. *Pączki sosnowe.*

Pinus silvestris.

Gemmae foliorum nondum exclusorum. Longitudinem duorum pollicum ne excedant.

Vanilla. *Wanilia.*

Epidendron Vanilla L. s. *Vanilla aromatica* Swartzii. *Planta parasitica scandens novae Hispaniae.*

Siliquae compressae, longitudinis sex fere pollicum, crassitie calami scriptorii, coloris atro-fusci, medulla pingui rufescente fartae, odoris balsamici benzoini, saporis aromatici grati.

Vinum. *Wino.*

Vitis vinifera. *Frutex in vineis cultus.*

Succus baccarum post fermentationem vinosam rite peractam, satis diu in doliis asservatus.

In usum pharmaceuticum maxime veniunt:

Vinum Gallicum album, Rhenanum et Vinum Malacense.

Viscum album.

Viscum album. Fruticulus parasiticus Quercus, Fagi, Tiliae, Pini, aliarumque arborum.

Ramuli juniores, una cum foliis ovatis coriaceis, magna glutinis quantitate repleti.


Zincum. Cynk.

Metallum ex albido coerulescens, rigidum, tenax, calefactum autem malleo obediens. Ignitum, sub aëris accessu flammam concipiens, abit in Oxydum album spongiosum, partim sub flocculorum levissimorum forma avolans.

PRAEPARATA

ET

COMPOSITA.



Acetum aromaticum.

- R. Herbae Absinthii,
— Roris marini,
— Salviae,
— Menthae piperitae, singularum
Uncias duas,
Caryophyllorum,
Radicis Zedoariae, singulorum Un-
ciam dimidiam,
Aceti crudi Libras octo,
Spiritus Roris marini Uncias qua-
tuor.

Post sufficientem macerationem blan-
dam in vase vitreo exprime et sapone,
quo faeces subsideant, liquorem limpidum
separa.

Acetum concentratum.

- R. Kali carbonici Uncias sedecim,
Aceti crudi, quantum sufficit ad perfe-
ctam saturationem.

Liquor filtratus evaporet ad Uncias qua-
draginta, cui in retortam vitream immisso
adde:

- Mangani oxydati nativi subtilissime
triti Uncias duas,
Acidi sulphurici concentrati Libram
unam,
Aquae fontanae Unciis octo
dilatam. Retortae collum ablue cum

Aquae destillatae Unciis quatuor.

Tum adaptato recipiente et juncturis munitis fiat destillatio ad siccum.

Acetum destillatum.

Acetum crudum, addita sedecima parte Pulveris carbonum, destillet e retorta vitrea, quamdiu prodit limpidum et ab empyreumate liberum.

Acetum Rosarum.

R. Florum Rosarum rubrarum Uncias tres,

Aceti crudi Libras duas.

Post macerationem frigidam in lagena vitrea, cola.

Eodem modo paretur

Acetum Convallariae majalis.

Acetum Rubi Idaei.

R. Fructuum recentium Rubi Idaei Libram unam,

Aceti crudi Libras duas.

Seponantur in lagena vitrea per mensem, deinde cola et serva.

Acetum saturninum.

(Liquor Acetatis Plumbi).

R. Minii Uncias quatuor,

Aceti destillati Libras tres.

Coque in vase fictili vitreato continuo agitando, donec liquor filtratus colorem coeruleum chartae heliotropio tinctae in rubrum non commutet, sitque talis pon-

deris specifici, ut ejus Libra dimidia impleat vas Aquae destillatae nonnisi Uncias quinque continere capax.

Acetum scillinum.

R. Radicum Scillae siccatarum Uncias duas.

Minutim scissis adfundantur

Aceti crudi Librae duae,

Spiritus Vini rectificati Unciae tres.

Macerentur leni calore. Liquor leviter expressus subsidendo clarificetur.

Acidum aceticum.

R. Kali sulphurici pulverati Libram unam.

Acidi sulphurici concentrati Uncias tres,

Aquae communis Libra una cum dimidia

dilutas. Mixta evaporent ad siccum.

Admisce

Natri acetici Uncias novem,

Mangani oxydati subtilissime triti Unciam dimidiam.

Immitte in retortam vitream, et applicato vase recipiente, juncturis optime clausis, ex arena calore moderato destillet liquor, quem super

Natri acetici Unciis tribus

lege artis rectifica et in vase probe clauso serva.

Acidum benzoicum.

R. Calcariae ustae Uncias quatuor,
conspergantur

Aquae communis Unciis duabus,
ut in pulverem fatiscant, quem refrige-
ratum misce exacte cum

Benzoës pulveratae Libra una.

Adfusus

Aquae communis Libris sex,
coque in vase stanneo agitando per
horam dimidiam et cola. Residuum in
colo pulverem binis repetitis vicibus ite-
rum coque per dimidiam horam cum

Aquae communis Libris sex.

Liquor terna decoctione obtentus et
mixtus per subsidentiam decantetur ac
leni igne ad Libram unam evaporet;
cui instilla

Acidi muriatici quantum sufficit,

ut omne Acidum benzoicum praecipite-
tur. Praecipitatum charta bibula collectum
in aqua fervente solve, solutum filtra, et
ad crystallisandum vase tecto sepone. Flui-
dum crystallis supernatans evapora, cry-
stallos collectas Aqua frigida ablue, leni-
ter sicca ac serva.

Acidum muriaticum.

R. Natri muriatici Libras sex.

In retortam vitream capacem immissis
adfunde

Acidi sulphurici concentrati Libras
quatuor,

caute antea dilutas

Aquae communis Libris duabus.

Adaptato vase recipiente amplo, cui insint

Aquae destillatae Librae quatuor,
et juncturis clausis, fiat destillatio igne
primum remissiore, sub finem aucto, ad
siccum. Liquidum elicited supra
Natri muriatici Libram dimidiam
rectifica.

Nota. *Pondus specificum hujus Acidi muria-*
tici est = 1,130: 1,000 Aquae.

Acidum nitricum.

R. Kali nitrici pulverati Libras octo.

In retortam vitream satis capacem im-

missis adfunde
Acidi sulphurici concentrati Libras
quatuor cum dimidia,
dilutas antea caute

Aquae communis Libris tribus.

Applicetur excipulum amplum, cui
Aquae destillatae Librae quinque
antea fuerant immissae. Fiat destillatio
ex arena, igne primum remissiori, sub
finem pedetentim aucto, ad siccum. Acido
elicitio instilla

Argentum nitricum aqua solutum,
quamdiu inde fit turbidum. Seponatur
per aliquot dies. Tum liquorem limpi-
dum decanta, et e retorta, fere ad sic-
cum destillando, rectifica.

Nota. *Pondus specificum Acidi nitrici hoc*
modo obtenti est = 1,250: 1,000 Aquae.

Acidum phosphoricum ex ossibus.
(*Superphosphas Calcis.*)

R. Cornu Cervi, aut aliorum Ossium, ad albedinem ustorum, Libras quinque,

subtilissime pulveratis adde

Acidi sulphurici concentrati Libras tres,

Aquae communis Libris triginta dilutas. Ebulliant leniter per horam in lebetе stanneo, sub continua agitatione. Liquorem ope preli separatum et colatum ad mellis spissitudinem evapora.

Acidum phosphoricum.

R. Acidi nitrici quantum placet.

In cucurbita vitrea ad lenem ebullitionem usque calefacto, immitte sensim accurate

Phosphori

frustula minora, granum unum alterumve non excedentia, quantum acidum nitricum oxydatione consumere valet. Liquidum restans ad spissitudinem oleosam evapora: tunc cum tali Aquae quantitate dilue, ut pondus totius decuplo Phosphori consumpti respondeat.

Acidum succinicum.

R. Succini grossiuscule contusi quantum vis.

Fiat destillatio ex retorta vitrea satis ampla, igne primum lento et successive aucto. Prodibunt una cum Oleo, primum

flavo, dein rubro, Liquor acidulus et Acidum concretum, quibus addatur Aquae fervidae sufficiens quantitas, ad Acidum solvendum. Liquor ab oleo separatus leniter evaporet, filtretur et ad crystallisandum seponatur. Crystalli collectae solutione in Aqua fervente et crystallisatione depurentur.

Acidum sulphuricum concentratum.

Oleum Vitrioli, per rectificationem, e retorta vitrea, arenae balneo immersa, prudenter ac artis lege institutam depurandum est.

Nota. *Pondus specificum sit* $= 1,850: 1,000$ *Aquae.*

Acidum sulphuricum dilutum.

R. Acidi sulphurici concentrati Partem unam.

Instillando misce cum

Aquae destillatae Partibus quinque.

Acidum tartaricum.

R. Tartari depurati pulverati quantum placet,

Aquae communis Quintuplum.

Ebulliant in lebetæ stanneo. Per vices immitte

Cretæ purae,

quantum requiritur ad Acidi saturitatem.

Vas ab igne remotum seponatur, ut Calcaria tartarica inde nata quiescat. Liquori

decantato, Kali tartaricum continenti, admisce

Calcariae muriaticae

in aqua destillata solutae, quantum sufficit ad illius decompositionem. Calcariam tartaricam nunc adhuc obtentam, priori adde, Aqua frigida ablue, et sicca. Partibus hujus sedecim, Quintuplo Aquae calidae dilutis, adde

Acidi sulphurici concentrati Partes septem,

Aquae calidae duplo

antea dilutas.

Spathula lignea saepius agitando digerantur per horas viginti quatuor. Decantato liquore acido, Calcariam sulphuricam residuam aqua ablue, donec plane insipida fiat. Liquores acidi commixti et colati evaporent in vase vitreo aut porcellaneo, ad syrupi tenuioris spissitudinem. Liquor denuo colatus lenta evaporatione in crystallos redigatur, quae siccaetae servantur.

Adeps suilla depurata.

Adeps suilla in frustula concisa et aqua perfecte abluta, liquetur leni igne et expressa servetur.

Eodem modo

Sevum ovillum

depuretur.

Aether aceticus.

R. Natri acëtici Libram unam.

In retortam vitream immissae, adfunde
Acidi sulphurici concentrati Libram
dimidiam,

caute cum

Spiritus Vini rectificatissimi Un-
ciis decem

mixtam. Vasorum juncturis probe clau-
sis, fiat destillatio leni igne. Liquori eli-
cito adde

Aquae communis Partem quartam,
Liquoris Kali caustici, quantum requi-
ritur ad promovendam separationem Aethe-
ris, quem blando calore rectifica.

Aether sulphuricus.

R. Spiritus Vini rectificatissimi Libras
tres.

Cucurbitae immissis successive et caute
instilla:

Acidi sulphurici Uncias triginta no-
vem.

Adaptetur alembicus cum excipulo satis
capaci et, juncturis bene clausis, institua-
tur destillatio ex balneo arenae, calore
sensim ad lenem ebullitionem usque au-
cto. Ubi primum vapores albidii in collo
cucurbitae comparent, destillationem in-
hibe. Residuo refrigerato adfunde

Spiritus Vini rectificatissimi Li-
bram unam cum dimidia.

Fiat destillatio uti antea, haecque operatio cum aequali Spiritus Vini quantitate, bis vel ter deinde repeti poterit.

Liquoris aetherei, destillationibus repetitis obtenti, partibus duodecim, addantur
Aquae communis Partes tres,
Liquoris Kali caustici Pars una.

Aether supernatans a reliquo fluido caute separatus et calore blandissimo, quamdiu purissimus et fragrans stillat, rectificetur.

Alumen ustum.

Alumen crudum uratur in crucibulo amplo, aut in olla fictili non vitreata satis capaci, donec penitus in massam levem abeat.

Ammonium carbonicum.

(*Subcarbonas Ammoniae.*)

R. Ammonii muriatici pulverati et siccati
Partes duas,

Cretae pulveratae et siccatae Partes tres.

Mixta, e retorta collo amplo instructa, adaptato recipiente et juncturis probe clausis, igne ab initio leni, sensimque aucto sublima, et Sal obtentum vase bene obturando serva.

Ammonium carbonicum pyro- oleosum.

(*Subcarbonas Ammoniae pyro-oleosus.*)

Segmenta Ossium a pinguedine purgatorum, in retortam tubulatam ferream aut figulinam immissa, adaptato excipulo ani-

plo, tubo intermedio et foramine parvo elasticis vaporibus exitum permittente, instructo, igne aperto gradatim aucto ure. Sal a Liquore ammoniali et Oleo foetido una productis separa, tunc cum dupla quantitate Cretae siccae pulveratae misce, e retorta vitrea balnei arenae calore sublima, et in vase vitreo epistomio munito, serva.

Ammonium muriaticum depuratum.

(*Murias Ammoniae purus.*)

Sal Ammoniacum solvatur in aquae calidae quantitate sufficiente, solutum filtratur et in vase vitreo aut porcellaneo, modico igne exsiccetur.

Ammonium muriaticum martiatum.

(*Murias Ammoniae martiatus.*)

R. Ferri puri limati Unciam unam.

Solve in quantitate sufficiente Liquoris conflati nixtione

Acidi muriatici Partium duarum,

— nitrici Partis unius.

Solutioni admisce

Ammonii muriatici Uncias quindecim,

eamque nunc evapora ad siccum. Massam salinam hac evaporatione paratam, retortae collo amplo instructae immissam, sublima in integrum; sublimatum in pulverem homogeneum converte, eumque

in vase calefacto epistomio operiendo re-
conde.

Aqua aromatica.

- R. Herbae Salviae Uncias octo,
— Roris marini,
— Menthae piperitae,
Florum Lavendulae, singulorum Un-
cias quatuor,
Seminis Foeniculi,
Cinnamomi veri, singulorum Uncias
duas.

Incisis et contusis adfundantur
Spiritus Vini rectificati Librae sex,
Aquae communis Librae viginti.

Macerentur per horas viginti quatuor et
destillando eliciantur Librae duodecim.

Aqua Calcariae.

- R. Calcariae purae recenter ustae, Libram
unam.

Sensim adfunde

Aquae communis Libras triginta.

Ebullitione peracta, aqua supernatans
decantetur, et in lagenis probe obturan-
dis servetur.

Aqua Cerasorum.

- R. Nucleorum Cerasorum contusorum Li-
bras tres,

Aquae communis quantum satis.

Destillando elice Libras viginti, et
in lagenis epistomio atque colophonio li-
quato arcendis serva.

Aqua Chamomillae.

- R. Florum Chamomillae vulgaris siccatorum Libras duas,
Aquae communis Libras triginta.
Destillent Librae viginti.

Eodem modo paretur

Aqua Florum Sambuci.

- Aqua Cinnamomi simplex.
R. Cinnamomi veri contusi Libram unam,
Aquae communis quantum sufficit.
Destillando eliciantur Librae novem.

Aqua Cinnamomi vinosa.

- R. Cinnamomi veri contusi Libram unam,
Spiritus Vini rectificati Libras duas,
Aquae communis quantum satis.
Destillent inde Librae novem.

Aqua destillata simplex.

Destillent Aquae communis duae tertiae partes, prima stillantis aquae rejecta.

Aqua Florum Aurantii.

- R. Florum Aurantii recentium Libras duas,
Kali carbonici Unciam unam,
Aquae communis quantum satis.
Abstrahantur inde Librae decem.

Aqua Foeniculi.

- R. Seminis Foeniculi contusi Libram unam,
Aquae communis quantum satis.

Destillando eliciantur Librae viginti,
Oleum aethereum Aquae refrigeratae super-
natans auferatur.

Aqua Hyssopi.

R. Herbae Hyssopi siccatae Libras duas,
Aquae communis quantum satis.

Destillando elice Libras viginti.

Eodem modo parentur:

Aqua Melissae;

— Menthae crispae;

— Rutae;

— Salviae;

— Valerianae e radicibus.

Aqua Lauro - Cerasi.

R. Foliorum recentium Lauro - Cerasi
Libras duas,

Spiritus Vini rectificatissimi Un-
cias duas,

Aquae communis Libras sex.

E retorta vitrea destillando elice Libras
tres et sollicite serva.

Eodem modo paretur

Aqua Pruni Padi e Cortice recenti.

Aqua Menthae piperitae.

R. Herbae Menthae piperitae siccatae
Libras duas,

Aquae communis quantum sufficit.

Destillent Librae quatuordecim.

Aqua Menthae piperitae vinosa.

- R. Herbae Menthae piperitae siccatae
Libram unam,
Spiritus Vini rectificati Libram
unam cum dimidia,
Aquae communis quantum satis.
Destillando eliciantur Librae sex.

Aqua oxymuriatica.

(*Liquor Acidi muriatici oxygenati.*)

- R. Natri muriatici Uncias octo,
Mangani oxydati nigri Uncias tres,
In phialam tubulo incurvato instructam
immissis, adfunde
Acidi sulphurici concentrati Uncias
quinque,
antea caute cum
Aquae communis totidem dilutas.

Phiala bene obturata calefiat in arenae
balneo. Gas oxymuriaticum prodians, in-
fra superficiem aquae labri hydro-pneu-
matici excipe lagenis Aqua destillata re-
pletis, donec hujus pars dimidia expulsa
sit. Tunc lagenas claude, easque agitando
connubium liquidi aërei cum aqua pro-
move. Aquam Acido oxymuriatico satu-
ratam in lagenis capacitatis librae dimidia
epistomio vitreo probe claudendis serva.

Aqua oxymuriatica ope apparatus sic di-
cti Wulfiani longe fortior obtineri potest.

Aqua Petroselini.

- R. Seminis Petroselini Libram unam,

Aquae communis quantum satis.
Destillent Librae duodecim.

Aqua Rosarum.

- R. Florum Rosarum incarnatarum recentium Libras quatuor,
Aquae communis quantum satis.
Destillando elice Libras viginti.

Aqua Rubi Idaei.

- R. Placentarum Fructuum Rubi Idaei maturorum, quae post expressionem succi restant Libras decem,
Aquae communis Libras triginta,
Kali carbonici Uncias duas.
Abstrahantur Librae viginti, in lagenis vitreis clausis servandae.

Aqua vulneraria vinosa.

- R. Herbae recentis Salviae,
— — Absinthii,
— — Menthae piperitae,
— — Rutae,
— — Roris marini,
Florum recentium Lavandulae, singulorum Uncias quatuor,
Spiritus Vini rectificati Libras octo,
Aquae communis quantum satis.
Macerentur per viginti quatuor horas, et destillent Librae octodecim.
Argentum nitricum fusum.
(Nitras Argenti fusus.)
R. Argenti puri quantum placet,

solve in

Acidi nitrici quantitate sufficiente.

Deinde leni calore in vase vitreo evapora ad siccum. Massam in vase argenteo, aut porcellaneo idoneo, calore leni liqua, et simulac olei instar fluit, effunde in modulum ferreum calefactum, sevo illitum. Refrigeratam massam in vitro clauso serva.

Baryta muriatica.

(*Murias Barytae.*)

R. Spathi ponderosi electi et laevigati

Libram unam,

Carbonis sicci Unciam unam cum dimidia.

Exacte mixta crucibulo immitte et tecta igne forti per horam integram ure, dein massam in sufficiente quantitate Aquae destillatae fervidae agitando solve, et solutioni adhucdum calidae adfunde

Acidi muriatici quantitatem sufficientem ad perfectam sulphureti decompositionem. Liquorem filtratum ad crystallisationis momentum evapora, sepone, crystallos collectas et siccatas serva.

Bismuthum nitricum praecipitatum.

(*Subnitras Bismuthi.*)

R. Bismuthi puri Uncias duas,

Acidi nitrici Libram dimidiam vel quantum satis ad solvendum.

Bismuthum grossiuscule contusum Acido nitrico successiveingere, solutum Aquae dimidio dilue, filtra, et in vas vitreum Aquae limpidae circiter Libras viginti jam continens, effunde. Praecipitatum inde natum edulcora, loco calido umbroso exsicca atque conserva.

Calcaria muriatica.

(*Murias Calcis.*)

- R. Testarum Ostrearum purificatarum quantum vis.

Solve in

Acidi muriatici quantitate sufficiente, .
filtra, et in vase vitreo aut porcellaneo evapora. Sal siccum adhuc calens in vitreo clauso conserva.

Calcaria sulphurata.

(*Sulphuretum Calcis.*)

- R. Testarum Ostrearum,
Sulphuris puri, singulorum Partes aequales.

Pulverata et mixta in crucibulo tecto incandescant per horae quadrantem. Massam refrigeratam in vase vitreo clauso conserva.

Calcaria sulphurato-stibiata.

(*Sulphuretum Calcis stibiatum.*)

- R. Calcariae ustae cum pauxillo Aquae ferventis in pulverem redactae Uncias quinque,

Sulphuris depurati Unciam unam cum dimidia,

Sulphuris stibiati aurantiaci Unciam
dimidiam.

Probe mixta in crucibulo tecto, luto
argillaceo conglutinato ac bene siccato,
per mediam horam incandescant. Mas-
sam refrigeratam in pulverem redige et
in vase vitreo obturato serva.

Carbo purus.

Ligni Tiliae vel alius arboris frustula,
urantur in retorta terrea, aut in crucibulo
clauso, cujus operculum foramine parvo
instructum sit, donec fumus jam non pro-
deat; carbonem residuum serva.

Eodem modo parandus est

Carbo Spongiae,

E Spongia marina a lapidibus mundata.

Ceratum Cetacei.

R. Cerae albae,

Sevi ovilli, singulorum Libram dimi-
diam,

Cetacei Uncias tres.

Leni igne liquata effunde in cistulas pa-
pyraceas.

Cereoli saturnini.

R. Cerae flavae Libram dimidiam,

Liquatis admisce assidue agitando

Aceti saturnini Drachmas duas.

Ab igne remotis immerge telas linteas
tenues, e quibus lege artis fiant Cereoli,
superficie laevi, et forma exacta.

Cereoli simplices.

R. Cerae flavae Libram dimidiam.

Liqua leni igne et eadem, qua supra,
methodo Cereolos para.

Colocynthis praeparata.

R. Pulpae Colocynthidum sine seminibus
et minutim concisae Uncias quinque,
Gummi Mimosae pulverati Unciam
unam.

Cum Aquae quantitate sufficiente fiat
pasta, quae exsiccata in pulverem rediga-
tur subtilem.

Conserva Rosarum.

R. Florum Rosarum rubrarum recentium
Libram unam,

Contendantur in mortario lapideo, ope
pistilli lignei in pulvem, admiscendo suc-
cessive

Sacchari albi pulverati Libras duas.

Eodem modo para

Conservam Sabinae.

Cuprum aluminatum.

R. Cupri sulphurici,

Kali nitrici,

Aluminis crudi, singulorum Uncias duas.

Contusa liquefiant in vase terreo vitre-
ato, calore arenae; liquefactis et ab igne
remotis admisce:

Camphorae tritae Drachmam unam.

Massam refrigeratam seiva.

Cuprum sulphurico-ammoniatum.*(Subsulphas Cupri ammoniati.)*

R. Cupri sulphurici pulverati Unciis duabus,

instilla

Liquoris Ammonii caustici quantum sufficit

ad perfectam praecipitati solutionem.

Liquori coloris cyanei quiete reposito caute, ut ad latera vasis defluat, superficiemque tegat, adfunde

Spiritus Vini rectificatissimi Libram unam.

Viginti quatuor horis elapsis crystallos natas separa, charta emporetica expande, tunc vase epistomio clauso serva.

Cuprum sulphuricum.*(Sulphas Cupri.)*

R. Acidi sulphurici concentrati Partes tres,

Aquae destillatae Partem unam.

Misce et superinfunde in cucurbita

Ramentorum Cupri Parti uni.

Coque in balneo arenae usque dum Acidum sulphureosum non prodeat. Massam residuam contritam dissolve in aqua fervida, solutum filtra et ad crystallisandum sepone.

Electuarium e Senna.*(Electuarium lenitivum.)*

R. Caricarum Uncias octo.

Coque cum

Aquae sufficiente quantitate per horam dimidiam, exprime, cola et decoctum evapora ad remanentiam Librae unius, in qua dissolve

Sacchari albi Uncias sedecim.

Dein immisce

Pulpaе Tamarindorum,

— Prunorum, singularum Uncias quinque,
et denique

Foliorum Sennae pulveratorum Uncias quatuor cum dimidia,

Seminis Anisi pulverati Unciam dimidiam.

Serva.

Electuarium Theriaca.

R. Radicum Angelicae Libram dimidiam,

— Serpentinae Virginianae
Uncias quatuor,

— Valerianae minoris,

— Scillae,

— Zedoariae,

Cinnamomi veri, singulorum Uncias duas,

Cardamomi minoris,

Myrrhae,

Croci,

Caryophyllorum,

Opii, singulorum Unciam unam,

Mellis albi Libras sex.

Melli addatur Opium; in Vini Malacensis quantitate sufficiente dilutum; deinde admisceantur cetera in pulverem trita.

Serva.

Nota. *Theriacae hujus Unciae singulae continent Opii grana circiter quinque.*

Elixir ammoniato - opiatum.

R. Extracti Liquiritiae Uncias duas,
Aquae Foeniculi Libram dimidiam.
Solutis et colatis adde
Liquoris Ammonii anisati Uncias
duas,
Tincturae Opii crocatae Drachmas
duas.

Nota. *Uncia continet solutum ex Opii granis duobus.*

Elixir Aurantiorum compositum.

R. Corticum Aurantiorum, a parenchymate
interno mundatorum Uncias quatuor,
Fructuum Aurantiorum immaturorum,
Cinnamomi veri, singulorum Uncias
duas,
Kali carbonici Unciam unam,
Vini Malacensis Libras quatuor.

Post digestionem sufficientem exprime
et in colatura solve

Extracti Absinthii,

— Cascarillae,

— Gentianae,

Extracti Trifolii, singulorum Unciam unam.

Serva.

Emplastrum Ammoniacy.

- R. Ammoniacy Libram dimidiam,
Galbani Uncias duas,
Cerae flavae,
Resinae Pini,
Terebinthinae, singulorum Uncias quatuor.

Cerae et Resinae liquatis et refrigeratis admisce Ammoniacum et Galbanum in Terebinthina blando calore soluta, ut fiat lege artis Emplastrum.

Emplastrum aromaticum.

- R. Cerae flavae Uncias octo,
Sevi ovilli Libram dimidiam,
Colophonii Uncias quatuor,
Liquatis et semirefrigeratis immisce
Caryophyllorum pulveratorum Uncias duas,
Olei Nucis moschatae expressi Unciam unam cum dimidia,
— Menthae piperitae Drachmas duas.

Serva.

Emplastrum Cantharidum ordinarium.

- R. Cerae flavae Libram unam,
Terebinthinae,

Adipis suillae depuratae, singulorum
Uncias tres.

Liquatis et semirefrigeratis immisce
Cantharidum grossiuscule tritarum Li-
bram dimidiam,
ut fiat Emplastrum.

Emplastrum Cantharidum per-
petuum.

(*Emplastrum Cantharidum euphorbiatum.*)

R. Cantharidum Uncias duas,
Euphorbii Unciam unam.
Pulverata misce cum
Therebinthinae,
Resinae Pini, singularum Libra dimidia,
antea leni calore liquatis, ut fiat Empla-
strum.

Emplastrum Cerussae.

R. Cerussae tritae Libras novem,
Adipis suillae depuratae Libras sex.
Adipi calefactae injiciatur Cerussa. Co-
quantur simul sub continuata agitatione,
instillando sensim modicum Aquae cali-
dae, ne humidum deficiat, ad justam Em-
plastri spissitudinem. Malaxando formen-
tur bacilla.

Emplastrum Conii.

R. Ceræ flavæ Libram unam,
Colophonii,
Adipis suillae depuratae, singulorum
Libram dimidiam.

Liquatis et semirefrigeratis paulatim admisce

Herbae Conii maculati pulveratae Libram unam,
ut fiat Emplastrum.

Eodem modo parantur

Emplastrum Hyoscyami,
— — Meliloti.

Emplastrum foetidum.

R. Ammoniaci Libram unam,
Asae foetidae Uncias quatuor.

Leni igne emollitis immisce

Saponis Hispanici rasi Uncias duas,
Adipis suillae depuratae Unciam unam.

Emplastrum Hydrargyri.

(*Emplastrum Lithargyri cum Hydrargyro.*)

R. Emplastri Lithargyri simplicis Libras duas,

Cerae flavae Libram dimidiam.

Liquentur leni calore, dein ab igne remotis, adde

Hydrargyri puri Uncias octo,
Terebinthinae Uncias quatuor,
antea diligenti agitatione extinctas.

Misce exacte.

Emplastrum Lithargyri
compositum.

R. Emplastri Lithargyri simplicis Libras quatuor,

Cerae flavae Libram dimidiam,
 Ammoniaci,
 Galbani,
 Terebinthinae, singulorum Uncias quatuor.

Emplastro et Cera liquatis et aliquantulum refrigeratis admisceantur Ammoniacum et Galbanum cum Terebinthina liquata.

Emplastrum Lithargyri cum Resina.

R. Emplastri Lithargyri simplicis Libras duas,
 Resinae Pini Libram unam,
 Terebinthinae Unciam unam.
 Misce.

Emplastrum Lithargyri simplex.

R. Lithargyri in subtilissimum pulverem triti Libras sex,
 Adipis suillae depuratae Libras quindecim.

Coque moderato igne, spathula semper agitando et pauxillum Aquae calidae subinde instillando, ad justam Emplastri spissitudinem.

Emplastrum opiatum.

R. Elemi,
 Mastiches,
 Olibani, singulorum Uncias quatuor,
 Benzoës Uncias duas,
 Terebinthinae Libram dimidiam.

In balneo aquae ad massam homogeneam redactis, immisce

Opium pulverati Unciam unam.

Serva.

Emplastrum saponatum.

R. Emplastri Lithargyri simplicis Libras tres,

Cerae flavae Libram dimidiam,

Saponis Hispanici Uncias tres.

Leni igne mixtis et aliquantulum refrigeratis adde

Camphorae Unciam dimidiam,

in

Olei Olivarum pauxillo

solutam.

Extractum Absinthii.

R. Herbae Absinthii Libras duas.

Concisis adfunde

Spiritus Vini rectificati Libras duas,

Aquae communis Libras novem.

Digere per horas duodecim, deinde exprime et e liquore colato Spiritum Vini blanda destillatione elice. Residuum ad Extracti spissitudinem evapora.

Eodem modo parentur.

Extractum Angelicae;

— Arnicae *e toto*;

— Calami;

— Cascarillae;

— Chamomillae vulgaris;

Extractum Colocyinthidis;

— Corticum Auran-
tiorum;

— Helenii;

— Hellebori nigri;

— Levistici;

— Millefolii *e summi-
tatibus*;

— Pimpinellae;

— Rhei;

— Valerianae.

Extractum s. Succus inspissatus
Aconiti.

Herba Aconiti Neomontani recens,
antequam effloruerit collecta, contundatur
in mortario lapideo, adspergendo pauxil-
lum Aquae et exprimatur succus, qui sta-
tim absque defaecatione in balneo aquae,
continuo sub finem spathula lignea agi-
tando, evaporet ad Extracti spissitudinem.

Pari modo paranda sunt:

Extractum Herbae Belladonnae;

— — Chelidonii
majoris *e toto*;

— — Conii macu-
lati;

— — Hyoscyami;

— Nucum Juglandis viri-
dium.

Extractum Aloes.

R. Aloes lucidæ Libram dimidiam,

In pulverem redactæ adfunde

Aquæ communis Libras duas.

Solve digerendo et liquorem frige-
factum per subsidentiam decantatum cola,
in balneo aquæ ad justam spissitudinem
evapora.

Eodem methodo parentur:

Extractum Myrrhae;

— Opii.

Extractum Cardui benedicti.

R. Herbae Cardui benedicti minutim con-
cisæ Libras duas,

Aquæ communis frigidae Libras vi-
ginti.

Stent subinde agitatae per horas quadra-
ginta octo. Liquor colatus post subsi-
dentiam leni igne ad spissitudinem Extra-
cti evaporet.

Eodem modo para:

Extractum Centaurii minoris;

— Chinae frigide para-
tum;

— Corticis Salicis;

— Fumariae;

— Gentianae;

— Liquiritiae;

— Quassiae;

— Trifolii aquatici.

Extractum Chinae aquosum.

Cortici Chinae pulverato, crassius tuso
in vas stanneum immisso, adfunde

Aquae fervidae Octuplum.

Ebulliant leniter per horae quadrantem
et liquorem exprime. Residuum ex Aquae
Quadruplo iterum per quadrantem horae
leniter coque. Decocta expressa evapo-
rent caute ac leni calore ad Extracti spis-
situdinem.

Eodem modo parentur:

Extractum Dulcamarae e stipitibus;

— Ligni Campechiani;

— Marrubii.

Extractum Ferri pomatum.

R. Ferri puri limati Libram unam,
Succi Pomorum acidulorum Libras
quatuor.

Digerantur saepius agitando per aliquot
dies. Postea coquantur leni igne ad di-
midiae partis consumptionem. Liquor per
linteum colatus evaporet ad justam spis-
situdinem.

Extractum Graminis liquidum.

R. Radicum recentium Graminis albi
Libras duodecim.

Concisas contunde in mortario ferreo,
addendo

Aquae communis Libras sex.

Exprime succum, quem post unicam

ebullitionem in vase stanneo cola, et leni calore ad Mellis spissitudinem redige.

Eodem modo paretur:

Extractum Taraxaci liquidum
e radicibus recentibus, cum herba juni-
niori, vere primo collectis.

Extractum Ligni Guajaci.

R. Ligni Guajaci rasi et grossiuscule con-
tusi Libras sex;

Aquae communis Libras sexaginta.
Decoquantur per horam, et liquor cole-
tur. Repetatur coctio ex Aqua recenti
eodem modo bis terve. Decocta prout
subsederint colata, evaporent ad Extracti
spissitudinem, sub finem addendo pau-
xillum

Spiritus Vini rectificati,
ut fiat massa uniformis.

Extractum Rhei compositum.

R. Extracti Rhei Uncias tres,
Aloes Unciam unam.

In Spiritu Vini rectificato emollita, mi-
sce et agitando, ope balnei aquae, ad mas-
sae pilularis spissitudinem evapora.

Fel Tauri inspissatum.

Fel Tauri recens in balneo Aquae ad
Extracti spissitudinem evaporet.

Ferrum oxydatum fuscum.

(*Oxydum Ferri fuscum.*)

R. Crystallorum Ferri sulphurici quantum vis.

Solve in Aqua calida, filtra, et instillando

Liquorem Kali carbonici

praecipita. Praecipitatum Aqua calida sedulo edulcora, sicca, dein in crucibulo usque ad excandescentiam ure et refrigeratum conserva.

Ferrum oxydulatum nigrum.

(*Oxydum Ferri nigrum.*)

R. Ferri oxydati fusci, quantum placet.

Irrora

Olei Olivarum quantitate sufficiente, massam humidiusculam in retortam vitream immitte, igne ad excandescentiam fere aucto ure, donec fumus et gas prorumpere desierint. Residuum nigerrimi coloris tere, et in vitro probe obturando conserva.

Ferrum pulveratum.

Ferrum purum lima in scobem redactum; in mortario ferreo assidue tere, et pollen subtilissimum per linteum separandum, in vitro obturato conserva.

Ferrum sulphuricum crystallisatum.

R. Acidi sulphurici concentrati Libram unam.

Misce in cucurbita vitrea cum Aquae communis Quadruplo, successive immitte

Ferri puri limati Uncias octo.

Effervescentia cessante repone per horam supra arenam calidam, tum filtra et lege artis in crystallos redige.

Globuli Tartari martiati.

(*Globuli Tartratis Potassae martiati.*)

R. Ferri limati in pulverem redacti Partem unam,

Tartari crudi pulverati Partes quatuor.

Mixta in vase ferreo humectentur Aqua, ut fiat massa pulviformis, quam sub diu aut arenae balneo exsicca, iterum humecta et sicca, idque toties repete, donec massa quasi resinosa appareat. Formetur in globulos.

Hydrargyrum ammoniato - muriaticum.

(*Submuriat Hydrargyri ammoniatus.*)

R. Hydrargyri muriatici corrosivi, Ammonii muriatici, singulorum Uncias octo.

Solve in

Aquae destillatae fervidae Libris octo,

filtra et instilla:

Natrum carbonicum in aqua solutum, quam diu pulvis albissimus praecipitatur, quem aqua frigida ablutum, loco umbroso sicca et serva.

Hydrargyrum muriaticum corrosivum.

(*Supermurias Hydrargyri.*)

- R. Hydrargyri puri Libram unam,
Acidi sulphurici concentrati Uncias
viginti.

Fiat destillatio e retorta vitrea in balneo arenae ad siccitatem plenam. Massam remanentem tritam caute misce cum Natri muriatici siccati Pari pondere.

Tum e cucurbita vitrea ad tertiam tantum partem repleta et in arena collocata, igne ab initio moderato, post expulsionem vaporis acido-muriatici primo prodeuntis, gradatim aucto, sublima. Massam sublimatam crystallinam circumspecte serva.

Hydrargyrum muriaticum mite.

(*Murias Hydrargyri mitis.*)

- R. Hydrargyri muriatici corrosivi Partes quatuor.

In mortario vitreo aut lapideo caute ac Spiritus Vini aliquot guttas subinde inspergendo, pulveratis adde

Hydrargyri puri Partes tres.

Misce terendo, donec globuli Hydrargyri penitus disparuerint. Immitte in cucurbitam et lege artis sublima. Massam sublimatam puriorem contere, et denuo sublima. Tunc in pulverem subtilissimum redige, adfusa Aqua destillata fervente lava, sicca et sollicitè serva.

Hydrargyrum oxydatum rubrum.

(*Oxydum Hydrargyri rubrum.*)

R. Hydrargyri puri quantum placet.

Solve in

Acidi nitrici quantitate sufficiente.

Immitte in retortam vitream, et igne primo leni, subinde fortiori ad siccum evapora. Massam residuam ulterius in vase fictili non vitreato, latioris fundi, interdum movendo cum spathula vitrea prudenter ure, usque dum colorem rubicundum splendentem induat.

Hydrargyrum oxydulatum nigrum.

(*Subnitras Hydrargyri ammoniatus.*)

R. Hydrargyri puri Partes tres,

Acidi nitrici,

Aquae destillatae, singulorum Partes duas.

Coque in phiala leviter clausa et arenae balneo immissa, donec Acidum Hydrargyro ex toto saturatum sit. Liquori lim-pido adhuc calenti, ab Hydrargyro non soluto decantato et quatuor partibus Aquae destillatae calentis diluto, sensim instilla

Liquorem Ammonii caustici.

Praecipitatum inde natum, coloris nigri, Aqua destillata ablue, premendo inter chartas bibulas ab humido ocius libera, in loco umbroso moderatissimo calore sicca et serva.

Hydrargyrum purum.

R. Cinnabaris nativi pulverati Partes
duas,

Ferri limati Partem unam.

Mixta immitte retortae loricatae, cujus
orificium tubo e charta emporetica aquae
immersa instruatur, et igne sensim aucto
destilla. Metallum obtentum ab humidi-
tate libera et serva.

Hydrargyrum stibiato - sulphu-
ratum.

(*Sulphuretum Hydrargyri stibiatum.*)

R. Stibii sulphurati nigri laevigati Uncias
duas,

Hydrargyri puri,

Sulphuris puri, singulorum Unciam
unam.

Misceantur et terantur donec Hydrar-
gyrum penitus dispareat.

Hydrargyrum sulphuratum
nigrum.

(*Sulphuretum Hydrargyri nigrum.*)

R. Hydrargyri puri,

Sulphuris doliurati Partes aequales.

Misceantur sedulo in mortario vitreo, do-
nec Hydrargyrum Sulphure mixtum plane
dispareat.

Kali aceticum.

(*Acetas Potassae.*)

R. Kali carbonici Partem unam,

Aceti destillati quantum ad saturationem requiritur.

Liquor in lebetē stanneo ad partes circiter tres evaporatione redactus et filtratus, in vase vitreo aut porcellaneo, supra arenam calidam posito, ad siccum evaporet. Sal concretum statim in vitro obturando serva.

Kali carbonicum.

(*Subcarbonas Potassae.*)

Tartarus crudus vase idoneo inclusus, uratur, donec sine flamma et fumo candeat. Massa carbonacea restans Aqua calida elixetur, liquor coloris expers filtratur, et ad siccum evaporet.

Kali carbonicum perfecte saturatum.

(*Carbonas Potassae.*)

R. Kali carbonici Uncias duas.

Solve in

Aquae destillatae Unciis tribus,

dein immitte in lagenam vitream capacitatis Librarum viginti, Gas carbonico repletam, et sedulo agita per quadrantem horae. Collectas e deposito fluido crystallos et charta emporētica mundatas, serva.

Kali causticum siccum.

(*Potassa caustica.*)

Liquor Kali caustici evaporet in vase ferreo, donec gutta in metallum frigidum demissa, perfecte concreseat; tum effunde,

et frustula diffracta statim in vase rite obturato serva.

Nota. *Ad obtinendum Kali causticum fusum s. Lapidem causticum chirurgorum, Kali causticum siccum igne liquecat, et fluens instar olei in formas cylindricas effundatur.*

Kali nitricum.

(*Nitras Potassae.*)

Nitrum crudum in Aquae fervidae duplo liqua. Soluto Liquorem Kali carbonici quamdiu turbatur, instilla et per chartam colatum, ut crystalli concrescant, sepone. Liquor residuus, ad dimidium evaporatus, denuo crystallos demittit. Quae operatio repetenda est, usque dum crystalli Kali nitrici purae evadunt.

Kali sulphuratum.

(*Sulphuretum Potassae.*)

R. Sulphuris depurati Partem unam,
Kali carbonici siccati Partes duas.

Mixta in crucibulo tecto et satis amplo leni igne in massam homogeneam coëant, quam in conum fusorium, aut in mortarium aeneum, Oleo Amygdalarum illitum, effunde, frigefactam grossiuscule tere, et statim in vase rite clauso serva.

Kali sulphuricum.

(*Sulphas Potassae.*)

Massam salinam post destillationem acidi nitrici remanentem in Aquae quantitate

sufficiente coquendo solve, Acidum si abundat, creta saturæ, liquorem evapora, donec cuticula apparet. Filtra et in crystallos redige.

Kali tartaricum.

(*Tartras Potassae.*)

R. Kali carbonici quantum vis.

Solve in

Aquae fervidae Octuplo,

adde successive

Tartarum depuratum in pulverem tritum, donec effervescentia cessat. Liquorem rite saturatum chartam heliotropio tinctam non rubescentem ad siccum inspissa.

Linimentum saponato-camphoratum.

R. Saponis domestici siccati Uncias duas,

Spiritus Vini rectificati Libram unam.

Solve ope caloris balnei aquae, et relinque in eo ad perfectam sordium subsidentiam. Liquorem limpido alio vasi immitte, in quo

Camphorae Uncia una, in

Olei Rorismarini Drachma una et

Liquoris Ammonii caustici Uncia una,

soluta sint. Massam calide mixtam effunde illico in vascula Unciae unius capacitatis, subere et vesica humida claudenda.

Liquor Ammonii acetici.

(*Liquor Acetatis Ammoniae.*)

R. Ammonii carbonici sicci Uncias tres,
Aceti concentrati quantum requiritur
ad saturandum.

Liquorem Aqua destillata simplici dilue,
ut totius pondus sint Librae duae.

Nota. . *Hic liquor cum Aquae destillatae
simplicis Parte aequali dilutus, Spiritum sic
dictum Mindereri constituit.*

Liquor Ammonii anisatus.

(*Spiritus ammoniato-anisatus.*)

R. Spiritus Vini rectificatissimi Libram
unam cum dimidia,
Olei Anisi aetherei Unciam dimi-
diam.

Mixtis et solutis adde

Liquoris Ammonii caustici Uncias
tres.

Serva.

Liquor Ammonii carbonici aquosus.

(*Liquor Subcarbonatis ammoniae.*)

R. Ammonii carbonici sicci Partem unam.
Aquae destillatae calidae Partes tres.
Solve et conserva.

Liquor Ammonii caustici.

(*Liquor Ammoniae purae.*)

R. Calcariae ustae Libram unam cum
dimidia.

Conspergantur Unciis novem Aquae calidae, ut perfecte in pulverem fatiscent; cui in retortam vitream immisso, adde Ammonii muriatici contriti Libram unam,

Aquae communis Libras quatuor.

Applicetur statim excipulum amplum, Aquae destillatae Libram unam continens. Juncturis probe clausis destillent leniter Librae duae, ut sint Liquoris Librae tres, in lagenis, epistomio vitreo obturatis, servandae.

Liquor Ammonii pyro-oleosi.

- R. Ammonii carbonici pyro-oleosi Partem unam,
Aquae destillatae simplicis calidae Partes tres.

Solve et serva.

Liquor Ammonii succinici.

(*Liquor Succinatis Ammoniae.*)

- R. Acidi succinici quantum placet;
tere in mortario vitreo adfundendo sensim

Liquoris Ammonii pyro-oleosi,
antea diluti cum

Aquae destillatae Parte aequali, quantum sufficit ad saturandum.

Liquor Ammonii sulphurati.

(*Liquor Sulphureti Ammoniae hydrogenati.*)

- R. Calcariae ustae, cum
Aquae communis Uncia una

in pulverem redactae, Uncias tres,
Ammonii muriatici Uncias duas,
Sulphuris depurati Unciam unam.

Mixta in retortam vitream immitte, cui
statim applicetur excipulum, continens
Aquae destillatae Uncias duas.

Juncturis probe firmatis, destilla igne
sensim aucto ad siccum, Liquorem au-
rantii coloris foetorem hydrothionicum
spargentem, vase vitreo bene clauso serva.

Liquor Ammonii vinosus.

(*Liquor Ammoniae spirituosus.*)

R. Spiritus Vini rectificatissimi Partes
duas,

Liquoris Ammonii caustici Partem
unam.

Misce et in vitro probe clauso serva.

Liquor Hydrargyri nitrici.

(*Liquor Nitratis Hydrargyri.*)

R. Hydrargyri puri Unciam unam.

Digerendo leni calore solve in
Acidi nitrici puri quantitate sufficiente.
Solutio adde

Aquae destillatae simplicis

quantum requiritur, ut liquoris sint Un-
ciae quinque, cujus gutta Aquae purae
instillata sedimentum ne edat.

Liquor Kali acetici.

(*Liquor Acetatis Potassae.*)

R. Kali acetici Libram unam,

Aquae destillatae simplicis Libras duas.

Solve et filtra.

Liquor Kali carbonici.

(*Liquor Subcarbonatis Potassae.*)

R. Kali carbonici Libram unam.

Solve in

Aquae destillatae simplicis Libris duabus,

filtra et serva.

Liquor Kali caustici.

(*Liquor Potassae causticae.*)

R. Kali carbonici Libras duas.

In vas ferreum missis, adfunde

Aquae communis fervidae Decuplum;
tunc successiveingere

Calcariae ustae Libras tres.

Coque per horae quadrantem agitando spathula. Si liquor, cum Acido quocunque mixtus, ullam producit effervescentiam, Calcaria usta est addenda. Cola per linteam. Liquor in lagenas vitreas obturandas immissus, quum subsederit, decantetur et evaporet, donec ejus Unciae quatuor compleant vas capacitatis Unciarum trium Aquae simplicis. In lagenis probe obturandis serva.

Liquor Saponis stibiati.

R. Sulphuris stibiati aurantiaci Unciam unam.

Solve digerendo in

Liquoris Kali caustici sufficiente quantitate,

admisce

Saponis medicati Uncias tres,

Spiritus Vini rectificatissimi,

Aquae destillatae simplicis, singulorum Libram dimidiam.

Digerantur leni calore, subinde agitando.

Liquorem filtratum, qui ab acidis sedimentum aurantiaci coloris deponat, serva.

Liquor Stibii muriatici.

(*Liquor Muriatis Stibii.*)

R. Stibii oxydulati fusci Uncias duas,
Natri muriatici siccati Libram dimidiam.

Mixtis in retorta vitrea adfunde

Acidi sulphurici concentrati Uncias quatuor,

Aquae communis Unciis duabus

antea dilutas. Fiat destillatio ex arenae balneo igne sub finem aucto. Liquorem obtentum serva.

Magnesia carbonica.

(*Subcarbonas Magnesiae.*)

R. Magnesiae sulphuricae crystallisatae Libras decem,
Natri carbonici crystallisati Libras duodecim.

Solvantur seorsim in duplo Aquae ferventis, et filtrata in lebeti stanneo agitando spathula lignea commisceantur. Post ebul-

litionem per horae quadrantem, mixtura diluatur Aqua fervida, et per linteum coletur. Magnesiam in colo remanentem edulcora, et leni calore perfecte sicca.

Magnesia sulphurica.

(*Sulphas Magnesiae.*)

Magnesiam sulphuricam satis puram Sal S a i d s c h r ü t z e n s e genuinum largitur; quae vero sub Salis anglici nomine venit, in Aquae fervidae pari pondere solvendo, filtrando et in crystallos redigendo, depuranda est.

Magnesia usta.

Magnesia carbonica in crucibulo tecto, igne fortiori uratur per horam et ultra, usque dum ab adfuso Acido sulphurico diluto non effervescat. Refrigerata in vitro obturando servetur.

Mel despumatum.

R. Mellis communis Libras sedecim,
Aquae communis Libras octo,

Mixta in vase stanneo coque, et spumam in superficie ortam, cochleari foraminibus parvis instructo sedulo auferens, per manicam e panno confectam cola, et lenissimo calore ad Syrupi consistentiam inspissa.

Mel glycyrrhizatum.

R. Radicum Liquiritiae incisarum Uncias octo,

Aquae communis ferventis Libras tres.

Macera per horam. Liquor expressus
evaporet, donec supersint Unciae quatuordecim; quibus adde

Mellis albi Libras quinque.

Mixta coque leni igne ad syrupi spissitudinem.

Mel rosatum.

R. Florum Rosarum incarnatarum sic-
catarum Uncias octo,
adfunde

Aquae communis fervidae Libras
quatuor.

Macera per noctem, cola et cum
Mellis despumati Libris octo,
leni igne ad Syrupi spissitudinem co-
que.

Mixtura oleoso-balsamica.

R. Olei Lavandulae,
— Majoranae,
— Caryophyllorum,
— Macidis,
— Cinnamomi,
— de Cedro, singulorum Scrupulum
unum,
— Rutae,
— Succini rectificati, singulorum
Guttas decem,

Balsami Peruviani Drachmam
dimidiam,

Spiritus Vini rectificatissimi

Uncias decem.

Mixta solve, tincturam decantatam
serva.

Mixtura sulphurico-acida.

(*Spiritus sulphurico-acidus.*)

Spiritus Vini rectificatissimos Un-
ciis tribus,

successive instilla

Acidi sulphurici concentrati recti-
ficati Unciam unam.

Serva.

Mixtura vulneraria acida.

R. Aceti crudi Libras tres,
Spiritus Vini rectificati Libram unam
cum dimidia,

Acidi sulphurici diluti Libram dimi-
diam,

Mellis despumati Libram unam.

Misce.

Natrum aceticum.

(*Acetas Sodae.*)

R. Natri carbonici quantum vis,
Aceti destillati quantum ad saturationem
requiritur.

Liquor filtratus et in vase stanneo ad
crystallisationis momentum evaporatus, lo-
co temperato seponatur. Crystallos natas
collige et serva.

Natrum carbonicum crystallisatum.

(*Subcarbonas Sodae*)

R. Sodae venalis quantum placet,
contrita solvatur in Aqua fervida Li-
xivium filtratum et ad crystallisationis pun-
ctum evaporatum, seponatur loco frigido,
ut crystallos demittat, quae tam diu col-
ligantur, quam purae prodeunt.

Natrum carbonicum perfecte saturatum.

(*Carbonas Sodae.*)

Simili modo ac Kali carbonicum, perfecte saturatum obtinetur.

Natrum phosphoricum.

(*Phosphas Sodae.*)

Acido phosphorico, Aquae calidae
Octuplo diluto, addatur sensim

Natrum carbonicum in Aqua solutum,
dum hoc aliquatenus praevaleat. Liquor
filtratus ad crystallisandum evaporet. Cry-
stalli collectae in vase clauso servantur.

Natrum sulphuricum crystalli- satum.

(*Sulphas Sodae.*)

Residuum salinum, e destillatione Acidi
muriatici obtentum, conteratur, et in
Aqua communi coquendo solvatur, cui
Cretae pulveratae quantum ad perfectam
saturationem Acidi plerumque praevalen-

tis requiritur, adde. Liquor salinus filtratus ad punctum crystallisationis evaporet, et loco frigido seponatur. Crystalli collectae servantur.

Oleum Absinthii aethereum.

R. Summitatum Absinthii vulgaris cum semine paene maturo Libras duodecim, Aquae communis Octuplum.

Fiat destillatio e vesica, sub continua aquae ebullitione, quamdiu Aqua Oleo gravis prodeat. Obtentum Oleum separetur. Aqua stillatitia supra novam Absinthii copiam, addendo Aquae communis quantitatem sufficientem, destillet et Oleum auferatur; haec operatio toties repetatur, donec Olei desiderata quantitas obtenta fuerit.

Eodem modo parentur.

Oleum	Baccarum	Juniperi;
—	Corticum	Aurantiorum;
—	—	Cascarillae;
—	Florum	Lavandulae;
—	Herbae	Majoranae;
—	—	Menthae cris-
		pae;
—	—	Menthae pipe-
		ritae;
—	—	Roris marini;
—	—	Rutae;
—	—	Sabinae;

Oleum Radicis Calami;

— — Valerianae mi-
noris;

— Seminis Anisi;

— — Carvi;

— — Cumini;

— — Foeniculi.

Oleum Absinthii infusum.

R. Summitatum Absinthii siccatarum Li-
bram dimidiam,

Olei Olivarum Libras quatuor.

Digere vase clauso per dies quatuor,
postea Oleum exprime, cola et conserva.

Simili modo parentur:

Oleum infusum Chamomillae vul-
garis;

— — Hyoscyami.

Oleum Amygdalarum.

Ex Amygdalis recentibus contusis et
sacco cilicino aut cannabino inclusis, preli-
laminis, in aqua fervente tepefactis, ex-
primatur Oleum, quod, quum faeces re-
sederint, in vase clauso servandum est.

Eadem methodo parentur:

Oleum Seminis Lini;

— — Papaveris.

Oleum animale aethereum.

R. Olei animalis foetidi quantum placet.

Infundatur cucurbitae vitreae ope infundibuli vitrei, ne cucurbitae latera inquinentur. Tum alembico et vase recipiente bene lutatis, fiat destillatio, lenissimo balnei arenae calore, quamdiu Oleum tenue elicitur, quod cautione eadem, cucurbitae novae cum aquae quadruplo mixtum infundatur, et applicato alembico ac vase recipiente puro, iterum calore blando destillet, dum limpidissimum, aquae instar apparet. Immittatur illico lagenulis vitreis drachmarum duarum, exacte obturandis et in Hydrargyro puro demergendis.

Oleum animale foetidum.

Obtinetur una cum Ammonio carbonico pyro-oleoso, encheiresi suo loco praescripta.

Oleum Cacao.

Semina Cacao leniter tosta, a corticibus liberata, contusa et sacco cannabino inclusa, Aquae bullientis vapore impraegna et ope torcularis, cujus laminae in aqua fervida calefactae sint, exprime. Oleum butyraceum ope aquae calidae liquatum, per linteum tenue cola et frigefactum serva

Oleum Caryophyllorum.

R. Caryophyllorum aromaticorum quantum vis.

Contusis et retortae vitreae immissis adfundatur

Aquae communis Octuplum,

et fiat destillatio ad dimidium. Oleum elicitum cum Aqua destillans et subsidens, separetur. Aqua vero eadem iisdem Caryophyllis iterum adfusa, denuo destillet, et Oleum obtentum cum priori mixtum servetur.

Eodem modo parentur:

Oleum Cinnammomi e *Cinnamomo*
vero;

— Macidis.

Oleum. Cerae.

R. Cerae flavae rasae,
Calcariae ustae pulveratae, singularum
Libram unam.

Mixta et retortae vitreae immissa, arenae balneo destilla. Oleum elicitum butyraceum nova destillatione supra
Calcariae ustae Libram dimidiam
rectifica.

Oleum Chamomillae aethereum.

R. Florum Chamomillae vulgaris sine
stipitibus Libras viginti.

Immissis vesicae superadfunde
Aquae communis Octuplum.

Stent loco temperato ad incipientem usque fermentationem, tunc destillando Oleum colore cyaneo ac specifica Chamomil-

lae fragrantia praeditum, ab aqua separa
et serva.

Oleum Galbani aethereum.

R. Galbani Libras duas,

Aquae communis Octuplum.

Fiat destillatio, e retorta vitrea in are-
nae balneum recondita, ad dimidium.

Oleum limpidum Aquae destillatae innatans collige et serva.

Oleum Nucistae.

R. Nucleorum moschatorum quantum vis.

Contusos, et sacco cannabino inclusos, aquae bullientis vapore impraegna, dein ope preli, laminis aqua fervida calefactis, exprime Oleum et serva.

Oleum Ovorum.

R. Ovorum recentium, coctione in aqua duratorum, quantum vis.

Vitelli exempti in sartagine munda leni calore, ope pistilli lignei, agitentur donec rufescant et inter digitos pressi, Oleum emittant, tum sacco inclusos prelo exprime. Oleum obtentum in vitro obturato serva.

Oleum Succini.

Oleum destillatione Acidi succinici obtentum, e retorta vitrea leni igne destillando rectifica et serva.

Oleum Terebinthinae.

R. Terebinthinae communis clare quantum vis,

Aquae communis Quadruplum.

Mixta immitte retortae et, igne sensim aucto, oleum destillando aufer.

Oxymel Aeruginis.

(*Mel Superacetatis Cupri.*)

R. Aeruginis crystallisatae Uncias quatuor,

Aceti crudi Libras duas.

Coque, dum liquoris quarta circiter pars supersit, filtra et adde

Mellis despumati Libras duas.

Oxymel scillinum.

R. Aceti scillini Libram unam,

Mellis despumati Libras duas.

In vase stanneo coquantur ad mellis liquidi spissitudinem.

Oxymel simplex.

R. Aceti crudi Libram unam,

Mellis despumati Libras duas.

Misce et in lebetes stanneo coque ad mellis spissitudinem.

Pasta gummosa saccharata

(*loco Pastae de Althaea.*)

R. Albuminum Ovorum Numero sedecim,

Aquae Florum Aurantii Libram dimidiam.

Conquassata in spumam redige, iisque Gummi Mimosae electi,

Sacchari albi, singulorum Libram unam cum dimidia,

prius in pulverem redactorum admisce. Massam spathula lignea agita, acquisito colore albo, igni leni admove ac misce, ut tenacitas ejus minuatur. Tum in capsulas papyraceas effunde et blando calore fornacis exsicca, exsiccata ex papyro, antea parumper humectato, exime, et de-nuo siccata serva.

Pasta Liquiritiae.

R. Radicis Liquiritiae decorticatae grossiuscule concisae Uncias quatuor.

Macera per horas duodecim in

Aquae fervidae Libris octo.

In infuso colato solve

Gummi Mimosae electi Libras duas cum dimidia,

Sacchari albi Libram unam cum dimidia.

Colatura leni igne, sine agitatione et caute evitando empyreuma, evaporet, donec gutta disco vitreo frigido instillata, gelatinae instar appareat. Tunc remota pellicula effunde in cistulas planas, e laminis ferreis stanno obductis paratas, et pauxillo Olei Amygdalarum inunctas. Pastam modico calore exsiccata, et in taleolas scissam, serva.

Phosphorus.

R. Acidi phosphorici ex Ossibus Partes quatuor,

Carbonum pulveratorum Partem unam.

Probe mixta retortae terreae loricatae immitte, os colli aquae immerge, et igne furni anemii aperto, gradatim aucto ure, quamdiu gas prorumpere non desinet.

Phosphorum in fundo receptaculi collectum, et sacco linteo immissum, in aqua calida liqua, sub eadem exprime, expresso aquam frigidam superinfunde et serva.

Plumbum aceticum.

Saccharum Saturni solvatur in Aqua destillata calida. Solutum filtretur et loco frigido ad crystallisandum seponatur. Liquor remanens evaporet ad dimidium, ut denuo crystallos demittat.

Pulpa Prunorum.

Fructus Pruni domesticae maturi, exemptis nucleis coquantur ad mollitiem. Pulpa per cribrum setaceum trajecta evaporet ad requisitam spissitudinem. Singulis Pulpae Libris addantur
Sacchari albi pulverati Unciae duae.

Pulpa Tamarindorum.

Medullam Fructuum Tamarindi orientalis macera in Aqua calida, tere per cribrum setaceum, et blando calore ad requisitam spissitudinem evapora. Singulis Pulpae Libris tunc admisce
Sacchari albi pulverati Uncias duas.

Pulvis aromaticus.

R. Cinnamomi veri,

Cardamomi minoris, singulorum Uncias duas,
 Zingiberis,
 Caryophyllorum, singulorum Unciam dimidiam.

Misce, fiat Pulvis.

Pulvis dentifricius.

- R. Tartari depurati Uncias quatuor,
 Radicis Iridis florentinae Uncias duas,
 Mastiches,
 Myrrhae,
 Catechu, singulorum Unciam unam.
 Pulveratis et mixtis adde
 Olei Caryophyllorum Guttas quadraginta.
 Serva.

Pulvis Ipecacuanhae opiatuſ.

- R. Kali sulphurici Unciam unam,
 Opii pulverati,
 Radicis Ipecacuanhae pulveratae, singulorum Drachmam unam.
 Misce exacte.

Pulvis Liquiritiae composituſ.

- R. Radicis Liquiritiae,
 Foliorum Sennae, singulorum Uncias duas,
 Seminum Foeniculi,
 Sulphuris depurati, singulorum Unciam unam,

Sacchari albi Libram dimidiam.

Pulverata et mixta serva.

Pulvis sternutatorius.

- R. Herbae Majoranae Partes tres,
 — Mari veri,
 Florum Convallariae majalis,
 Radicis Iridis florentinae, singulorum
 Partem unam.
 Misce, fiat pulvis.

Resina Jalappae.

- R. Radicum Jalappae quantum vis.
 In pulverem crassiusculum redactis, ad-
 funde

Spiritus Vini rectificati quantum sa-
 tis, ut radices contegat.

Mixta digere leni calore per horas qua-
 draginta octo, et amota tinctura, radici-
 bus residuis aliam Spiritus Vini quantita-
 tem superinfunde et denuo digere.

Tincturis commixtis et filtratis aquae
 quartam partem adde, Spiritum Vini e
 balneo aquae destillando elice, et resinam
 subsidentem aqua fervida ablutam sicca et
 serva.

Sapo guajacinus.

Lixivio Kali caustici duplo Aquae di-
 luto et leniter ebullienti, sub continua
 agitatione insperge successive,

Resinae Guaiaci nativae pulveratae
 quantum solvi potest. Liquorem cola et

leni calore ad massae pilularis consistentiam inspissa.

Sapo jalappinus.

- R. Resinae Jalappae pulveratae,
Saponis medicati rasi, singulorum Uncias duas.

Mixta leni digestionem solve in
Spiritus Vini rectificati quantitate sufficiente et ad massae pilularis consistentiam evapora.

Sapo medicatus.

- R. Natri carbonici crystallisati Libras duas,

in

Aquae fervidae Libris viginti quatuor

solutis adde successive

Calcariae ustae Libras duas.

Coque per horae quadrantem. Liquor causticus, per linteam colatus et in vase clauso subsidendo depuratus, evaporet, donec ejus Unciae octo compleant vas, capacitatis Unciarum sex aquae communis. Liquori frigefacto in vase figulino admisce Olei Olivarum Duplum.

Seponatur vas loco temperato, et agitur massa per vices spathula lignea, donec homogenea appareat et spissescere incipiat. Effundatur tum in cistas ligneas planas, indurata scindatur in taleolas, loco temperato exsiccandas.

Sapo stibiatus.

R. Sulphuris stibiati aurantiaci Unciam unam.

Solve digerendo in sufficiente quantitate Liquoris Kali caustici.

In liquido triplo Aquae destillatae diluto, dissolve

Saponis medicati rasi Libram dimidiam.

Evaporent leni igne ad massae pilularis consistentiam; addendo, dum massa rubet,

Liquoris Kali caustici quantum satis est, ut colorem ex albedo cinereum induat.

In vase obturando serva.

Species aromaticae.

R. Herbae Majoranae,

— Menthae piperitae,

— Roris marini,

— Serpylli,

Florum Lavandulae, singulorum Uncias duas,

Caryophyllorum,

Cubebarum, singulorum Unciam unam.

Misce, fiat pulvis grossiusculus.

Species ad Cataplasma.

R. Herbae Malvae,

— Meliloti,

Florum Chamomillae vulgaris, singulorum Libram unam,

Semenum Lini Libras duas.

Pulverata misce.

Species ad Decoctum Lignorum.

R. Ligni Guajaci Libras duas,

Radiciis Bardanae,

— Saponariae, singulorum Libram
unam,

— Liquiritiae,

Ligni Sassafras, singulorum Libram
dimidiam.

Concisa misceantur.

Species ad Enema.

R. Herbae Malvae Libras duas,

Florum Chamomillae vulgaris, Li-
bram unam,

Semenum Lini Libram dimidiam.

Concisa et contusa misce.

Species ad Fomentum.

R. Strobulorum Lupuli Libram unam,

Florum Chamomillae vulgaris,

— Lavandulae,

Herbae Roris marini,

— Serpylli,

— Tanaceti, singulorum Uncias
tres.

Concisa misce.

Species ad Gargarisma.

R. Herbae Althaeae,

— Salviae, singularum Libram di-
midiam,

Florum Sambuci,
 Radicis Pimpinellae albae, singulorum
 Uncias tres.
 Concisa misce.

Species ad Infusum pectorale.

R. Hordei perlati Uncias quatuor,
 Radicis Liquiritiae,
 Herbae Farfarae,
 — Hederae terrestres,
 — Veronicae, singularum Uncias
 duas,
 Florum Rhoeados,
 — Verbasci,
 Seminum Anisi vulgaris, singulorum
 Unciam unam,
 Caricarum Uncias tres.
 Concisa misceantur.

Species resolventes externae.

R. Herbae Absinthii,
 — Menthae piperitae,
 — Origani vulgaris, singularum
 Libram dimidiam,
 Florum Chamomillae vulgaris,
 — Lavendulae, singulorum Uncias
 duas.
 Concisa misce.

Species ad suffiendum.

R. Olibani,
 Benzoës,
 Mastichis,
 Succini, singulorum Libram unam,

Corticum Cascarillae Unciam unam.
Concisa et contusa misce.

Spiritus Angelicae compositus.

- R. Radicis Angelicae Libram unam,
Herbae Scordii Libram dimidiam,
Radicis Valerianae,
Baccarum Juniperi, singulorum Uncias
tres,
Spiritus Vini rectificati Libras sex,
Aquae communis quantum satis.

Destillando eliciantur Librae sex. In
quibus solve
Camphorae Unciam unam cum dimi-
dia.

Serva.

Spiritus camphoratus.

- R. Camphorae Unciam unam,
Spiritus Vini rectificati Libram
unam.

Mixta solve.

Spiritus Cochleariae.

- R. Herbae Cochleariae florecentis Li-
bras duodecim.

Contusis adfunde

Spiritus Vini rectificati Libras sex,
Aquae communis quantum satis.

Destillent Librae sex.

Spiritus Formicarum.

- R. Formicarum viventium, a quisquiliis
mundatarum, Libras duas,

Spiritus Vini rectificati,
Aquae communis, singulorum Libras
quatuor.

Destillando elice leni igne Libras qua-
tuor.

Spiritus Lavandulae.

R. Florum Lavandulae siccatorum Libram
unam,

incisos digere, cum

Spiritus Vini rectificati Libris qua-
tuor,

Aquae communis quantum satis,
per viginti quatuor horas et Spiritum
destillando elice.

Eodem modo parandi sunt:

Spiritus Roris marini et

— Serpylli.

Spiritus muriatico - aethereus.

R. Natri muriatici Uncias sedecim,
Mangani oxydati nativi Libram di-
midiam.

In retortam vitream immissis, super-
adfunde

Acidi sulphurici concentrati Libram
unam,

antea cum

Spiritus Vini rectificatissimi Li-
bris quatuor

mixtam.

Destillando elice Libras tres.

Spiritus nitrico - aethereus.

R. Spiritus Vini rectificatissimi Libras duas,

Acidi nitrici Libram dimidiam.

Destillent e retorta igne lenissimo,

Unciae viginti. Spiritum elicited
supra

Magnesiae ustae Unciam dimidiam
rectifica et in vitris capacitatis unciarum
duarum bene obturandis loco frigido serva.

Spiritus saponatus.

R. Saponis Hispanici rasi Libram unam,

Spiritus Vini rectificati Libras tres
cum dimidia,

Aquae Rosarum Libram dimidiam.

Solve digerendo et filtra.

Spiritus sulphurico - aethereus.

R. Aetheris sulphurici Partem unam,

Spiritus Vini rectificatissimi Par-
tes tres.

Misce et serva.

**Spiritus sulphurico - aethereus
martiatu8.**

R. Ferri puri limati quantum placet.

Solve in quantitate sufficiente

Acidi muriatici

I cum tertia parte

Acidi nitrici

mixti, et leni calore balnei arenae eva-
pora. Massam siccata in cellam repone,

ut deliquescat. Liquorem coloris fuscī saturati cum

Aetheris sulphurici Duplo

misce conguassando. Aetherem, hoc modo ferro oxydato muriatico impraegnatum, separa et cum

Spiritus Vini rectificatissimi Duplo

misce. Mixtum in vitris oblongis bene obturatis radiis solis tam diu expone, donec color omnis evanuerit. Tum sollicite conserva.

Spiritus Vini rectificatus.

R. Carbonum recentē ustorum Partem unam,

superadfunde

Spiritus Frumenti Partes duodecim.

Post macerationem per horas sex cola, et in yase destillatorio idoneo lege artis rectifica.

Nota. Vas Unciarum decem Aquae capax Unciis novem Spiritus Vini rite rectificati repleatur.

Spiritus Vini rectificatissimus.

Spiritus Vini rectificatus iterum remissione balnei arenae calore tam diu destillet, quam gossypium, Spiritu stillante madefactum et accensum, post Spiritus deflagrationem in cinerem vertatur.

Nota. Pondus specificum Spiritus Vini rectificatissimi, per repetitam destillationem ad dimidium obtenti, cujus Unciae quinque vas Un-

ciarum sex Aquae capax plenius replent, est = 0,82: 1,00 Aquae.

Spongiae ceratae.

Spongiae marinae tenues mundatae et exsiccatae, immergantur Cerae flavae liquefactae, ac prelo fortiter exprimantur, et ubi refrigerint, servantur.

Stibium oxydatum album ablutum.

(*Oxydum Stibii potasseum ablutum.*)

Stibio oxydato albo non abluto, de quo infra,

adfunde Aquae fervidae Decuplum; agita, ut solvantur salia illi adhaerentia; instilla

Acidi sulphurici diluti quantum satis, ut saturetur Kali, partem Stibii oxydati solutam in se continens. Pulverem album, in fundo vasis collectum, sedulo ablue, et adfusa alia aquae quantitate, a parte crassiori decantando libera, sicca et serva.

Stibium oxydatum album non ablutum.

(*Oxydum Stibii potasseum non ablutum.*)

R. Stibii sulphurati nigri Partes duas,
Kali nitrici Partes quinque.

Pulverata et mixta injiciantur successive in crucibulum amplum et leviter candens; partem Stibii oxydulatam lateribus adhaerentem; sollicitè immiscendo. Detonatione peracta, massa deinde per semihoram candescat, tunc cochleari ferreo

eximatur. Refrigerata teratur in pulverem, vitro obturato servandum.

Stibium oxydulatum fuscum.

(*Oxydum Stibii fuscum sulphuratum.*)

R. Stibii sulphurati nigri,

Kali nitrici siccati, singulorum Par pondus.

Pulverata et mixta, in olla ferrea munda accendantur pruna admota. Post detonationem massa refrigerata in pulverem redigatur, Aqua fervida sedulo edulcoretur, et siccetur.

Stibium sulphuratum nigrum laevigatum.

(*Sulphuretum Stibii nigrum laevigatum.*)

Stibium sulphuratum nigrum electum, in mortario ferreo contritum, super lapidem expolitum et durum, adfuso pauxillo Aquae laevigetur, ut fiat pollen subtilissimum, loco tepido siccandum.

Succus Dauri inspissatus.

Radices Dauri sativi recentes mundatas et concisas, dimidio Aquae superfusas, in lebetе stanneo coque, ut mollescant. Exprime succum, quem semel ebulliendo clarifica, et leni calore ad mellis consistentiam evapora.

Succus Juniperi inspissatus.

Baccae Juniperi maturae recentes conquassatae, digerantur cum Aquae com-

munis Octuplo per biduum. Succus modice expressus subsideat, et limpidus ad consistentiam mellis calore moderato inspissetur.

Succus Sambuci inspissatus.

- R. Succi e Baccis Sambuci nigrae maturis expressi et defaecati Libras octo,
Sacchari albi Libram dimidiam.

Modico igne coquantur ad mellis spissitudinem.

Sulphur depuratum.

Sulphur sublimatum quale prostat, Aqua fervida ab Acido adhaerente perfecte libera et siccatum serva.

Sulphur praecipitatum.

- R. Sulphuris depurati Partem unam,
Kali carbonici Partes duas.

Pulverata misceantur et liquentur leni igne in sartagine ferrea. Dein amota ab igne, pisilli lignei ope, agitentur per quadrantem horae, denuo liquentur, iterumque agitentur. Intime junctas, coque cum Aquae fontanae sufficiente quantitate ad perfectam solutionem. Liquori filtrato adfunde

Acidi sulphurici diluti sufficientem quantitatem,

et praecipitatum inde natum aqua tepida adfusa ablue et sicca.

Sulphur stibiatum aurantiacum.

- R. Stibii sulphurati nigri laevigati,

Sulphuris depurati, singulorum Libram unam.

Mixta, coque cum

Liquoris Kali caustici quantitate sufficiente,

in lebetē ferreo continue spathula movendo, et aquam evaporationē consumptam hinc inde restituendo, usque dum fere soluta fuerint. Liquori aqua fervida diluto et per chartam colato, successive adde

Acidi sulphurici diluti quantum sufficit

ad praecipitandum Sulphur stibiātum; evites vero sedulo Gas hydrothionicum, in hac operatione emergens. Horis viginti quatuor elapsis, Aqua supernatans decantetur, praecipitatum Aqua tepida abluatur, denique lenissimo calore in loco umbroso siccetur et servetur.

Sulphur stibiātum rubeum.

R. Stibii sulphurati nigri Libras duas,
Natri carbonici siccati Libram unam.

Pulverata et mixta liquefiant in crucibulo tecto, igne moderato. Massam fluentem affunde, refrigeratam pulverisa, Aquae fervidae immitte, et per horae quadrantem spathula continue movendo, decoque. Liquorem etiamnum fervidum filtra. Refrigeratum a praecipitato sponte nato filtri ope separa, Stibio residuo reaffunde, addita aquae portione, denuo per qua-

drantem horae coque et filtra; et hanc operationem bis vel ter itera. Praecipitatum puniceum, leve, inde genitum, aqua tepida ablue, in loco umbroso blando calore exsicca et serva.

Syrupus Althaeae.

R. Radicis Althaeae decorticatae Uncias duas,

infunde per horas duodecim in

Aquae communis Libris duabus cum dimidia.

In colaturae Unciis viginti septem dissolve

Sacchari albi Libras quatuor.

Fiat ebullitione unica Syrupus.

Syrupus Amygdalarum.

R. Amygdalarum dulcium Uncias octo,
— amararum Uncias duas,

Decorticatis et in mortario lapideo pistilli lignei ope contusis, sensim adde

Aquae communis Libras duas,

— Florum Aurantii Uncias duas.

In emulsionis colatae Unciis viginti, dissolve

Sacchari albi Libras tres.

Calore lenissimo fiat Syrupus.

Syrupus Balsami Peruviani.

R. Balsami Peruviani Unciam unam

Infunde in vase clauso cum

Aquae fervidae Libra una.

In liquoris post refrigerationem decantati Unciis decem, solve
 Sacchari albi Libram unam cum dimidia.

Syrupus Berberum.

R. Fructuum Berberum maturorum quantum placet.

Conquassati stent per dies tres, tum exprime succum. Hujus Succi defaecatione depurati Unciis viginti adde

Sacchari albi Libras tres.

Semel ebulliendo in lebetæ stanneo fiat Syrupus.

Eodem modo parentur:

Syrupus Cerasorum, e Succo Cerasorum acidorum;

— Mororum, e Succo fructuum;

— Ribium;

— Rubi Idaei;

— Succu Citri.

Syrupus Cinnamomi.

R. Cinnamomi veri in pulverem grossiusculum redacti Uncias duas,

Aquae Cinnamomi vinosae Uncias quatuordecim.

Digerantur in vase clauso loco tepido per biduum. In Unciarum undecim colatura calore blando solve

Sacchari albi Libram unam cum dimidia,

ut fiat Syrupus.

Syrupus Corticum Aurantiorum.

R. Corticum Aurantiorum siccatorum,
et a substantia medullari mundatorum,
Uncias quatuor.

Minutim concisis adfunde

Vini albi Gallici Libras duas cum di-
midia.

Digere per biduum vase clauso et ex-
prime. Unciis viginti colatis adde

Sacchari albi Libras tres
et una ebullitione in Syrupum redige.

Syrupus Croci.

R. Croci Unciam dimidiam,
Vini Gallici albi Libram unam.

Stent in leni digestionem per aliquot ho-
ras. In liquoris expressi Unciis decem

solve

Sacchari albi Libram unam cum di-
midia,

ut fiat Syrupus.

Syrupus Florum Aurantii.

R. Aquae Florum Aurantii Uncias de-
cem,

Sacchari albi Libram unam cum di-
midia.

Fiat Syrupus.

Syrupus mannatus.

R. Foliorum Sennae Uncias quatuor,
Seminis Foeniculi Unciam dimidiam,
infunde

Aquae fervidae Libris duabus.

Stent in vase clauso per aliquot horas.
In liquoris expressi et colati Libra una
cum dimidia, solve

Sacchari albi Libras duas,
Mannae Libram dimidiam.

Ebulliant semel, ut fiat Syrupus.

Syrupus opiatus.

R. Extracti Opii Granis viginti quin-
que,
in

Vini Malacensis Uncia una
solutis, admisce

Syrupi Althaeae Libras duas.

Syrupus Rhei.

R. Radicis Rhei concisae Uncias tres,
Cinnamomi veri Drachmas sex,
adfunde

Aquae bullientis Libras duas.

Digere per noctem. Colaturae Uncia-
rum viginti adde

Sacchari albi Libras tres,
ut fiat Syrupus.

Syrupus Rhoeados.

R. Florum Rhoeados recentium Libram
unam,

Aquae communis fervidae Libras
duas.

Infusa macera per noctem. E colatura
Unciarum viginti fiat, cum
Sacchari albi Libris tribus,
ebullitione unica Syrupus.

Syrupus Senegae.

R. Radicis Senegae concisae Unciam unam.

Coque cum

Aquae fontanae Libra una cum dimidia,

ad colaturam Unciarum decem, et addita

Sacchari albi Libra una cum dimidia, fiat Syrupus.

Syrupus simplex.

R. Sacchari albi Libras tres,

Aquae communis Uncias viginti, solvendo fiat Syrupus.

Syrupus Violarum.

R. Florum Violae odoratae recentium, a calyculis mundatorum, Uncias octo, infunde

Aquae fervidae Libris duabus.

Stent in vase stanneo per horas duodecim. Liquoris colati Unciis viginti adde

Sacchari albi Libras tres, quo leni calore soluto, fiat Syrupus.

Tartarus ammoniatus.

(*Tartras Potassae ammoniatus.*)

R. Tartari depurati pulverati, quantum libet,

Aquae fervidae sufficiente quantitate soluto adde

Ammonii carbonici quantitatem aliquantisper punctum saturationis excedentem.

Dein filtra, in vase vitreo aut porcel-
laneo leni calore evapora et Sal siccum
vase vitreo probe claudendo serva.

Tartarus boraxatus.

R. Boracis Libram dimidiam,
Tartari depurati Libram unam cum
dimidia.

Subtilissime pulverata misce per qua-
drantem horae et usui serva.

Tartarus depuratus.

(*Supertartaras Potassae.*)

Crystalli Tartari purificati venales
explorentur num ab inquinamentis metalli-
cis et salibus heterogeneis sint liberae,
tum Aqua frigida abluantur, et iterum sic-
catae in mortario ferreo mundo et modice
calefacto in pulverem terantur.

Tartarus natronatus.

(*Tartras Potassae et Sodae.*)

R. Natri carbonici quantum placet,
Solve in

Aquae fervidae Sextuplo.

Lixivio in vase stanneo ebullienti sen-
sim adde,

Tartari depurati pulverati quantum
satis ad saturandum.

Liquorem per chartam colatum evapora
et ad crystallisandum sepone. Crystallos
collectas et siccatas serva.

Tartarus stibiatus.

(Tartras Potassae stibiatus.)

- R. Tartari depurati,
Stibii oydulati fusci, singulorum Un-
cias octo.

Mixta injiciantur in

Aquae communis Libras duodecim.

In vase vitreo aut porcellaneo balneo
arenae commisso, ebulliant, subinde agi-
tando per horae quadrantem. Calida etiam
filtrentur et ad crystallisationis momen-
tum evaporata, per noctem seponantur.
Liquor a crystallisatione residuus evapo-
ret, ut denuo crystallos demittat; quas
collectas et siccatas in mortario lapideo,
aut vitreo, in pulverem tenuem, vitreo
adservandum tere.

Terebinthina cocta.

Partem resinosam, e destillatione Olei
Terebinthinae remanentem, ex aqua
exemtam, aëri expone, donec indurescat.

Tinctura Absinthii.

- R. Summitatum Absinthii vulgaris sic-
catarum Libram dimidiam

Minutim concisis adfunde

Spiritus Vini rectificati Libras tres.

Post sufficientem digestionem in cucur-
bita clausa, exprime et filtra.

Tinctura amara.

- R. Summitatum Centaurii minoris,

Pomorum Aurantiorum immaturorum,

Radicis Gentianae, singulorum Uncias duas,

— Zedoariae Unciam unam.

Concisis et contusis adfunde

Spiritus Vini rectificati Libras tres.

Post digestionem exprime et filtra.

Tincturae Arnicae.

R. Florum Arnicae Unciam unam cum dimidia,

Spiritus Vini rectificati Libram unam.

Mixta digere, post sufficientem extractionem exprime et filtra.

Eodem modo

Tinctura Aconiti ex herbis

paretur.

Tinctura aromatica.

R. Cinnamomi veri Uncias duas,

Cardamomi minoris,

Caryophyllorum,

Galangae,

Zingiberis, singulorum Unciam dimidiam.

Contusa digerantur cum

Spiritus Vini rectificati Libris duabus.

Filtra et serva.

Tinctura aromatica acida.

R. Tincturae aromaticae Libram unam,
instilla

Acidi sulphurici concentrati Un-
ciam dimidiam.

Serva usui.

Tinctura Asae foetidae.

R. Asae foetidae Uncias duas,
Spiritus Vini rectificati Libram
unam.

Misce, digere et filtra.

Eodem modo paretur

Tinctura Myrrhae.

Tinctura Benzoës composita.

R. Benzoës Uncias quatuor cum dimidia,
Aloës lucidae Unciam dimidiam,
Balsami indici nigri Unciam unam,
Spiritus Vini rectificatissimi Li-
bras tres.

In vase clauso leni calore digere, de-
inde per chartam cola.

Tinctura Calami composita.

R. Radicum Calami Uncias tres,
— Zedoariae,
— Angelicae, singularum Un-
ciam unam,

Pomorum Aurantiorum immaturo-
rum Uncias duas,

Spiritus Vini rectificati Libras tres.

Post digestionem exprime et filtra.

Tinctura Cantharidum.

R. Cantharidum contusarum Unciam dimidiam,

Spiritus Vinirectificati Libram unam.

Macera frigide per triduum atque filtra.

Tinctura Cascarillae.

R. Corticis Cascarillae contusi Uncias quinque,

Spiritus Vini Gallici Libras duas.

Digere per dies octo et filtra.

Tinctura Cinnamomi.

R. Cinnamomi veri Uncias quinque,

Spiritus Vini rectificati Libras duas.

Digere per dies octo, exprime et cola.

Pari modo parandae sunt:

Tinctura Catechu;

— Chinae simplex, *e China fusca.*

— Corticum Aurantiorum,
a parenchymate albo mundatorum;

— Gentianae;

— Pimpinellae;

— Valerianae simplex.

Tinctura Castorei.

R. Castorei sibirici minutim concisi Uncias duas,

Spiritus Vini rectificati Libram unam

Digere blando calore et filtra.

Tinctura Castorei aetherea.

- R. Castorei sibirici minutim concisi Unciam unam,
Spiritus sulphurico-aetherei Libram dimidiam.

Macera frigide in vitro clauso per dies octo, saepius subinde agitando, dein filtra et conserva.

Tinctura Catechu composita.

- R. Myrrhae,
Catechu, singulorum Unciam dimidiam,
Balsami peruviani Drachmam unam,
Spiritus Cochleariae Uncias octo.

Digere blando calore per horas quadraginta octo, filtra et conserva.

Tinctura Chinae composita.

- R. Corticis Chinae fuscae pulverati Uncias tres,
Radici Gentianae,
Corticum Aurantiorum, a parenchymate albo mundatorum, singulorum Unciam unam,
Spiritus Vini gallici Libras duas.

Digere et cola.

Tinctura Colocynthis.

- R. Colocynthis a seminibus liberatae et minutim concisae Unciam unam,
Anisi stellati Drachmam unam,
Spiritus Vini rectificati Libram unam.

Post blandam digestionem exprime, per chartam filtra et conserva.

Tinctura Digitalis aetherea.

- R. Herbae Digitalis minutim concisae Unciam unam,
Spiritus sulphurico-aetherei Uncias octo.

Digere per triduum in vitro obturato saepius agitando, loco frigido, filtra et conserva.

Eodem modo

Tinctura Valerianae aetherea *paretur.*

Tinctura Digitalis simplex.

- R. Herbae Digitalis minutim concisae Uncias duas.

Digere leni calore cum
Spiritus Vini rectificati Unciis octo.
Aquae destillatae simplicis Unciis quatuor

antea dilutis. Exprime et filtra.

Eodem modo para

Tincturam Hyoscyami e herba.

Tinctura Euphorbii.

- R. Euphorbii Unciam unam,
Spiritus Vini rectificati Libram unam.

Post digestionem filtra.

Tinctura Ferri acetici aetherea.

(*Liquor Acetatis Ferri aethereus.*)

R. Ferri puri limati quantum libet.

Immitte in cucurbitam satis amplam et
caloris lenioris ope solve in

Acidi muriatici quantitate sufficiente.

Solutione peracta, sensim instilla

Acidum nitricum,

usque dum mediante calore Gas nitro-
sum, effervescendo non amplius prodeat

et ferrum solutum perfecte oxydatum sit.

Quam solutionem Aqua dilue, et ope Li-
quoris Kali caustici praecipita. Praecipita-

tum edulcoratum, aëri expositum, exsicca

in tantum, ut massa remaneat paululum
humida. Tunc sensim immitte, in

Acetum concentratum,

vitro cylindrico contentum, et bacilli

vitrei ope saepius agita. Soluta prima

Ferri praecipitati portione, aliam immitte

et continua, quousque quid solvitur.

Cujus solutionis concentrati, coloris pro-

funde badii, Unciis novem adde

Aetheris acetici Unciam unam, cum

Spiritus Vini rectificatissimi Un-

ciis duabus

commixtam. Serva.

Tinctura Ferri muriatici.

(*Spiritus Muriatis Ferri.*)

R. Ferri puri limati Uncias tres.

Immitte in phialam satis amplam et caloris lenioris ope solve in
Acidi muriatici sufficiente quantitate.

Solutum evaporet ad Libram dimidiam, cui adde
Spiritus Vini rectificati Libram unam cum dimidia.

Serva.

Tinctura Ferri pomati.

(*Liquor Ferri pomati.*)

R. Extracti Ferri pomati Uncias duas,
Aquae Cinnamomi vinosae Libram unam.

Solve.

Tinctura Guajaci.

R. Resinae Guajaci nativae Drachmas duas.

Pulveratis superadfunde

Spiritus Vini Taffia dicti Libras duas.

Digere per dies sex et liquorem limp-
dum post subsidentiam decantatum serva.

Tinctura Guajaci ammoniata.

R. Resinae Guajaci nativae tritae Unciam unam,

Liquoris Ammonii vinosi Libram dimidiam.

Frigida digestionem in vitro clauso saepius agitando extrahatur Tinctura.

Eadem methodo

Tinctura Valerianae ammoniata
paretur.

Tinctura Kalina.

(*Spiritus potassatus.*)

R. Kali caustici sicci recenter parati Uncias quatuor.

In mortario ferreo calefacto in pulverem tritas immitte

Spiritus Vini rectificatissimi, in cucurbita leviter calefacti, Libris duabus.

Probe agitata, vase clauso balnei arenae calore per aliquot dies digere et Tincturam rubicundam serva.

Tinctura Opii crocata.

(*Vinum crocato-opiatum.*)

R. Opii comminuti Uncias quatuor,

• Croci Unciam unam cum dimidia,
Caryophyllorum,

Cinnamomi veri, singulorum Drachmas duas,

Vini Malacensis Libras duas.

Mixta digere per dies quatuor, dein exprime et liquorem decantatum serva.

Nota. *Drachma continet solutum ex Opii Granis decem.*

Tinctura Opii simplex.

R. Opii comminuti Uncias duas,

Spiritus Vini rectificati,

Aquae Cinnamomi simplicis, singulorum Libram dimidiam.

Digere donec Opium solutum sit, cola et serva.

Nota. *Drachma solutum ex Granis decem Opii continet.*

Tinctura Pini composita.

- R. Turionum Pini Uncias tres,
 Rasurae Ligni Guajaci Uncias duas,
 — — Sassafras,
 Baccarum Juniperi, singularum Unciam unam.

Mixta digere cum
 Spiritus Vini rectificati Libris tribus
 per octiduum, tincturam dein exprime
 et per chartam cola.

Tinctura Rhei aquosa.

(*Infusum Rhei boraxatum.*)

- R. Radicis Rhei in taleolas scissae Unciam unam cum dimidia,
 Boracis pulverati Drachmas duas,
 Aquae communis fervidae Libram unam.

Mixta macera per duodecim horas. Colaturae Unciarum decem admisce
 Aquae Cinnamomi vinosae Uncias duas.

Serva.

Tinctura Rhei vinosa.

(*Vinum Rhei aromaticum.*)

- R. Radicis Rhei concisae Uncias duas,
 Corticum Aurantiorum mundatorum Unciam dimidiam,
 Cardamomi minoris Drachmas duas.

Mixta digere cum
 Vini Malacensis Libris duabus
 per quatuor dies, dein exprime et ad-
 misce

Extracti Helenii Unciam dimidiam,
 Sacchari albi Uncias tres.

Serva.

Tinctura Succini.

R. Succini pulverati Libram dimidiam.

In sartagine ferrea leniter tosto adfunde
 Spiritus Vini rectificatissimi Libras
 duas.

In cucurbita clausa digerantur leni ca-
 lore per aliquot dies. Tincturam satura-
 tam filtra et conserva.

Vinum stibiatum.

R. Stibii oxydulati fusci Unciam dimi-
 diam,

Vini Malacensis Libram unam.

Mixta digere loco frigido per duodecim
 dies, agitando vas saepius et liquorem
 limpidum decanta.

Unguentum basilicum.

R. Adipis suillae depuratae Libras tres.
 Cerae flavae,

Colophonii,

Sevi ovilli depurati, singulorum Libram
 unam,

Terebinthinae Libram dimidiam.

Leni igne liquata colentur.

Unguentum Cantharidum.

- R. Cantharidum contusarum Uncias duas,
 Olei Seminis Papaveris Uncias octo.
 Mixta digere in balneo aquae per horas
 duas. Colaturae Librae dimidia adde
 Cerae albae Uncias quatuor,
 ut fiat Unguentum.

Unguentum Cerussae.

- R. Adipis suillae depuratae Libras duas.
 Sevi ovilli depurati Libram unam.
 Liquatis admisce
 Cerussae subtilissime tritae Libras duas.
 Serva.

Unguentum Elemi.

- R. Elemi,
 Terebinthinae laricinae,
 Sevi ovilli depurati,
 Adipis suillae depuratae, singulorum
 Par pondus.
 Leni igne liquefacta cola per linteum
 et serva.

Unguentum Hydrargyri cinereum.

- R. Hydrargyri puri Libram unam,
 Sevi ovilli depurati Uncias octo.
 Tere in mortario lapideo invicem ad
 perfectam Hydrargyri extinctionem; tunc
 admisce
 Adipis suillae depuratae Uncias se-
 decim,
 Olei de Cedro Drachmam unam.
 Serva.

Unguentum Mezerei.

R. Corticis Mezerei recentis contusi Libram unam,

Adipis suillae depuratae Libras duas.

Coque leni igne ad aquosi exhalationem, et in adipe expressa dissolve

Cerae flavae Uncias duas,

Olei de Cedro Drachmas duas.

Serva.

Unguentum oxygenatum.

(*Adeps oxygenata.*)

R. Adipis suillae depuratae Uncias octo.

Supra lenem ignem in vase terreo liquatis sensim admisce, diligenter agitando,

Acidi nitrici Unciam unam.

Refrigeratum vase vitreo clauso conserva.

Unguentum Roris marini compositum.

R. Adipis suillae depuratae Libras quatuor,

Sevi ovilli depurati Libras duas,

Cerae flavae Libram dimidiam.

Liquefactis et refrigeratis admisce

Olei Laurini Uncias duas,

— Roris marini,

— Baccarum Juniperi, singulorum
Uncias tres.

Mixta servantur.

Unguentum rosatum.

- R. Adipis suillae, in Aqua Rosarum lotae,
 Uncias octo,
 Cerae albae Uncias duas.

Leni igne liquefactis et refrigeratis, sensim immisce

Aquae Rosarum Uncias tres,
 Olei de Cedro Drachmam unam.

Serva.

Unguentum saturninum.

- R. Cerae albae Libram dimidiam,
 Olei Olivarum Libras duas.

Liquefactis successive immisce

Aceti saturnini Uncias tres,
 Aquae Rosarum Libra dimidia
 dilutas. Serva.

Unguentum sulphuratum compositum.

- R. Sulphuris depurati,
 Zinci sulphurici siccati et pulverati, singulorum Uncias duas,
 Adipis suillae depuratae Uncias octo.

Mixta servantur.

Unguentum Terebinthinae aloëtinum.

- R. Terebinthinae laricinae Libram dimidiam,
 Mellis crudi Uncias quatuor,

Tincturae Aloës Uncias tres,
Vitelli Ovorum Numero quatuor.

Misceantur exacte.

Zincum oxydatum.

(*Oxydum Zinci.*)

R. Zinci puri quantum vis.

Inmitte crucibulo prunis imposito et aliquantulum inclinato, igneque sensim aucto liqua. Simulac metallum flammam conceperit, appone crucibulum inversum, ita tamen, ut aëri atmosphaerico aditus aliquatenus pateat; quo amoto, oxydum natum separa, et hancce methodum, usque dum omne metallum in oxydum versum fuerit, repete. Oxydo collecto aquam destillatam superinfunde et agita, ut partes metalli non oxydatae fundum petant, quaecunque leviora sedulo aufer, in crucibulo denuo ure, et vase probe clauso serva.

Nota. *Parando hocce oxydum, minorem quantitatem metalli repetitis vicibus in crucibulum ingerere praestat.*

Zincum purum.

Zincum venale quale prostat, liquetur modico igne in crucibulo. Agitando spatula ferrea, injice per vices Sulphuris frustula, scorias ortas remove, iterum iterumque Sulphur adde, usque dum illud comburatur, nullas omnino producendo scorias.

Zincum sulphuricum.*(Sulphas Zinci.)*

R. Zinci puri in frustula parva diffracti, quantum placet.

Solve in

Acidi sulphurici diluti quantitate sufficiente.

Solutionem filtra, et post idoneam evaporationem in crystallos redige, quas siccitas serva.

EX TEMPORE PARANDA.

Aqua saturnina.

(*Liquor Acetatis Plumbi dilutus.*)

R. Aquae destillatae Libram unam,
Aceti saturnini Drachmas duas.

Misce.

Elaeosaccharum Anisi.

R. Sacchari albi pulverati Unciam unam,
Olei Anisi aetherei Guttas viginti
quatuor.

Misce.

Eodem modo ex quolibet Oleo aethereo, Elaeosacchara proprii nominis parentur.

Linimentum ammoniatum.

(*Oleum ammoniatum.*)

R. Olei Papaveris Partes tres,
Liquoris Ammonii caustici Partem
unam.

Misce.

Liquor Hydrargyri muriatici
corrosivi.

(*Liquor Muriatis Hydrargyri ammoniati.*)

- R. Hydrargyri muriatici corrosivi,
Ammonii muriatici, singulorum Gra-
rum unum.

Solve in

Aquae destillatae Uncia una,
et adde

Mellis rosati Scrupulum unum.

Liquor Myrrhae.

- R. Myrrhae pulveratae Partem unam,
Aquae destillatae fervidae Partes qua-
tuor.

Tere in vase porcellaneo per quadran-
tem horae, liquorem dein per linteum cola.

Liquor Vini probatorius.

(*Liquor Hydrogenii sulphurati.*)

- R. Calcariae sulphuratae,
Acidi tartarici, singulorum Draehmam
unam.

Seorsim pulverata, misce cum

Aquae destillatae Unciis octo,

et vitro clauso per horae quadrantem
agita. Postquam seposita subsederint, li-
quorem limpidum in vasa bene claudenda
decanta.

Pilulae jalappinae.

- R. Saponis jalappini Partes tres,

Hydrargyri muriatici mitis Partem unam.

Misce, fiat Massa pilularis.

Tinctura Rosarum acidula.

(*Infusum Rosarum acidulum.*)

R. Florum Rosarum rubrarum siccatarum
Drachmam unam,
Aquae fervidae Unciam unam,
Acidi sulphurici diluti Scrupulum unum.

Mixta macera per horas tres et colatum
serva.

Unguentum cereum.

R. Olei Papaveris Partes decem,
Cerae albae Partes quatuor.
Liquata et ab igne remota agitentur
donec refrixerint.

Unguentum Cerussae campho-
raturum.

R. Unguenti Cerussae Unciam unam,
Camphorae pulveratae Scrupulum unum.

Misce.

Unguentum Hydrargyri album.

(*Unguentum Submuriatis Hydrargyri ammo-
niati.*)

R. Hydrargyri ammoniato muriatici
Partem unam,

M

Unguenti cerei Partes octo.

Misce.

Unguentum Hydrargyri citrinum.

(*Unguentum Nitratis Hydrargyri.*)

R. Liquoris Hydrargyri nitrici Partem unam.

Calefactum sensim admisce

Adipis suillae depuratae liquefactae Partibus quatuor.

Serva.

Unguentum Hydrargyri rubrum.

(*Unguentum Oxydi Hydrargyri rubri.*)

R. Hydrargyri oxydati rubri laevigati Partem unam,

Unguenti cerei Partes decem.

Misce exacte.

Unguentum Majoranae.

R. Adipis suillae depuratae Unciam dimidiam,

Olei Majoranae aetherei Guttas decem.

Misce.

Unguentum Tartari stibiati.

(*Unguentum Tartratis Potassae stibiati.*)

R. Tartari stibiati subtilissime triti Partem unam,

Adipis suillae depuratae Partes quatuor.

Misce exactissime.

Unguentum Zinci.

(Unguentum Oxydi Zinci.)

R. Zinci oxydati albi Partem unam,
Unguenti cerei Partes octo.

Misce.

I N D E X.

A.		pag.	
Acetas Potassae	119	Acidum tartaricum	89
— Sodae	130	— Tartari essentiale, v.	
Acetum aromaticum	83	Acidum tartaricum.	
— bezoardicum, vide Acetum aromaticum.		Adeps suilla	3
— concentratum	83	— depurata	90
— Convallariae majalis	84	— oxygenata	172
— crudum	2	Aerugo crystallisata	3
— destillatum	84	Acther aceticus	91
— prophylacticum, v. Acetum aromaticum.		— sulphuricus	91
— Rosarum	84	Aethiops antimonialis, v.	
— Rubi Idaei	84	Hydrargyrum sulphurato - stibiatum.	
— saturninum	84	— martialis, v. Ferrum oxydulatum nigrum.	
— scillinum	85	— mineralis, v. Hydrargyrum sulphuratum nigrum.	
Acidum aceticum	85	Agaricus	9
— benzoicum	85	Alkali causticum, v. Kali causticum.	
— muriaticum	86	— minerale, v. Natrium carbonicum.	
— muriaticum oxygenatum, v. Aqua oxy-muriatica.		— vegetabile aëratum, v. Kali carbonicum perfecte saturatum.	
— nitricum	87	— volatile siccum, v. Ammonium carbonicum.	
— phosphoricum ex ossibus	88	Alcohol Acti, v. Acidum aceticum.	
— phosphoricum purum	88	Aloë lucida	4
— succinicum	88		
— sulphuricum concentratum.	89		
— sulphuricum dilutum	89		

	pag.		pag.
Alumen crudum	4	Aqua Menthae vinosa	97
— ustum	92	— Naphae, v. Aqua Flo-	
Ambra grisea	4	rum Aurantii.	
Ammoniacum	5	— oxymuriatica	97
Ammonium carbonicum	92	— Petroselini	97
— pyro - oleosum	92	— Pruni Padi	96
— muriaticum, v. Sal am-		— Rosarum	98
moniacum.		— Rubi Idaei	98
— muriaticum depuratum	93	— Rutae	96
— — martiatum	93	— Salviae	96
Amygdalae amarae	5	— Sambuci	95
— dulces	5	— saturnina	176
Amylum	5	— Valerianae	96
Antimonium crudum	6	— vegcto - mineralis, v.	
— diaphoreticum, v. Sti-		Aqua saturnina.	
bium oxydatum.		— vulneraria Thedenii,	
Aqua aromatica	94	v. Mixtura vulneraria-	
— benedicta Rulandi, v.		acida.	
Vinum stibiatum.		— vulneraria vinosa	98
— Calcariae ustae	94	Arcanum duplicatum, v.	
— Calcis, v. Aqua Cal-		Kali sulphuricum.	
cariae ustae.		Argentum	6
— Cerasorum	94	— nitricum fusum	98
— Chamomillae	95	Arsenicum album	6
— Cinnamomi simplex	95	Asa dulcis	9
— — vinosa	95	— foetida	7
— destillata simplex	95		
— Embryonum, v. Aqua			
aromatica.			
— Florum Aurantii	95		
— Foeniculi	95		
— Hyssopi	96		
— Lauro - Cerasi	96		
— Melissae	96		
— Menthae crispae	96		
— — piperitae	96		
		B.	
		Baccae Berberidis	7
		— Juniperi	7
		— Lauri	7
		Balaustia	24
		Balsamum Arcæi, v. Un-	
		guentum Elemi.	
		— Commendatoris, v.	

	pag.		pag.
Tinctura Benzoës com- posita.		Calx	10
Balsamum Copaivae	8	— Antimonii cum Sul- phure, v. Calcaria sul- phurato - stibiata.	
— Indicum nigrum	8	Camphora	11
— ophthalmicum ru- brum, v. Unguentum Hydrargyri rubrum.		Canella alba	11
— Opodeldoc, v. Lini- mentum saponato - camphoratum.		Cantharides	11
— Peruvianum nigrum	8	Carbo purus	101
— Vitae Hoffmani, v. Mixtura oleoso-balsa- mica.		— Spongiae	101
Baryta muriatica	99	Carbonas Potassae	120
— sulphurica nativa, v. Spathum ponderosum.		— Sodae	131
Benzoe	9	Cardamomum minus	12
Bismuthum	9	Caricae	12
— nitricum praecipitatum	99	Castoreum	12
Bolctus igniarius	9	Caryophylli	12
— Laricis	9	Catechu	13
Borax	10	Cera alba	13
Butyrum Antimonii, v. Li- quor Stibii muriatici.		— flava	13
— Cacao, v. Oleum Cacao.		Cerasa acida	14
— Majoranae, v. Unguen- tum Majoranae.		Ceratum Cetacci	101
C.		— Saturni, v. Ungu. sa- turninum.	
Cacao	10	Cercoili saturnini	101
Calcaria	10	— simplices	102
— muriatica	100	Cerussa alba	14
— sulphurata	100	Cetaceum	14
— sulphurato - stibiata	100	Cineres clavellati	15
Calomelas, v. Hydrargy- rum muriaticum mite.		Cinnabaris	14
		Cinnamomum verum	14
		Colla piscium	44
		Colocynthis	16
		— praeparata	102
		Colophonium	15
		Conchae	15
		Conserva Rosarum	102
		Conserva Sabinae	102

	pag.		pag.
Cornu Cervi	16	Cuprum	21
Cortex Augusturae	16	— aluminatum	102
— Aurantiorum	16	— salphurico-ammonia-	
— Cascarillae	16	tum	103
— Chinae flavus s. re-		— sulphuricum	103
gius	17		
— Chinae fuscus s. offi-		E.	
cinalis	17	Elaeosacchara	176
— Chinae ruber	18	Electuarium lenitivum	103
— Cuspariae	16	— e Senna	103
— Geoffreae Surinamen-		— Theriaca	104
sis	18	Elemi	21
— Granatorum	18	Elixir acidum, v. Mixtura	
— Guajaci	18	sulphurico - acida.	
— Hippocastani	19	— ammoniato - opia-	
— Kina - kinae	17	tum	105
— Mezerei	19	— Aurantiorum compo-	
— Peruvianus	17	situm	105
— Pruni Padi	19	— roborans, v. Tinctura	
— Quassiae	19	Chinae composita.	
Cortex Quercus	20	— viscerale, v. Elixir Au-	
— Salicis fragilis }		rantiorum composi-	
— — laureae }	20	tum.	
— Simarubae	20	— Vitrioli, v. Tinctura	
— Ulmi interior	20	aromatica acida.	
Cremor Tartari solubilis, v.		Emplastrum adhaesivum, v.	
Tartarus boraxatus.		Emplastrum Lithargy-	
Crocus	20	ri cum Resina.	
— Martis aperitivus, v.		— album coctum, v. Empl.	
Ferrum oxydatum fu-		Cerussae.	
scum.		— Ammoniaci	106
— Metallorum, v. Sti-		— aromaticum	106
bium oxydulatum fu-		— Cantharidum euphor-	
scum.		biatum	107
Crystalli Tartari	78	— Cantharidum ordina-	
Cubebae	21	rium,	106

	pag.		pag.
Emplastrum Cantharidum		Cantharidum ordina-	
perpetuum	107	rium.	
— cephalicum, v. Empl.		Emplastrum vesicatorium	
opiatum.		perpetuum, v. Emplas-	
— Cerussae	107	trum Cantharidum	
— Conii	107	perpetuum.	
— Diachylon composi-		Euphorbium	21
tum, v. Emplastrum		Extractum Absinthii	110
Lithargyri composi-		— Aconiti	111
tum.		— Aloës	112
— Diachylon simplex, v.		— Angelicae	110
Emplastrum Lithar-		— Arnicae	110
gyri simplex.		— Belladonnae	111
— foetidum	108	— Calami	110
— Hydrargyri	108	— Cardui benedicti	112
— Hyoseyami	108	— Cascarillae	110
— Lithargyri composi-		— catholicum, v. Ex-	
tum	108	tractum Rhei compo-	
— Lithargyri cum Hy-		situm.	
drargyro	108	— Centaurii minoris	112
— Lithargyri cum Re-		— Chamomillae	110
sina	109	— Chelidonii	111
— simplex	109	— Chinae aquosum	113
— Meliloti	108	— — frigide paratum	112
— mercuriale, v. Hydrar-		— Colocynthidis	111
gyri.		— Conii maculati	111
— opiatum	109	— Corticum Aurantio-	
— resolvens, v. Empla-		rum	111
strum foetidum.		— Dulcamarae	113
— saponatum	110	— Ferri pomatum	113
— Spermatidis Ceti v. Ce-		— Fumariae	112
ratum Cetacei.		— Gentianae	112
— stomachicum v. Em-		— Graminis liquidum	113
plastrum aromaticum		— Helenii	111
— vesicatorium ordina-		— Hellebori nigri	111
rium v. Emplastrum		— Hyoseyami	111

	pag.		pag.
Extractum Levistici	111	Flores Chamomillae Romanae	23
— Ligni Campechiani	113	— Chamomillae vulgaris	23
— — Guajaci	114	— Convallariae majalis	23
— — Quassiae	112	— Granati	24
— Liquiritiae	112	— Lavandulae	24
— Marrubii	113	— Liliorum convallium	23
— Millefolii	111	— Malvae arboreae	24
— Myrrhae	112	— — vulgaris	24
— Nucum Juglandis	111	— Meliloti citrini	25
— Opii	112	— Millefolii	25
— panchymagogum Crollii, v. Extractum Rhei compositum.		— Naphae	22
— Pimpinellae	111	— Rhoeados	25
— Rhei	111	— Rosarum incarnatarum	25
— — compositum	114	— — rubrarum	25
— Salicis	112	— Salis ammoniaci martiales, v. Ammonium muriaticum martiatum.	
— Saturni, v. Acetum saturninum.		— Sambuci	26
— Taraxaci liquidum	114	— Sulphuris loti, v. Sulphur depuratum.	
— Trifolii aquatici	112	— Tanaceti	26
— Valerianae	111	— Tiliae	26
		— Verbasci	26
F.		— Violarum	27
Fel Tauri	22	— Zinci, v. Zincum oxydatum.	
— — inspissatum	114	Folia Aurantii	27
Ferrum	22	— Lauro-Cerasi	27
— oxydatum fuscum	114	— Rhododendri Chrysanthi	27
— oxydulatum nigrum	115	— Sennae	28
— pulveratum	115	— Uvae Ursi	28
— sulphuricum	115	Formicae	28
Ficus passae	12	Fructus Caspici annui	28
Flores Arnicae	22		
— Aurantii	22		
— Benzoës, v. Acidum benzoicum.			

	pag.		pag.
Fructus Mororum	29	Hepar Sulphuris volatile,	
— Prunorum	29	v. Liquor Ammonii	
— Ribium rubrorum	29	sulphurati.	
— Rubi Idaci	29	Herba Abrotani	31
— Tamarindorum	78	— Absinthii	32
		— Aconiti	32
		— Althacae	32
		— Arnicae	32
		— Basilici	33
		— Belladonnae	33
		— Botryos Mexicanae	34
		— Cardui benedicti	35
		— Centaurii minoris	33
		— Chelidonii	34
		— Chenopodii ambrosi-	
		siaci	34
		— Cicutae aquaticae	34
		— — maculatae	35
		— Cochleariae	35
		— Conii maculati	35
		— Digitalis	35
		— Erysimi	35
		— Farfarae	36
		— Fumariae	36
		— Gratiolae	36
		— Hederae terrestres	36
		— Hyoscyami	36
		— Hyssopi	37
		— Jaceae	43
		— Lactucae virosae	37
		— Ledi palustris	37
		— Majoranae	37
		— Malvae	38
		— Mari veri	38
		— Marrubii	38
		— Matricariae	38
G.			
Galbanum	30		
Gallae	29		
Glandes Quercus	30		
Globuli Tartari martiati,			
vel			
— Tartratis Potassae	116		
Gummi ammoniacum	6		
— arabicum	30		
— Benzoës, v. Benzoës.			
— Elemi	21		
— Euphorbium	21		
— Galbanum	30		
— Gambiense	44		
— Guttæ	31		
— Kino	44		
— Mimosae	30		
— Tragacanthæ	30		
Gutti	31		
H.			
Helmintochoorton	31		
Hepar Sulphuris calcare-			
um, v. Calcaria sul-			
phurata.			
— Sulphuris salinum, v.			
Kali sulphuratum.			

	pag.		pag.
Herba Melissae	38	Infusum Rhei boraxatum	169
— Menthae crispae	39	— Rosarum acidulum	178
— — piperitae	39		
— Millefolii	39		
— Nicotianae	39	K.	
— Oreoselini	40	Kali aceticum	119
— Origani vulgaris	40	— carbonicum	120
— Roris marini	40	— — perfecte satu-	
— Rutae	41	ratum	120
— Sabinae	41	— causticum siccum	120
— Salviae	41	— nitricum	121
— Scordii	41	— sulphuratum	121
— Serpylli	41	— sulphuricum	121
— Stramonii	42	— tartaricum	122
— Tanaceti	42	Kermes minerale, v. Sul-	
— Taraxaci	42	phur stibiatus ru-	
— Thymi	42	beum.	
— Trifolii fibrini	43	Kino	44
— Veronicae	43		
— Violae tricoloris	43	L.	
Hydrargyrum	43		
— ammoniato - muriati-		Lac Sulphuris, v. Sulphur	
cum	116	praecipitatum.	
— muriaticum corrosi-		Lacca in ramulis	44
vum	117	Lapides Cancrôrum	44
— muriaticum mite	117	Lapis divinus, v. Cuprum	
— oxydatum rubrum	118	sulphuricum alumi-	
— oxydulatum nigrum	118	natum.	
— purum	119	— infernalis, v. Argen-	
— stibiato - sulphura-		tum nitricum fusum.	
tum	119	Laudanum liquidum Sy-	
— sulphuratum nigrum	119	denhami, v. Tinctura	
		Opii crocata.	
I.		Lichen Islandicus	45
Ichthyocolla	44	Lignum Campechianum	45
		— Guajaci	45

	pag.		pag.
Lignum Juniperi	45	sulphurico - aethereus	
— Quassiae	46	martiatus.	
— Sassafras	46	Liquor Cornu Cervi suc-	
Limatura Martis Praepa-		cinatus, v. Liquor Am-	
rata, v. Ferrum pul-		monii succinici.	
veratum.		— Ferri pomati	167
Linimentum ammoniatum	176	— Hydrargyri muriatici	
— saponato - camphora-		corrosivi	177
tum	122	— Hydrargyri nitrici	125
— volatile, v. Linimen-		— Hydrogenii sulphurati	177
tum ammoniatum.		— Kali acetici	125
Liquor Acetatis Ammo-		— — carbonici	126
niae	123	— — caustici	126
— Acetatis Ferri aethe-		— Muriatis Hydrargyri	
reus	166	ammoniatum	177
— Acetatis Plumbi	84	— Muriatis Stibii	127
— — — dilutus	176	— Myrrhae	177
— — Potassae	125	— Nitratis Hydrargyri	125
— Acidi muriatici oxy-		— Potassae causticae	126
genati	97	— Saponis stibiati	126
— Ammoniae purae	123	— Stibii muriatici	127
— — spirituosus	125	— Subcarbonatis Ammo-	
— Ammonii acetici	123	niae	123
— — anisatus	123	— Subcarbonatis Potas-	
— — carbonici		sae	126
aquosus	123	— Succinatis Ammoniae	124
— Ammonii caustici	123	— Sulphureti Ammoniae	
— — pyro-oleosi	124	hydrogenati	124
— — succinici	124	— Terrae foliatae Tar-	
— — sulphurati	124	tari, v. Liquor Kali	
— — vinosus	125	acetici.	
— anodinus mineralis, v.		— Vini probatorius	177
Spiritus sulphurico-		Lithargyrum	46
aethereus.		Lixivium causticum, v. Li-	
— anodinus mineralis		quor Kali caustici.	
martiatis, v. Spiritus			

	pag.		pag.
Natrum sulphuricum cry-		Oleum Chamomillae aethe-	
stallisatum	131	reum	135
Nitras Argenti fusus	98	— Chamomillae infu-	
— Potassae	121	sum	133
Nitrum crudum	49	— Cinnamomi	135
— depuratum, v. Kali		— Cornu Cervi foetidum,	
nitricum.		v. Oleum animale foe-	
Nuces Juglandis immatu-		tidum.	
rae	49	— Corticum Aurantio-	
— moschatae	49	rum	132
— vomicae	50	— Cumini	133
Nuclei moschatae	49	— Foeniculi	133
		— Galbani aethereum	136
		— Hyoscyami	133
		— Lavandulae	132
		— laurinum	50
		— Lini	133
		— Macidis	136
		— Majoranae	132
		— Menthae crispae	132
		— — piperitae	132
		— Nucistae	136
		— Olivarum	61
		— Ovorum	136
		— Papaveris	133
		— Petrae	52
		— Ricini	51
		— Roris marini	132
		— Rutae	132
		— Sabinae	132
		— Succini	136
		— Tartari per deliquium,	
		v. Liquor Kali carbo-	
		nici.	
		— Terebinthinae	136
		— Valerianae	133

O.

Oleum Absinthii aethe-	
reum	132
— Absinthii infusum	133
— ammoniatum	176
— Amygdalarum	133
— animale aethereum	133
— — Dippelii, v.	
Oleum animale aethe-	
reum.	
— animale foetidum	134
— Anisi aethereum	132
— Baccarum Juniperi	132
— Cacao	134
— Cajoputi	50
— Calami	133
— Carvi	133
— Caryophyllorum	134
— Caſcarillae	132
— de Cedro	50
— Cerae	135

	pag.		pag.
Oleum Vitrioli	51	Poma Citri	53
Olibanum	51	Potassa caustica	190
Opium	52	— cruda	15
Opopanax	52	Pulpa Prunorum	139
Ova gallinacea	52	— Tamarindorum	139
Oxalium	68	Pulvis aromaticus	139
Oxydum Ferri nigrum	115	— ad Cataplasma, v.	
— — fuscum	114	Species ad Cataplasma	
— Hydrargyri rubrum	118	sma.	
— Stibii potassecum ab-		— dentifricius	140
lutum	150	— Ipecacuanhae opia-	
— Stibii potassetum non		tus	140
ablutum	150	— Liquiritiae composi-	
— Stibii fuscum sulphu-		tus	140
ratum	151	— pectoralis, v. Pulv.	
— Zinci	174	Liquirit. compos.	
Oxymel Aeruginis	137	— sternutatorius	141
— scillinum	137		
— simplex	137		

R.

P.		Radix Althaeae	53
Pasta gummosa saccharata,		— Angelicae	53
loco Pastae de Al-		— Ati	54
thaea	137	— Armoraciae	54
— Liquiritiae	138	— Arnicae	54
Petroleum	52	— Asari	54
Phosphas Sodae	131	— Bardanae	54
Phosphorus	138	— Belladonnae	55
Pilulae purgantes, vide		— Bryoniae	55
— jalappinae	177	— Calami	55
Piper album	52	— Caricis arenariae	55
— Hispanicum	28	— Cardopatiæ vel	
Plumbum aceticum	139	— Carlinae	56
Poma acidula	53	— Caryophyllatae	56
— Aurantii immatura	53	— Cichorei	56

	pag.		pag.
Radix Colombo	56	Radix Taraxaci	65
— Contrajervae	57	— Tormientillae	66
— Curcumae	57	— Valerianae minoris	66
— Dauci	57	— Zedoariae	66
— Dictamni albi	57	— Zingiberis albi	66
— Enulae	59	Resina communis	67
— Filicis	58	— Guajaci nativa	67
— Foeniculi	58	— Jalappae	141
— Fraxinellae	57	— Pini	67
— Galangae	58	— Roob Dauci, v. Suc-	
— Gentianae rubrae	58	cus ejusdem.	
— Graminis albi	59	— Juniperi, v. Succus	
— Helenii	59	ejusdem.	
— Hellebori albi	59	— Sambuci, v. Succus	
— — nigri	59	ejusdem.	
— Jalappae	60		
— Ipecacuanhae	60	S.	
— Iridis Florentinae	60	Saccharum album	67
— Lapathi acuti	61	— Lactis	67
— Levistici	61	— Saturni	68
— Liquiritiae	61	Sagapenum	69
— Ononidis	61	Sal Acetosellae	68
— Paeoniae	62	— amarum	68
— Pimpinellae albae	62	— ammoniacum crudum	68
— Polygalae amarae	62	— — depuratum, v.	
— Polypodii	62	Ammonium muriati-	
— Ptarmicae	63	cum depuratum.	
— Raphani rustici	54	— ammonium fixum, v.	
— Rhei	63	Calcaria muriatica.	
— Rubiae	63	— anglicum, v. Sal ama-	
— Salep	64	rum.	
— Saponariae	64	— culinare	69
— Sarsaparillae	64	— mirabile Glauberi, v.	
— Scillae	64	Natrum sulphuricum.	
— Senegae	65	— Saidschützense, v. Sal	
— Serpentinae Virginianae	65	amarum.	

	pag.		pag.
Sal Seignette, v. Tartarus		Semen Lini	73
natronatus.		— Lycopodii	73
— Sodae, v. Natrum car-		— Papaveris albi	73
bonicum.		— Petroselini	74
— Succini, v. Acidum		— Phellandrii	74
succinicum.		— Sabadilli	74
— Tartari, v. Kali car-		— Santonici	71
bonieum.		— Sinapcos	74
— volatile Cornu Cervi,		— Stramonii	75
v. Ammonium carbo-		Sevum ovillum	75
nicum pyro-oleosum.		— — depuratum	90
Sanguis Draconis	69	— vervecinum	75
Sapo antimonialis, v. Sapo		— Siliqua dulcis	75
stibiatus.		Soda	75
— domesticus nostras	70	— phosphorata, v. Na-	
— guajacinus	141	trum phosphoricum.	
— Hispanicus albus	70	Spathum ponderosum	76
— jalappinus	142	Species aromaticae	143
— medicatus	142	— ad Cataplasma	143
— stibiatus	143	— — Decoctum Ligno-	
— Scammonium Halep-		rum	144
pense	70	— ad Enema	144
Semen Amomi	70	— — Fomentum	144
— Anisi stellati	71	— — Gargarisma	144
— — vulgaris	71	— — Infusum pectorale	145
— Cannabis	71	— — resolventes externae	145
— Carvi	71	— ad suffiendum	145
— Cinae	71	Sperma Ceti	14
— Coriandri	72	Spiritus	76
— Cumini	72	— Angelicae compositus	146
— Cydoniorum	72	— Ammoniae anisatus	123
— Erucae	74	— camphoratus	146
— Foeniculi	72	— Cochleariae	146
— — aquatici	74	— Cornu Cervi rectifi-	
— Foeni Graeci	73	catus, v. Liquor Am-	
— Hordei excorticatum	73	monii pyro-oleosi.	

	pag.		pag.
Spiritus Formicarum	146	Spiritus sulphurico acethereus martiatus	148
— Lavandulae	147	— theriacalis, v. Spiritus Angelicae compositus.	
— Mindereri, v. Liquor Ammonii acetici.		— Vini rectificatissimus	149
— muriatico-aethereus	147	— — rectificatus	149
— Muriatis Ferri	166	— Vitrioli acidus, v. Acidum sulphuricum dilutum.	
— Nitri acidus, v. Acidum nitricum.		Spongia cerata	150
— Nitri dulcis, v.		— marina	76
— nitrico-aethereus	148	— usta, v. Carbo Spongiae.	
— potassatus	168	Stannum	76
— Roris marini	147	Stibium oxydatum album ablutum	150
— Salis acidus, v. Acidum muriaticum.		— oxydatum album non ablutum	150
— Salis ammoniaci anisatus, v. Liquor Ammonii anisatus.		— oxydatum fuscum	151
— Salis ammoniaci aquosus, v. Liquor Ammonii carbonici aquosus.		— sulphuratum nigrum	6
— Salis ammoniaci cum Calce, v. Liquor Ammonii caustici.		— sulphuratum nigrum laevigatum	151
— Salis ammoniaci vinosus, v. Liquor Ammonii vinosus.		Stipites Dulcamarae	76
— Salis dulcis, v. Spiritus muriatico-aethereus.		Strobili Lupuli	77
— saponatus	148	Styrax liquidus	77
— Serpylli	147	Subcarbomas Ammoniae	92
— Spiritus sulphurico-acidus	130	— — — pyrocolcosus	92
— Spiritus sulphurico-aethereus	148	— Magnesiae	127
		— Potassae	120
		— Sodae	131
		Submurias Hydrargyri ammoniatus	116
		Subnitrus Bismuthi	99

	pag.		pag.
Subnitras Hydrargyri ammoniatus	118	Super - tartras Potassae	159
Subsulphas Cupri ammoniatus	113	Syrupus Acetositis Citri, v. Syrupus Succii Citri.	
Succinum	77	— Althaeae	154
Succus Dauci inspissatus	151	— Amygdalarum	154
— Juniperi inspissatus	151	— Balsami Peruviani	154
— Liquiritiae	77	— Berberum	155
— Sambuci inspissatus	152	— Cerasorum	155
Sulphas Cupri	103	— Cinnamomi	155
— Ferri	115	— Corticum Aurantio- rum	156
— Magnesia	128	— Croci	156
— Potassae	121	— Florum Aurantii	156
— Sodae	131	— mannatus	156
— Zinci	175	— Mororum	155
Sulphur	78	— opiatum	157
— Antimonii auratum, v. Sulphur stibiolum aurantiacum.		— Papaveris rubri, v. Sy- rupus Rhoeados.	
— auratum liquidum, v. Liquor Saponis stibii.		— Rhei	157
— depuratum	152	— Rhoeados	157
— praecipitatum	152	— Ribium	155
— stibiolum aurantiacum	152	— Rubi Idaei	155
— — rubeum	153	— Senegae	158
Sulphuretum Calcis	100	— simplex	158
— Hydrargyri nigrum	119	— Succii Citri	155
— — stibiolum	119	— Violarum	158
— Potassae	121		
— Stibii nigrum laevigatum	151		
Super-acetas Cupri, v. Ae- rugo crystallisata.			
— murias Hydrargyri	117		
— phosphas Calcis	88		

T.

Tamarindi	78
Tartarus ammoniatus	158
— boraxatus	159
— crudus	78
— depuratus	159
— emeticus, v. Tartarus stibiatus.	

	pag.		pag.
Tartarus natronatus	159	Tinctura Arnicae	161
— solubilis ammoniacalis, v. Tartarus ammoniatus.		— aromatica	161
— stibiatus	160	— — acida	162
— tartarisatus, v. Kali tartaricum.		— Asae foetidae	162
— vitriolatus, v. Kali sulphuricum.		— Benzoës composita	162
Tartras Potassae	122	— Calami composita	162
— — ammoniatus	158	— Cantharidum	163
— — et Sodae	159	— Cascarillae	163
— — stibiatus	160	— Castorei	163
Terebinthina cocta	160	— — aetherea	164
— communis	79	— Catechu	163
— laricina, vel veneta	78	— — composita	164
Terra foliata Tartari, v. Kali aceticum.		— Chinae composita	164
— foliata Tartari crystallisata, v. Natrum aceticum.		— — simplex	163
— Japonica	13	— Cinnamomi	163
— ponderosa salita, v. Baryta muriatica.		— Colocynthis	164
Theriaca, v. Elcctuarium Theriaca.		— Corticum Aurantiorum	163
Thus	51	— Digitalis aetherea	165
Tinctura Absinthii	160	— — simplex	165
— Aconiti	161	— Euphorbii	165
— amara	160	— Ferri acetici aetherea	166
— Antimonii acris, v. Tinctura Kalina.		— — muriatici	166
— Antimonii Jacobi, v. Liquor Saponis stibiati.		— — pomati	167
		— Gentianae	163
		— Guajaci	167
		— — ammoniata vel volatilis	167
		— Hyoscyami	165
		— Kalina	168
		— Lignorum, v. Tinctura Pini composita.	
		— Myrrhae	162
		— Opii crocata	168
		— — simplex	168
		— Pimpinellae	163

	pag.		pag.
Tinctura Pini composita	169	Vitriolum Zinci, v. Zincum	
— Rhei aquosa	169	sulphuricum.	
— — vinosa	169	Unguentum aegyptiacum, v.	
— Rosarum acidula	178	Oxymel Aeruginis.	
— Salis Tartari, v. Tinctura kalina.		— album camphoratum,	
— Succini	170	v. Unguentum Cerussae camphoratum.	
— Thebaica, v. Tinctura Opii simplex.		— album simplex, v. Unguentum Cerussae.	
— Valerianae aetherea	165	— basilicum	170
— — ammoniata	167	— Cantharidum	171
— — simplex	163	— cereum	178
— — volatilis, v.		— Cerussae	171
Tinctura Valerianae ammoniata.		— — camphoratum	179
Trochisci Alhandal, v. Colocynthis praeparata.		— digestivum, v. Unguentum Terebinthinae.	
Turiones Pini	79	— Elemi	171
		— Hydrargyri album	179
		— — cinereum	171
		— — citrinum	179
		— — rubrum	180
		— irritans, v. Unguentum Cantharidum.	
V.		— Majoranae	179
Vanilla	79	— Mezerei	172
Vinum crocato-opiatum	168	— Submuriatis Hydrarg. ammoniati	179
— emeticum, v. Vinum stibiatum.		— Neapolitanum, v. Unguentum Hydrargyri cinereum.	
— Gallicum album	80	— nervinum, v. Unguentum Roris marini compositum.	
— Malacense	80	— Nihil, v. Unguentum Zinci.	
— Rhei aromaticum	169	— oxygenatum	172
— Rhenanum	80		
— stibiatum	170		
Viride Aeris crystallisatum	3		
Viscum album	80		
Vitriolum de Cypro, v. Cuprum sulphuricum.			
— Martis, v. Ferrum sulphuricum.			

	pag.		pag.
Unguentum rosatum	173	Unguentum Tartratis Potas-	
— Roris marini compo-		sae stibiati	179
situm	172	— Zinci	180
— saturninum	173		
— ad scabiem, v.		Z.	
— sulphuratum compo-			
situm.	173	Zincum	80
— Terebinthinae aloëti-		— oxydatum	174
num	173	— purum	174
— Tartari stibiati, vel		— sulphuricum	175

Beym Verleger dieses sind auch folgende pharmaceutische und medicinische Schriften erschienen :

- Codex medicamentarius Europaeus Sectio prima.** Pharmacopoea Londinensis, Dublinensis et Edinburgensis 2 rthl. 6 gr.
- — **Sectio secunda.** Pharmacopoea Gallica 2 rthl. 18 gr.
- — **Sectio tertia.** Pharmacopoea Suecica et Danica 2 rthl. 16 gr.
- — **Sectio quarta.** Pharmacopoea Batava 4 rthl. 12 gr.
- — **Sectio quinta.** Pharmacopoea Rossica, Fennica et Polonica 2 rthl. 16 gr.
- Heinroth, I. C. A.,** Grundzüge der Naturlehre des menschlichen Organismus, zum Behuf seiner Vorträge über dieselbe. gr. 8. 807. 18 gr.
- Hoffmann, G. J.,** Genera plantarum Umbelliferarum eorumque Characteres naturales secundum numerum figuram situm et proportionem omnium fructificationes partium. Cum tabul. aen. Edit. 2da. 8. maj. Druckp. 3 rthl. 8 gr.
- Jörg, Dr. J. C. G.,** über das Gehörorgan des Menschen und der Säugthiere, in schwangern und nichtschwangern Zustande. Mit 4 Kupfertafeln. Fol. 808. 5 rthl. 8 gr.
- Rüde, G. W.,** pharmaceutische Erfahrungen, vorzüglich die Receptirkunst betreffend. Zum Nutzen ausübender Apotheker. 2te Aufl. 2 Thle. 8. 1r Theil 1 rthl. 4 gr.
2r Theil — 20 gr.
Beide Theile 2 rthl. —
- Sprengel, Kurt,** die neuesten Entdeckungen in der Botanik, nach ihrem ganzen Umfange. 2 Bde. mit 6 Kupfern. gr. 8. 820 u. 821. 4 rthl. 12 gr.
- Wollkopf, Dr. B.,** Untersuchung über Entstehung, Bildung und Heilung des Blutausflusses. Nach Brownschen Grundsätzen entworfen. 2 Thle. gr. 8. 805. 3 rthl. 2 gr.
-

